
### 



# الريـاضيــات وتطبيضاتها

في العلوم الإدارية والإقتصادية

# Lilium dunull

في العلوم الإدارية والإقتصادية

إعداد

د. دلال القاضي أستاذ مشارك/ إحصاء رياضي أحامعة بغداد/ جامعة عمان الأهلية

د. محمود مهدي البياتي أستاذ مشارك/تحليل بيانات جامعة بغداد/ جامعة عمان الأهلية

الطبعة الأولى 1426هـ-2006م





رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (1625/7/2005) 415

البياتي، محمود

الرياضيات وتطبيقاتها في العلوم الإدارية/ محمود البياتي، دلال القاضي

عمان: دار ومكتبة الحامد للنشِّر والتوزيع.

الطبعة الأولى 2006م، (336) صفحة

ر.إ: (7/1625م)

الواصفات:/ الرياضيات// العلوم الإدارية// الاقتصاد// إدارة الأعمال/

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

\* رقم الإجازة المتسلسل لدى دايِّرة المطبوعات والنشر 1550/6/1550

\* (ردمك) SBN (دردمك) \*



# كاللِّبُ المُنالِثِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### الأردن - عمان

هاتف: (962-6-5231081) - فاكس: (962-6-5235594) - نقال: (962-6-5231081) هاتف: (962-6-5231081) - فاكس: (962-6-5235594) - فاكس: (962-6-5235594) - فاكس: (962-6-5235594) - فاكس: (962-6-5231081) - فاكس: (962-6-5235594) - فاكس: (962-6-5231081) - فاكس: (

لا يجوز نشر أو اقتباس أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي وجه، أو بأي طريقة أكانت إليكترونية، أم ميكانيكية، أم بالتصوير، أم التسجيل، أم بخلاف ذلك، دون الخصول على إذن الناشر الخطي، وبخلاف ذلك يتعرض الفاعل للملاحقة القانونية

#### المقدمة

### الفصل الأول مراجعة فـي الجبر

1-1 مقدمة	
1-2 الأعداد الحقيقية	15
1-3 النسب (الكسور)	24
1-4 الأسس	30
5-1 العمليات الجبرية	33
1-6 العوامل	39
أسئلة الفصل الأول	46
الفصل الثاني	
معادلات بمتغير وادد	
2-1 مقدمة	
2-2 المعادلة الخطية	53
2-3 تطبيقات المعادلات الخطية	61
4-2 المعادلات التربيعية	67
1-4-1 الحل بطريقة الجذر التربيعي	
2-4-2 الحل بطريقة التجزئة إلى العوامل	
3-4-2 الحل بطريقة المميز (الصيغة التربيعية)	
4-4-2 طريقة إكمال المربع	
115tl 1 - 211 715 1	80

### الفصل الثالث المتباينات

	1-3 مقدمة
86	2-3 المجموعات ونظرية المجموعات
96	3-3 الفترات
98	4-3 المتباينات الخطية بمتفير واحد
105	5-3 المتباينات التربيعية بمتغير واحد
107	6–3 القيم المطلقة
111	أسئلة الفصل الثالث
	الفصل الـ الذطوط المستقيمة وأنظم
	4-1 مقدمة
118	1-4 مقدمة 2-4 نظام المحاور الكارتيزية
	2-4 نظام المحاور الكارتيزية
<ul><li>118</li><li>121</li><li>125</li></ul>	2-4 نظام المحاور الكارتيزية 4-2 صيغة المسافة
121	2-4 نظام المحاور الكارتيزية
121 125	2-4 نظام المحاور الكارتيزية
121 125 128	4-2 نظام المحاور الكارتيزية
121 125 128 132	2-4 نظام المحاور الكارتيزية

4-10 أنظمة المعادلات الخط	ية لمتغيرين	48
11-4 أنظمة المادلات الخط		56
أسئلة الفصل الرابع		67
	الفصل الخامس	
	الدوال والرسوم	
1-5 مقدمة		
2-5 الدوال		73
3–5 رسم الدوال		80
4–5 أنواع الدوال		87
5-5 تركيب الدوال		98
أسئلة الفصل الخامس		04
	الفصل السادس	
	المصفوفات	
6-1 مقدمة		
6-2 المصفوفات		12
3-6 الجمع والطرح للمصفوه	فات	16 .
-		
1–4–6 ضرب مصفوه		
	فية صفية في مصفوفة عمودية	
	The state of the s	

		3-4-6 ضرب مصفوفتين
227		5-6 المصفوفة الأحادية (المتماثلة)
229		
229		7–6 قوانين على المصفوفات
230		8-6 المحددات
233		9–6 المبدلة للمصفوفة
235		6-10 معكوس المصفوفة
		1) استخدام الطريقة السريعة
		2) استخدام الطريقة المطولة
245		11-6 حل المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات
		11-1-6 حل المعادلات باستخدام طريقة مع
		6-1-12 حل المعادلات باستخدام طريقة كر
254		أسئلة الفصل السادس
220 1		Sustain Gazari Gazari
		الفصل السابم
	انما	المشتقات وتطبية
		1-7 مقدمة
263_		7-2 المشتقة للدالة
268		3-7 التحليل الهندسي
271		
Let 1		4-7 قواعد الاشتقاق 1) مشتقة الثارث تبياهي صفر

2) مشتقة أو صيغة القوة أو الأس

	3) مشتقة الدالة
	4) المشتقة للجمع والطرح لأكثر من دالة قابلة للاشتقاق
	5) مشتقة الضرب
	6) مشتقة القسمة
	7) مشتقة قاعدة السلسلة
	8) مشتقة الدالة الأسية
	9) مشتقة الدالة اللوغاريتمية الطبيعية
	10) المشتقات العليا
289	5-7 الجانب التطبيقي للمشتقات: التحليل الحدي
	1) الكلفة الحدية
	2) الربح والعائد الحدي
	3) الربح الحدي
299	أسئلة الفصل السابع
	الفصل الثامن
	التكامل وتطبيقاته
	0.4
	1-8 مقدمة
307	2-8 مفهوم التكامل غير المحدد
310	8-3 التكامل لدوال معروفة - قواعد التكامل
317	8-4 طرق التكامل
	1-4-8 التكامل بطريقة التعميض

	2-4-8 التكامل بطريقة التجزئة
	3–4–8 التكامل بالتفريق إلى كسور بسيطة
	4-4-8 التكامل المحدود
327	8-5 التطبيقات الاقتصادية للتكامل
	أ) استخراج دالة التكلفة الكلية ودالة الإيراد الكلي
	ب) حساب فائض المستهلك
	ج) حساب فائض المنتج
332	أُستَلة الفصل الثامن
336	المراجع

### المقدمة

على الرغم من توفر العديد من الكتب في مادة الرياضيات، إلا أن أغلبها باللغة الإنكليزية مما يعني افتقار المكتبات في الجامعات العربية إلى كتب في الرياضيات وباللغة العربية. وإن توفرت بعض من المراجع في اللغة العربية فمعظمها تفتقر إلى المصطلحات الإنكليزية وقد تستخدم بعضها الرموز العربية أيضاً. كما وأن أغلب الكتب المتوفرة سواءً كانت باللغة العربية أو الإنكليزية تعتبر نوعاً ما متخصصة، بمعنى أن الكتب قد تكون في موضوع معين من الرياضيات مثلاً التفاضل والتكامل. وكذلك فإن أغلب هذه المراجع تفتقر للتطبيقات العملية لتلك المفاهيم الرياضية. هذا الأمر حدى بالمؤلفين التفكير في وضع كتاب في مادة الرياضيات لتلافي الصعوبات في استخدام المراجع الرياضية.

هذا الكتاب يوفر المادة باللغتين العربية والإنكليزية، أي أن جميع المفردات والخطوات عرضت باللغتين، كما وأن الأمثلة والتطبيقات استخدمت فيها الرموز الإنكليزية.

كذلك فإن الكتاب يعرض، وبشكل وافي، أكثر من موضوع في الرياضيات. فهناك فصل عن المصفوفات وفصل عن الدوال وتطبيقاتها وفصل عن التفاضل وفصل آخر عن التكامل إضافة للعديد من الفصول الأخرى المختلفة وذلك بغية التعرف على المفاهيم الرياضية المتنوعة.

وتضمن الكتاب كذلك العديد من الأمثلة التطبيقية وبالأخص التطبيقات الإدارية والاقتصادية والتي تعتبر النافذة للإلمام بأهمية المفاهيم الرياضية في الحياة العملية واستخداماتها.

وبذلك فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعاً هاماً وأساسياً للكثير من المفاهيم الرياضية

الواجب التعرف عليها ودراستها من قبل الراغبين في استخدامها وكذلك للطلبة اللذين يدرسون هذه المادة كمتطلب في اختصاصاتهم، وعلى وجه الخصوص طلبة الإدارة والاقتصاد.

ولقد تم وضع الكتاب ليكون مرجعاً مهماً ومقرراً لتدريس مادة الرياضيات في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة عمان الأهلية وكذلك في كليات العلوم الإدارية والمالية في بقية الجامعات، آملين أن يكون هذا الكتاب لبنة إضافية مفيدة للتدريس في الجامعات العربية وأن يلقى القبول من الجميع.

وفقنا الله جميعاً لخدمة العلم

المؤلفين

# الفصل الأول

# مراجعة في الجبر

- 1-1 مقدمة
- 2-1 الأعداد الحقيقية
- 3-1 النسب (الكسور)
  - 1-4 الأسس
- 5-1 العمليات الجبرية
  - 6-1 العوامل
  - أسئلة الفصل الأول

وببساطة فإن معنى الأعداد الطبيعية واضح في أنه يمثل الأعداد الصحيحة موجبة والتي تكون قيمها أكبر من صفر (أو تسمى أرقام العد والتي تستخدم في عدل Positive integers greater than zero وكذلك يمكن ملاحظة أن عمليتي جمع addition والضرب multiplication للأعداد الطبيعية يعطي نتائج هي أيضاً عداد طبيعية.

Addition and multiplication for Naturals numbers are also Natura numbers.

$$(1)(3) = 3$$
 فمثلاً  $2 + 3 = 4$  فمثلاً فمثلاً

أما عن عملية الطرح Subtraction فإن النتائج لا تعطى دائماً أعداد طبيعية Subtraction for Naturals numbers are not always Natural numbers

فمثلاً 2 - 3 = 1. لذلك علينا التعرف على أعداد أخرى أكبر وأوسع من عنى الأعداد الطبيعية وهناك الأعداد الصحيحة Integer Numbers.

We notice that the Integer Numbers are the following numbers  $\dots$ , -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,  $\dots$ 

والتي يتضرح أنها تعني جميع الأعداد الطبيعية وكذلك مماثلاتها من القيم سالبة و أيضاً قيمة الصفر.

We notice that Integer Numbers are all positive and negative numbers and also the zero value.

ويلاحظ أيضاً بأن جمع وطرح وضرب الأعداد الصحيحة يعطي أعداد محيحة.

Addition, subtraction, and multiplication for Integer numbers are also Integer numbers.

 أما عن القسمة division فإن النتائج لا تمثل أعداد صحيحة دائما وأحيانا تكون الأعداد غير صحيحة.

Division for Integer numbers are not always an Integer numbers.

مـــثلاً 
$$\frac{1}{3} = 3 \div 1$$
 وبالتالي علينا التعرف على أعداد جديدة تسمى الأعداد النسبية Rational numbers والتي تعرض بشكل نسب.

Rational numbers which are formed by taking ratios of Integers of the form  $\frac{a}{b}$ ,  $b \neq 0$  where a and b are Integers.

ومن أمثلة الأعداد النسبية:

$$\frac{6}{6}$$
,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{-2}{3}$ ,  $\frac{4}{3}$ ,  $\frac{-3}{4}$ ,  $\frac{9}{3}$ ,  $\frac{-3}{9}$ 

وغيرها من أشكال قسمة عددين صحيحين وبشرط عدم القسمة على صفر لأن ذلك يعطى نتائج غير معرفة Undefined Results.


ويلاحظ هنا بأن بعض نتائج القسمة تمثل أعداد صحيحة مثل  $\frac{9}{3}=8$  وذلك يعني أن الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية وليس العكس صحيح.

Some of the results of the divisions are integers which means that all integers are Rational numbers but not vise versa.

أما بعض نتائج القسمة الأخرى فلا تمثل أعداد صحيحة بل يطلق عليها اسم less الأعداد النسبية عامة واسم الكسور fraction إذا كان البسط numerator أقل benominator من المقام Denominator ومن أمثلة ذلك:

ها. 
$$\frac{3}{9}$$
 ,  $\frac{-3}{4}$  ,  $\frac{-2}{3}$  ,  $\frac{1}{3}$ 

أما الأعداد التي لا يمكن كتابتها بشكل نسبة فتسمى الأعداد الغير نسبية المعادد الغير نسبية  $\pi$  ،  $\sqrt{2}$  وغيرها مع أنها بصورة عامة قليلة مقارنة مع ما تكونه الأعداد النسبية.



هذا الإحداثي السيني يستخدم بشكل واسع لرسم النقاط والأشكال المختلفة وسيتم مناقشة ذلك وبالتفصيل لاحقاً.

أما عن خصائص الأعداد الحقيقية Properties of Real Numbers فهي:

#### 1- Commutative property

#### الخاصية التبادلية

If a , b are real numbers, then:

$$a+b=b+a$$
.

$$ab = ba$$

for example:

$$1 + 3 = 3 + 1 = 3$$
  
 $1 + (-3) = (-3) + 1 = -2$ 

$$(1)(3) = (3)(1) = 3$$

#### 2- Associative property

#### الخاصبة التشاركية

If a, b, and c, are real numbers, then:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a b) c = a (b c)$$

for example: 
$$(2+3)+4$$

$$(2+3)+4=2+(3+4)=9$$
  
2.  $(3,4)=(2,3)$ ,  $4=24$ 

#### 3- Distributive property

#### الخاصية التوزيعية

If a, b, and c are real numbers, then:

$$a (b + c) = a b + a c$$

$$(b+c) a = b a + c a$$

$$2(3+4) = (2)(3) + (2)(4) = 14$$

#### 4- Identity elements:

if a is real number, then:

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

it is abvious that if we add any real number to zero we get the same number, and also if we multiply any real number by one we get same number.

#### 5- Inverse property

#### الخاصية العكسية

If a is a real number, then -a is called the negative of a, also the reciprocal of a is  $a^{-1}$  and we have:

$$a + (-a) = 0$$
 ,  $a \cdot a^{-1} = 1$ 

for example: if 
$$a = 3$$
 then  $-a = -3$  and  $a^{-1} = \frac{1}{3}$ 

and we have

$$3 + (-3) = 3 - 3 = 0$$
 and  $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$ 

#### 6- Order property

#### خاصية الترتيب

if a , b are real numbers, and b-a is positive, then b-a>0 which means that b>a or a< b.

We will state some theorems (without proof) for ordering properties as follows:

- a) if a < b and b < c, then a < c for example: 1 < 2 and 2 < 3 then 1 < 3
- b) If a < b, then a + c < b + c  $also \ a - c < b - c$ for example: 2 < 3, then 2 + 1 < 3 + 1 since 3 < 4 $also \ 2 < 3$ , then 2 - 1 < 3 - 1 since 1 < 2
- c) If a < b , then a c < b c if c positive , and c  $\neq$  0 also a c > b c if c negative , and c  $\neq$  0 for example: 2 < 3 , then (2) (2) < (3) (2) since 4 < 6 but, if 2 < 3 , then (2) (-2) > (3) (-2) since -4 > -6
- d) If a < b and c < d , then a + c < b + d for example: if 1 < 2 and 3 < 4 , then 1 + 3 < 2 + 4 since 4 < 6
- e) If a and b are both positive or both negative, and

if a < b, then 
$$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

for example: if 2 < 3, then  $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ 

g) 
$$(\frac{1}{2})(\frac{3}{4}) = \frac{3}{8}$$

#### Ratios (Fractions) (الكسور) 1-3

b · a نا متعریف النسبة، و کما رأینا سابقاً علی أنها الشکل  $\frac{a}{b}$  ، حیث أن  $b \neq 0$  عددان حقیقیان و أن  $b \neq 0$  .

The ratio  $\frac{a}{b}$  is defined to be the quotient of the two real numbers a and b, where  $b \neq 0$ .

وعـندما يكون المقام b denominator أكبر من البسط a numerator عندئذ أتُعرف النسبة على أنها الكسر Fraction.

When the numerator a is less than the denominator b, then the ratio  $\frac{a}{b}$  is called the fraction.

$$b^{-1}=\frac{1}{b}$$
 ن ملحظة أن النسبة  $\frac{a}{b}$  تكتب أيضاً بالشكل  $a$  ،  $a$  ميث أن  $\frac{a}{b}$  . inverse و الذي بسمى بالمعكوس

 $\frac{a}{b}$  is defined as the product of a and the inverse of b, i.e  $\frac{a}{b}=a$  b<sup>-1</sup>. أما عن العمليات الجبرية الخاصة بهذا النوع من الأعداد فهى كالآتى:

#### 1- Multiplication of Fractions:

$$(\frac{a}{b})(\frac{c}{d}) = \frac{ac}{bd}$$

That is, the product of two fractions is obtained by the multiplication the two numerators divided by the multiplication of the two denominators.

#### 2- Division of Fractions:

$$(\frac{a}{b}) \div (\frac{c}{d}) = (\frac{a}{b})(\frac{d}{c}) = \frac{ad}{bc}$$

That is, the quotient of two fractions is obtained by multiplying the first fraction by the inverse of the second fraction.

#### 3- Cancellation of common factors:

$$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}$$
 ,  $c \neq 0$ 

That is, the fraction would be the same if the numerator and the denominator of the fraction is multiplied or divided by any nonzero number.

#### 4- Addition and Subtraction of Fractions:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

similarly:

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a - b}{c}$$

That is, if two fractions have a common denominator, they may be added (or subtracted) by adding (subtracting) their numerators.

When, we have to add (or subtract) two fractions with different denominators, then we have to use a common denominator for both fractions. To keep the numbers as small as possible, we choose the smallest possible common denominator which is called the least common denominator.

That is, if 
$$\frac{a}{b}$$
 and  $\frac{c}{d}$  are two fractions, then: 
$$\frac{a}{b} \mp \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \mp \frac{cb}{bd} = \frac{ad \mp cb}{bd}$$

ومع بساطة القوانين السابق ذكرها للتعامل مع الكسور والنسب بصورة عامة ولكن الأمناة التي سيتم ذكرها في هذا المبحث ستكون شاملة وتتضمن كثير من التفاصيل التني لا نستطيع رؤيتها من خلال القانون فحسب بل علينا التعامل مع المعطيات والتركيز على الصورة الصحيحة لها وسيتم ذلك كالآتي:

d) 
$$\frac{2y}{3x} - \frac{4}{3x} + \frac{5z}{3x} = \frac{2y - 4 + 5z}{3x}$$

بسط کل مما یلی Simplify the following:

a) 
$$\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$$

لإيجاد ناتج جمع  $\frac{5}{6}$  و  $\frac{1}{8}$  يجب علينا في البداية توحيد المقام ليكون المقدار نفسه وسنستخدم 6 ليكون المقام الموحد، وذلك يعني علينا ضرب الحد الثاني وهو  $\frac{1}{8}$  في المقدار 2 لكل من البسط والمقام ليصبح  $\frac{1}{8}$  ومن ثم يتم جمعه مع

المقدار الأول  $\frac{5}{6}$  ليكون الناتج:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{(2)(1)}{(2)(3)} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5+2}{6} = \frac{7}{6}$$

b) 
$$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{(1)(2)}{(3)(2)} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5-1}{6} = \frac{4}{6}$$

باستخدام نفس الأسلوب السابق لتوحيد المقامات.

c) 
$$\frac{5}{6} + \frac{3}{7} = \frac{(5)(7)}{(6)(7)} + \frac{(3)(6)}{(7)(6)} = \frac{35}{42} + \frac{18}{42} = \frac{35+18}{42} = \frac{53}{42}$$

d) 
$$\frac{5}{6} - \frac{3}{7} = \frac{(5)(7)}{(6)(7)} - \frac{(3)(6)}{(7)(6)} = \frac{35}{42} - \frac{18}{42} = \frac{35 - 18}{42} = \frac{17}{42}$$

مثال 10

بسط المقدار التالي Simplify of following:

$$\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{1}{3} - \frac{5}{6}}$$

لإيجاد ناتج القسمة علينا أو لا إيجاد ناتج البسط كما يلي:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{(2)(2)}{(3)(2)} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4+1}{6} = \frac{5}{6}$$

وكذلك علينا إيجاد ناتج المقام كما يلي:

$$\frac{1}{3} - \frac{5}{6} = \frac{(1)(2)}{(3)(2)} - \frac{5}{6} = \frac{2}{6} - \frac{5}{6} = \frac{2-5}{6} = \frac{-3}{6}$$

وبالتالي فإن ناتج حاصل القسمة سيكون:

$$\frac{\frac{5}{6}}{\frac{-3}{6}} = (\frac{5}{6})(\frac{-6}{3}) = \frac{-5}{3}$$

#### مثال 11

بسط المقدار التالي Simplify the following:

$$\frac{7x - \frac{2x}{3}}{15y - \frac{y}{3}}$$

لإيجاد ناتج عملية القسمة علينا أولاً إيجاد ناتج البسط ليكون:

$$7x - \frac{2x}{3} = \frac{7x}{1} - \frac{2x}{3} = \frac{(7x)(3)}{(1)(3)} - \frac{2x}{3} = \frac{21x - 2x}{3} = \frac{19x}{3}$$

وكذلك علينا إيجاد ناتج المقام ليكون:

$$15y - \frac{y}{3} = \frac{15y}{1} - \frac{y}{3} = \frac{(15y)(3)}{(1)(3)} - \frac{y}{3} = \frac{45y}{3} - \frac{y}{3} = \frac{45y - y}{3} = \frac{44y}{3}$$

وأخيراً علينا قسمة ناتج البسط على ناتج المقام ليصبح لدينا:

$$(\frac{19x}{3}) \div (\frac{44y}{3}) = (\frac{19x}{3})(\frac{3}{44y}) = \frac{19x}{44y}$$

#### Exponents الأسس 1-4

إذا كان m عدد صحيح موجب positive integer فإن a (وتقرأ a للقوة أو الأس m الأس d is raised to the power m (m تُعرف على أنها حاصل ضرب العدد a في نفسه بمقدار m من المرات.

That is,

$$a^{m} = a . a . a ... a$$
 (m)

for example:

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$
  
 $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 82$ 

وهـنا نطلق اسم القوة أو الأس Power or exponent للرمز m ونطلق اسم الأساس base للرمز a

#### **Definition:**

If  $a \neq 0$ , then  $a^0 = 1$ , and if m is any positive integer (so that -m is a negative integer), then:

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

for example:

$$(-5)^0 = 1$$
 ,  $(\frac{3}{5})^0 = 1$  ,  $3^0 = 1$  , also 
$$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{3.3} = \frac{1}{9} \quad and \quad (-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^3} = \frac{1}{(-3)(-3)(-3)} = \frac{-1}{27}$$

#### أما عن خصائص الأسس Exponent Properties:

1)  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ , except that if either m or n is negative, then  $a \neq 0$ . That is, to multiply two powers with the same base we can add the two exponents.

2) 
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
 ,  $a \neq 0$ 

That is, to divide one power by another with the same base, subtract the exponent in the denominator from the exponent in the numerator.

3) 
$$(a^m)^n = a^{mn}$$
,  $a \ne 0$  if m or n is negative or zero

That is, a power raised to a power is equal to the base raised to the product of the two exponents.

**4)** 
$$(ab)^m = a^m b^m$$
,  $ab \ne 0$  if  $m \le 0$ 

That is, the product of two numbers all raised to the mth power is equal to the product of the mth powers of the two numbers.

5) 
$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$
,  $b \neq 0$  and  $a \neq 0$  if  $m \leq 0$ 

That is, the quotient of two numbers all raised to the mth power is equal to the quotient of the mth powers of the two numbers.

مثال 12

أوجد ناتج ما يلي Evaluate the following:

a) 
$$3^5 \cdot 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$$

b) 
$$x^5$$
,  $x^3 = x^{5+3} = x^8$ 

c) 
$$3^5 \cdot 3^{-2} = 3^{5-2} = 3^3$$

d) 
$$x^5$$
 .  $x^{-3} = x^{5-3} = x^2$ 

مثال 13

Evaluate the following أوجد ناتج ما يلي

a) 
$$\frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3$$

b) 
$$\frac{x^5}{x^3} = x^{5-3} = x^2$$

c) 
$$\frac{3^2}{3^5} = 3^{2-5} = 3^{-3} = \frac{1}{3^3}$$

d) 
$$\frac{x^3}{x^5} \cdot \frac{x^2}{x^5} = x^{3+2-5} = x^0 = 1$$

أوجد ناتج ما يلي Evaluate the following:

a) 
$$(3^3)^2 = 3^{3.2} = 3^6$$

b) 
$$(x^2)^3 = x^{2.3} = x^6$$

c) 
$$(x^2)^5$$
 .  $(x^{-2})^3 = x^{2.5}$  .  $x^{-2.3} = x^{10}$  .  $x^{-6} = x^{10-6} = x^4$ 

مثال 15

أوجد ناتج ما يلي Evaluate the following:

a) 
$$6^3 = (2.3)^5 = 2^5 \cdot 3^5$$

b) 
$$(xy)^3 = x^3 y^3$$

c) 
$$(x^2 y^{-3})^4 = (x^2)^4 \cdot (y^{-3})^4 = x^{2.4} \cdot y^{-3.4} = x^8 \cdot y^{-12} = \frac{x^8}{y^{12}}$$

مثال 16

بسط المقادير التالية Simplify the following:

a) 
$$(\frac{2}{3})^3 = \frac{2^3}{3^3}$$

b) 
$$(\frac{x}{y})^4 = \frac{x^4}{y^4}$$

c) 
$$\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^2 = \frac{(x^2)^2}{(y^3)^2} = \frac{x^{2.2}}{y^{3.2}} = \frac{x^4}{y^6}$$

بسط المقدار التالي Simplify the following:

$$(x^{-1} + y^{-1})^{-1}(\frac{1}{xy})$$

يلاحظ أن المقدار أعلاه هو حاصل ضرب حدين ولإيجاد ذلك علينا إيجاد قيمة الحد الأول أو لا كالآتى:

$$(x^{-1} + y^{-1})^{-1} = (\frac{1}{x} + \frac{1}{y})^{-1} = (\frac{y}{xy} + \frac{x}{xy})^{-1}$$
$$= (\frac{y+x}{xy})^{-1} = \frac{xy}{x+y}$$

ومن ثم ضربه بالحد الثاني ليصبح الناتج:

$$(\underbrace{xy}_{x+y})(\underbrace{1}_{xy}) = \frac{1}{x+y}$$

#### Algebraic Operations العمليات الجبرية

سيتم في هذا المبحث تطبيق العمليات الرياضية السابق ذكرها في المباحث السابقة باستخدام المقادير الجبرية Algebraic Expressions، حيث أن المقدار الجبري مثل 3+x أو 2x²-4x+5 وغيرها هو عبارة عن عدد من الحدود terms

Algebraic Expression is a statement or quantity consisting of one or more terms, for example x+3 has two terms, while  $2x^2-4x+5$  has three terms, and so on.

In the term  $2x^2$ , the factor 2 is called the numerical coefficient and the factor  $x^2$  is called the literal part of this term. The term 5 has no literal part and is called a constant term.

An expression containing only one term is called Monomial such as:  $2x^2$ , 5, x,  $\frac{x}{y}$ , and xy.

An expression containing exactly two terms is called Binomial such as x+3,  $3\frac{x}{y} - 2x^2$ , and  $3x + \frac{1}{4}$ .

بسط المقدار التالي Simplify the following:

$$2[3x(4-2x)] + 7[(x-3)(x+2) - 3]$$

لإيجاد الناتج لدينا:

$$2[3x.4-3x.2x]+7[x(x+2)-3(x+2)-3]$$

$$= 2 [12 x - 6 x^{2}] + 7 [x^{2} + 2 x - 3 x - 6 - 3]$$

$$= 2 (12 x - 6 x^{2}) + 7 (x^{2} - x - 9)$$

$$= 24 x - 12 x^{2} + 7 x^{2} - 7 x - 9$$

$$= -5 x^2 + 17 x - 9$$

#### مثال 23

أوجد ناتج كل مما يلي Evaluate the following:

a) 
$$(x + 3)^2 = (x + 3)(x + 3) = x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$$

b) 
$$(x-\frac{1}{2})^2 = (x-\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2}) = x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = x^2 - x + \frac{1}{4}$$

c) 
$$(2 \times -5) (2 \times +5) = (2 \times)^2 - (5)^2 = 4 \times^2 - 25$$

d) 
$$(3 x - 2 y) (3 x + 2 y) = (3 x)^2 - (2 y)^2 = 9 x^2 - 4 y^2$$

e) 
$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3}) = (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2 = 2 - 3 = -1$$

f) 
$$\frac{2x+4y^2}{2} = \frac{2x}{2} + \frac{4y^2}{2} = x + 2y^2$$

g) 
$$\frac{6x^2 + 3y - 2xy}{x} = \frac{6x^2}{x} + \frac{3y}{x} - \frac{2xy}{x} = 6x + 3\frac{y}{x} - 2y$$

أما عن القسمة في حالة كون البسط مقدار جبري مقسوماً على مقدار جبري آخر يمثل المقام فإن القسمة الطويلة هي المناسبة في هذه الحالة وذلك لأن تجزئة حدود البسط وقسمتها على المقام والتي كانت واضحة في العلاقة (6) السابقة والتي

تم تطبيقها في الفرعين (f) و(g) من المثال السابق لم تعد مناسبة و (g) بالغرض المطلوب (g) الناتج لعملية تلك القسمة.

For the division of two algebraic expressions then long division would be the appropriate way if there are no common factor between the numerator (dividend) and the denominator (divisor).

وفي هذه الحالة علينا استخدام القسمة الطويلة حيث أن البسط يسمى المقسوم .Quotient أما المقام فيسمى المقسوم عليه Divisor وأن الناتج يسمى Remainder وإن كانت القسمة الطويلة غير منتهية فهناك ما يسمى بالباقي Remainder وأخيراً فإن ناتج القسمة يتمثل بالعلاقة التالية:

$$\frac{Dividend}{Divisor} = Quotient + \frac{\text{Re}\,mainder}{Divisor}$$

وسيتم توضيح معنى القسمة الطويلة بالأمثلة التالية:

مثال 24

أوجد ناتج ما يلي Evaluate the following:

a) 
$$245 \div 5$$

وباتباع طريقة القسمة الطويلة لدينا:

49

Quotient الناتج — 49

Dividend المقسوم عليه 245

45

45

وبالتالي فإن الجواب هو:

Remainder الباقي

$$245 \div 5 = 49$$

و يعني ذلك أيضاً أن العدد a يعتبر عامل من عوامل العدد و إذا كان العدد يقبل القسمة على العدد a بدون باقي، وكما تم ملاحظة ذلك من بعض الأمثلة لعمليات القسمة سابقاً.

a is said to be factor of c if c can be divided by a without a remainder.

For example: 2 and 3 are the factors for 6, since (2) (3) = 6, also we notice that  $6 \div 2 = 3$  and  $6 \div 3 = 2$ 

وبنفس الأسلوب يمكن الحديث عن عوامل المقادير الجبرية، حيث أنه إذا كان أحد المقادير الجبرية يمثل حاصل ضرب مقدارين جبريين آخرين أو أكثر فإن تلك المقادير الجبرية تمثل عوامل المقدار الجبري الأصلي.

Similarly, if two (or more) algebraic expressions are multiplied together, then these expressions are said to be factors of the expression obtained as their product.

for example x y is the product of x times y, then x and y are said to be factors of x y.

الطريقة المناسبة لكتابة المقدار بشكل حاصل ضرب عوامله تسمى التحليل إلى العوامل Factoring.

The process of writing a given expression as the product of its factors is called factoring the expression.

وكما تم التنويه إليه، يتضح أن عملية التحليل إلى العوامل Factoring هي طريقة معاكسة لعملية ضرب الحدود Multiplication of factors والتي تم شرحها سابقاً، وبالتالي فإن كثير من القوانين Rules والعلاقات المستخدمة في التحليل ستكون مستنبطة من قوانين الضرب السابقة. وهذه العلاقات سيتم ذكرها في هذا المبحث كالآتي:

The following are general methods for factoring:

#### 1- Common Factors:

$$a x + b x = (a + b) x$$

#### 2- Difference of two squares

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

#### 3- Sum or difference of two cubes:

$$a^3 + b^3 = (a + b) (a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b) (a^2 + a b + b_2)$$

#### 4- Factoring a Quadratic form:

 $x^2 + p x + q$ , where p and q are constants using the fact that:

$$(x + a) (x + b) = x^2 + (a + b) x + a b$$

we need to find a and b such that their product is q and their sum is p.

Therefore, the factoring process here is that if:

$$x^2 + p x + q = (x + a) (x + b)$$

Then, p = a + b and q = a b

#### 5- Factoring a Quadratic form:

 $m x^2 + px + q$ , where p, q and m are nonzero constants and  $m \ne 1$  or  $m \ne -1$ .

Using the fact that:

$$m x^2 + p x + q = (x + a) (x + b)$$

if 
$$p = a + b$$
 and  $q = a b$ 

وأخيراً فإن عرض الطرق أعلاه لعملية التحليل من خلال الأمثلة الوافية الأغلب الحالات المرادفة سيتم كالآتى:

#### حلل إلى العوامل Factor the following:

a) 
$$2 x^2 - 9 x + 4 = (2 x - 1) (x - 4)$$

b) 
$$2 x^2 - 5 x - 3 = (2 x + 1) (x - 3)$$

c) 
$$3 x^2 + 4 x - 4 = (3 x - 2) (x + 2)$$

جميع الأشكال أعلاه مشابهة للشكل التربيعي  $m x^2 + p x + q$  وبالتالي تم التركيز في عملية التحليل هنا في محاول إيجاد الحدان اللذان حاصل ضربهما هو mq

في الفرع (a) الحدان هما 8 و 1 بحيث أن حاصل ضربهما 8 ومجموعهما 9 وفي الفرع (b) الحدان هما 6 و 1 بحيث أن حاصل ضربهما 6 ومجموعهما 6 أما في الفرع (c) فالحدان هما 6 و 2 بحيث أن حاصل ضربهما 12 ومجموعهما 4.

#### ا مثال 32 ا

حلل إلى العوامل Factor the following:

a) 
$$2 x^2 + 6 x + 4 = 2 (x^2 + 3 x + 2)$$
  
=  $2 (x + 2) (x + 1)$ 

نلاحظ هنا أن الحد المشترك هو 2 وعند استخراجه يتبقى لدينا شكل تربيعي يمكن إيجاد عوامله كما في الأمثلة السابقة.

b) 
$$2 x^2 - 8 x + 8 = 2 (x^2 - 4 x + 4)$$
  
=  $2 (x - 2) (x - 2)$   
=  $2 (x - 2)^2$ 

كــذلك نلاحظ هنا بان الحد المشترك هو 2 وعند استخراجه يتبقى لدينا شكل تربيعي ثم نقوم بتحليله،

c) 
$$4 x^2 y - 12 x y - 16 y = 4 y (x^2 - 3 x - 4)$$
  
=  $4 y (x + 1) (x - 4)$ 

هـ نا الحـ د المشـ ترك لجميع الحدود هو 4y وباستخراجه يتبقى لدينا شكل تربيعي للمتغير x نقوم بتحليله كما في السابق.

d) 
$$x^2 y^2 - y^2 - x^2 + 1 = (x^2 y^2 - y^2) - (x^2 - 1)$$

يلحظ هنا بأن الحد المشترك بين  $x^2y^2$  و  $x^2y^2$  و عند استخراجه يتبقى لدينا:

$$x^2y^2 - y^2 - x^2 + 1 = y^2(x^2 - 1) - (x^2 - 1)$$

في هذه المرحلة نلاحظ بأن الحد المشترك هو  $(x^2-1)$  وعند استخراجه نحصل على:

$$x^2y^2 - y^2 - x^2 + 1 = (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

وأخيراً وعند استخدام قانون الفرق بين مربعين نحصل على:

$$x^2y^2 - y^2 - x^2 + 1 = (x - 1)(x + 1)(y - 1)(y + 1)$$

مثال 33

حلل إلى العوامل Factor the following:

a) 
$$x^3 + y^3 = (x + y) (x^2 - xy + y^2)$$

b) 
$$x^3 - y^3 = (x - y) (x^2 + xy + y^2)$$

c) 
$$8 x^3 - 27 y^3 = (2 x)^3 - (3 y)^3$$
  
=  $(2 x - 3 y) [(2 x)^2 + (2 x) (3 y) + (3 y)^2]$   
=  $(2 x - 3 y) (4 x^2 + 6 x y + 9 y^2)$ 

وتم التحليل في هذا المثال باستخدام علاقة جمع مكعبين أو الفرق بين مكعبين.

$$59) \quad \frac{\frac{1}{2x} + \frac{1}{3x}}{\frac{1}{2y} - \frac{1}{3y}}$$

60) 
$$(\frac{xy}{5}) \div (\frac{1}{3} \div \frac{x}{y} - \frac{3x}{2})$$

### أوجد ناتج كل مما يلى Evaluate the following للأسئلة (74-61):

61) 
$$(2^3)^5 + (2^5)^2$$

62) 
$$(2^3)^5 \cdot (2^5)^2$$

63) 
$$(x^3)^4 + (x^{-3})^4$$

$$(x^3)^4 \cdot (x^{-3})^4$$

65) 
$$(xy^{-3})^{-1}$$

66) 
$$(xy^2z^2)^{-1}(xyz)^3$$

67) 
$$\frac{(2^4)^3}{4^3}$$

68) 
$$\frac{(3^3)^2}{3^4}$$

69) 
$$\frac{y^{-2}}{y^{-7}}$$

70) 
$$\frac{(-y^{-2})^{-3}}{(-y^{-1})^{-2}}$$

71) 
$$x^3 (x^{-2} - x)$$

72) 
$$3x^2(x^3 + 2x^{-2})$$

73) 
$$(2x)^{-1} + (2y)^{-1}$$

74) 
$$\frac{3y}{11x^3} + \frac{2}{5xy}$$

### بسط المقادير التالية Simplify the following expressions للأسئلة (75–94):

75) 
$$(x + y + 3) + (4x - 2y - 5)$$

76) 
$$(x^2 + xy - 2) - (x^2 - 4xy)$$

77) 
$$(2\sqrt{x} + 3\sqrt{y}) + (3\sqrt{x} - 2\sqrt{y})$$

78) 
$$(x + 4) (x - 5)$$

79) 
$$(2x + 1)(x + 2)$$

80) 
$$(5x - 1)(2y + 1)$$

81) 
$$(y^2 + 4) (y^2 - 3)$$

82) 
$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$$

83) 
$$(\sqrt{x} - 2\sqrt{y})(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})$$

84) 
$$(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})$$

85) 
$$(y^2 + 2y - 41) (y + 3y^2 + 1)$$
 86)  $(x^2 + \frac{1}{x})(x^2 - x^3 + 3)$ 

$$86) (x^2 + \frac{1}{x})(x^2 - x^3 + 3)$$

87) 
$$(2xy - \frac{x}{y})(4xy^2 + \frac{y}{x})$$

88) 
$$(x + 3)^2 + (y - 5)^2$$

89) 
$$(2x-3y)^2 - (x+y)^2$$

90) 
$$(4x^3 - 3x^2) \div x^2$$

91) 
$$(6x^2 + x - 1) \div (3x - 1)$$

92) 
$$(x^2 + 1) \div (x + 1)$$

93) 
$$(x^2 + 7x + 12) \div (x + 4)$$

94) 
$$(3x^2 - 3x - 6) \div (x - 2)$$

#### حلل إلى العوامل Factor the following للأسئلة (95-108):

95) 
$$15 x^2 + 3 x$$

97) 
$$x + x^2 + x^3 + x^4$$

99) 
$$x^2 - 9$$

101) 
$$5 x^4 - 20 y^4$$

103) 
$$x^2 - 5x + 6$$

105) 
$$x^2 + x - 12$$

$$107) 6x^2 - x - 12$$

96) 
$$2 x^2 y + 6 x$$

98) 
$$x(y + 1) - y(y + 1)$$

100) 
$$x^2 y^2 - 9$$

102) 
$$x^2 - 3x - 6$$

$$104) x^2 + 6x + 9$$

106) 
$$2x^2 - 8x + 8$$

108) 
$$x^3 - 8y^3$$

## الفصل الثاني

# معادلات بمتغير واحد

- 2-1 مقدمة
- 2-2 المعادلة الخطية
- 2-3 تطبيقات المعادلات الخطية
  - 4-2 المعادلات التربيعية
- 1-4-2 الحل بطريقة الجذر التربيعي
- 2-4-2 الحل بطريقة التجزئة إلى العوامل
- 3-4-2 الحل بطريقة المميز (الصيغة التربيعية)
  - 4-4-2 طريقة إكمال المربع

أسئلة الفصل الثاني

ارنية والإقتصادية

# الفصل الثاني مصادلات بمتضير واحد Equations in One Variable

# 1-2 مقدمة Introduction:

هذا الفصل سوف يتناول المعادلات Equations بشكليها المعادلات الخطية Linear Equations والمعادلات التربيعية Quadratic Equations والمعادلات التربيعية Linear Equations والمعادلات الله والمعادلات الله والمعادلات الله والمعادلات أو المعادلات أو المعادلات وكذلك المعادلات وكذلك المعادلات وكذلك الأمثلة المختلفة Solving the Equations المعادلات الأمثلة المختلفة Examples والتي تساعد في الاستفادة من مفهوم وكذلك الأمثلة التطبيقية والمستفادة التطبيقية والمعادلات المعادلات المعا

سيتضمن الفصل عدة مباحث وهي المبحث 2-2 المعادلة الخطية بمتغير واحد Linear equation in one variable والمبحث 3-2 تطبيقات المعادلات الخطية Applications of linear equations وأخيراً المبحث 4-2 المعادلات التربيعية Quadratic equations.

# 2-2 العادلة الخطية Linear Equation:

المعادلة هي صيغة تعبر عن المساواة بين مقدارين جبريين

The equation is a statement that expresses the equality of two algebraic expressions.

بصورة عامة المعادلة تتضمن متغير واحد أو أكثر One variable or more وتحتوي على رمز المساواة (=).

التالى أمثلة عن المعادلات The following are examples on equations:

سنقوم الآن بعرض بعض خصائص المساواة والتي ستكون ذات فائدة كبيرة في حل المعادلات الخطية كالآتي:

Equality properties:

For a, b and c real numbers we have:

1) If 
$$c = b$$
, then  $c + a = b + a$  Addition property

2) If 
$$c = b$$
, then  $c - a = b - a$  Subtraction property

3) If 
$$c = b$$
, then  $a c = a b$ ,  $a \ne 0$  Multiplication property

4) If 
$$c = b$$
, then  $\frac{c}{a} = \frac{b}{a}$ ,  $a \ne 0$  Division property

وبالتالي فإننا نستطيع أن نجمع (أو نطرح أو نضرب أو نقسم) ثابت أو أي حد جبري لطرفي المعادلة وتبقى المعادلة والنتائج كما هي بشرط عدم الضرب في (أو القسمة على) صفر.

We can add, subtract, multiply or divide any constant or any algebraic expression (non zero) to both sides of an equation.

الحالات التالية لتوضيح تلك الخصائص أعلاه:

for example, let x - 2 = 3

بإضافة 2 إلى طرفي المعادلة فإن ذلك لا يؤثر على حل المعادلة باستخدام خاصية الإضافة أعلاه

Adding 2 to both sides of this equation will not change the roots of this equation, by the addition principle, and we have:

$$x - 2 + 2 = 3 + 2$$

$$x = 5$$

Unique solution وهدذا يعني أن x = 5 هو حل المعادلة و هو الحل الوحيد x = 5 لهذه المعادلة.

As another example, let 3x = 9

وبتقسيم طرفي المعادلة على المعامل 3 فإن ذلك لا يؤثر على نتائج المعادلة، حيث أننا لم نقسم على صفر باستخدام خاصية القسمة

Dividing both sides of this equation by 3 will not change the roots of this equation, by the division property, and we have

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$$

$$x = 3$$

وهذا هو حل المعادلة الوحيد.

ونستطيع تطبيق جميع الخصائص السابق ذكرها بنفس الأسلوب. أما عن تعريف المعادلة الخطية من الدرجة الأولى فلدينا:

#### Definition:

An equation is a first degree or a linear equation in one variable X if it can be transformed into equation where the left side is of the form ax + b, a  $\neq$  0 and the right side is equal to zero, where a and b are real constants.

And this form is called the standard form of a linear equation.

وذلك يعني أن المعادلة الخطية بمتغير واحد هي المعادلة ذات الشكل العام ax + b = 0

for example: 4x + 8 = 0 is a linear equation in one variable and subtracting 8 from both sides gives

$$4 x = -8$$

Then, dividing both sides by 4 we get

$$x = -2$$

This is the only solution for the equation.

As another example we notice that x - 100 = 0 is also a linear equation in one variable.

Adding 100 to both sides fives x = 100 and this is the only solution for the equation.

في البداية نحتاج لضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك للمقامات و هو DM لنحصل علي:

$$M(y-2x) = 3 D(y-r)$$

$$My - 2 M x = 3 Dy = 3 D r$$

لحل الفرع (a) من المثال نعتبر جميع الحروف ثوابت باستثناء y فيعامل كمتغير:

$$M y - 3 D y = -3 D r + 2 M r$$
  
 $y (M - 3 D) = 2 M r - 3 D r$   
 $y = \frac{2Mr - 3Dr}{M - 3D}$ 

وهذا هو حل المعادلة للمتغير ٧.

أما لحل الفرع (b) من المثال فنعتبر جميع الحروف ثوابت باستثناء x فيعامل كمتغير:

$$-2 M x = 3 D y - 3 D r - M y$$
$$x = \frac{3Dy - 3Dr - My}{-2M}$$

وهذا هو حل المعادلة للمتغير x.

مثال 4

حل المعادلة لإيجاد قيمة Solve for x x حل المعادلة

$$M = \frac{y}{1-x}$$

بضرب طرفي المعادلة بالحد  $\frac{1-x}{M}$  نحصل على:

$$1 - x = \frac{y}{M}$$

$$-x = \frac{y}{M} - 1$$

$$x = 1 - \frac{y}{M}$$

وهذا هو حل المعادلة.

# 2-3 تطبيقات العادلات الخطية Application of Linear Equations

يمكن الاستفادة من مفهوم المعادلة الخطية لوصف كثير من التطبيقات ويمكن الاستعانة بطرق حلها لحل كثير من المشاكل التطبيقية وفي جميع الحقول العملية.

We can apply the linear equations in many applied problems by using the algebraic methods.

والأمثلة التي سيتم عرضها في هذا المبحث لتوضيح التطبيق حيث أن بعض من هذه الأمثلة لتوضيح عملية تحويل المشكلة من صيغتها الكلامية إلى صيغة المعادلات الخطية والبعض الآخر يظهر هذا الجانب إضافة إلى كيفية حل تلك المشاكل.

The following examples illustrate how to translate the verbal forms into algebraic terms, some of these examples are with their solutions.

مثال 5

إذا كان أحمد يحصل على x من مئات الدولارات في الشهر. ويحصل أخيه على 600 دولار أكثر من ضعف ما يحصل عليه أحمد. فما هو عدد الدولارات التي يحصل عليها كل منهما.

If Ahmed earns x hundred dollars per month and his brother is 6 hundred dollars more than twice Ahmed's earn. How many dollars each of them earns in the end of the month.

لكتابة هذا المثال بالصيغة الرياضية، نفرض أن أحمد يحصل على x من مئات الدو لارات. فإن أخوه سيحصل على (2x+6) من مئات الدو لارات.

If Ahmed earns x hundred dollars. Then, his brother earns (2x + 6) hundred dollars.

مثال 6

علي أكبر من أخيه بعشر سنوات. وقبل عشر سنوات كان عمر علي ضعف عمر أخيه. ما هو عمر على وعمر أخيه الآن وقبل عشر سنوات.

Ali is 10 years older than his brother. Ten years ago Ali was as twice as his brothers age. How old is Ali and his brother now and ten years ago.

لإيجاد عمر علي وعمر أخيه الآن وأيضاً عمر هما قبل عشر سنوات نفرض أن x يمثل عمر علي الآن. وأن عمر أخيه هو (x-10).

وقبل عشر سنوات كان عمر علي أقل بعشر سنوات مما هو الآن ولهذا فإن عمر علي قبل عشر سنوات كان (x-10). وكذلك فإن عمر أخيه كان أقل بعشر سنوات مما هو عليه الآن ولهذا فإن عمر أخيه قبل عشر سنوات كان (x-20) = (x-10-10)

وبما أن عمر علي كان ضعف twice عمر أخيه قبل عشر سنوات فإن:  $x-10=2\ (x-20)$ 

و لإيجاد عمر علي علينا إيجاد قيمة x كحل للمعادلة الأخيرة كالتالي: We slove for x to get:

$$x - 10 = 2 x - 40$$
  
 $x - 2 x = -40 + 10$   
 $-x = -30$   
 $x = 30$ 

أي أن عمر علي الآن هو 30 سنة وعمر أخيه هو 20 سنة. وقبل عشر سنوات كان عمر علي هو 20 سنة وعمر أخيه هو 10 سنوات.

#### مثال 7

الراتب الشهري إلى عمر هو 1600 دولار بالإضافة إلى عمولة بيع مقدارها 20%. وكان عمر يبيع بمعدل 80 دولار في الساعة. ما هو عدد الساعات التي يجب أن يعملها عمر ليحصل على مبلغ 3600 دولار شهرياً.

Omar earns salary of \$1600 per month plus a commission of 20% on the sales he makes. Omar find that on the average, he takes one hour to make \$80 worth of sales. How many hours must Omar work on the average each month to earn \$3600.

لكتابة المعلومات في هذا المثال بالصيغة الجبرية علينا أن نفرض أن عمر x من الساعات لكل شهر.

وكان يبيع بمبلغ 80 دو لار في الساعة الواحدة بعمولة بيع %20، لذلك فإن معدل عمولته في الساعة الواحدة هو:

$$(80)(20\%) = 16$$

وذلك يعني أن العمولة التي يحققها عندما يعمل x من الساعات هي 16x وبالتالي فإن عدد الساعات التي على عمر أن يعملها ليحقق ربحاً مقداره 3600 دو لار هو حل المعادلة التالية:

$$1600 + 16x = 3600$$

وباتباع الخطوات اللازمة لحل هذه المعادلة نجد ما يلي:

$$16x = 3600 - 1600$$

$$16x = 2000$$

$$x = 125$$

ويعني ذلك أن على عمر أن يعمل 125 ساعة شهرياً ليحقق مبلغ 3600 دو لار.

#### مثال 8

يلى:

تاجر سيارات اشترى 800 سيارة بسعر 700 دولار للسيارة الواحدة. باع منها 300 سيارة بربح %20. ما هو السعر الذي يجب عليه أن يبيع به الــ500 سيارة الباقية ليحقق ربحاً بمعدل %28 ولجميع السيارات.

A car dealer bought 800 cars for \$700 each. He sold 300 car of them at profit of 20%. At what price must be sell the remaining 500 cars if his average profit on the whole sales transaction is to be 28%.

علينا في البداية تحويل الصيغة الكلامية إلى الصيغة الجبرية بافتراض ما

كل سيارة باعها التاجر حقق فيها ربحاً مقداره %20 من سعر شراءها وهو \$700 وبالتالي فإن ربح كل سيارة باعها هو:

(20%)(700) = 140 dollars

ولهذا فإن الربح من بيع 300 سيارة هو:

(140)(300) = 42000 dollars

وبافتراض أن سعر بيع الـــ500 سيارة الباقية هو x دولار. فإن ربح التاجر لكــل ســيارة ســيكون (x-700) والذي يمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. وبالتالى فإن ربحه لجميع السيارات سيكون:

500 (x - 700) dollars

وأخيراً فإن مجموع الربح لجميع السيارات (800 سيارة) هو ربح بيع 300 سيارة وهو (x-700) \$500 مضافاً إليه ربح بيع 500 سيارة وهو (x-700) \$100 أي أن مجموع الربح هو:

42000 + 500 (x - 700) dollars

وبما أن الربح يجب أن يكون %28 من سعر الشراء لجميع السيارات ال-800. فإن هذا الربح سيساوي:

$$\frac{28}{100}$$
(700)(800) = 156800 dollars

وبالتالي فلتحديد سعر بيع السيارات المتبقية لتحقيق الربح المطلوب هو حل المعادلة التالية:

$$42000 + 500 (x - 700) = 156800$$

وباتباع الخطوات العامة لحل المعادلة الخطية بمتغير واحد لدينا:

$$42000 + 500 \times -350000 = 156800$$
  
 $500 \times = 156800 - 42000 + 350000$ 

$$500 \text{ x} = 464800$$

$$x = 929.6$$

ويعني ذلك أن سعر البيع هو \$929. لكل سيارة من السيارات الـ500 الباقية.

# مثال 9

يملك علي يرغب أن يحصل سنوياً على الملك علي يرغب أن يحصل سنوياً على \$4000 من هذا المبلغ. هو يستطيع أن يستثمر بنسبة 7% مع أصدقائه أو يستثمر مع شركة والتي هي أكثر خطورة بنسبة 10%. كيف يقسم علي المبلغ للاستثمار على النسب ليحقق الربح 4000 سنوياً وفي نفس الوقت يقلل الخسارة إلى أقل ما بمكن.

Ali has \$50000 to invest. He wants to receive an annual income of \$4000. He can invest his funds at 7% with friends bonds or with a greater risk company in 10% bonds. How should Ali invest his money in order to earn \$4000 and in the same time to minimize his risk.

لنفرض أن X يمثل المبلغ من الدو لارات التي استثمرت مع أصدقائه.

لذلك فإن المبلغ الذي استثمر مع الشركة الأكثر خطورة هو (50000-x) وأن المبلغ الذي سوف يستلمه علي من العمل مع الأصدقاء هو (x) أما المبلغ الذي سوف يستلمه من العمل مع الشركة الأكثر خطورة فهو

$$(\frac{10}{100})(50000 - x)$$

وبالتالي فإن مجموع المبلغ الذي سوف يستلمه على من الاستثمار مع المصدرين فهو:

$$(\frac{7}{100})(x) + \frac{10}{100}(50000 - x)$$

والذي يجب أن يكون 4000\$.

وبالتالي فإن المبلغ الذي يجب عليه استثماره هو إيجاد قيمة x والتي تحقق المعادلة الخطية بمتغير واحد التالية:

$$(\frac{7}{100})(x) + \frac{10}{100}(50000 - x) = 4000$$

وباتباع الخطوات اللازمة لحل هذه المعادلة لدينا:

$$7x + 10 (50000 - x) = 400000$$

$$7x + 500000 - 10x = 400000$$

$$7x - 10x = 400000 - 500000$$

$$-3x = -100000$$

$$x = 33333.333$$

ويعني ذلك أن على على أن يستثمر مع أصدقائه المبلغ \$3333333\$ وأن يستثمر مع الشركة الأكثر خطورة المبلغ \$16666.6667 ليحقق الدخل \$4000 من استثمار هذا المبلغ.

وفي حالة الرغبة في زيادة الدخل يجب أن يزيد من المبلغ المستثمر مع الشركة الأكثر خطورة.

# •Quadratic Equations العادلات التربيعية

المعادلة التربيعية لمتغير واحد Quadratic equation in one variable هي المعادلة التي يمكن كتابتها بالصيغة العامة التالية:

General form of a quadratic equation in one variable is:

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad , \qquad (a \neq 0)$$

a and b are real constants

وتدعي هذه الصيغة للمعادلة التربيعية بالصيغة القياسية Standard form. وهناك طرق عديدة لحل المعادلات التربيعية وسوف نتناول أربع طرق منها كالآتي:

There are four methods for solving the quadratic equation that will be presented in this section as follows:

1- Solution by square root.

الحل بو اسطة الجذر التربيعي.

2- Solution by factoring.

الحل بطريقة التجزئة إلى العوامل.

3- Solution by quadratic formula.

الحل بطريقة المميز.

4- Solution by completing the square.

الحل بطريقة إكمال المربع.

و V و V

وسيتم في هذا المبحث شرح وتعريف وتحديد خطوات كل واحدة من الطرق أعلاه مع الأمثلة الخاصة بكل حالة من الحالات ضمن الفقرات التالية:

# 2-4-1 الحل بطريقة الجذر التربيعي Solution by square root:

وبالرجوع لمعنى الجذر التربيعي يمكن الاستعانة بذلك لإيجاد حل المعادلات التربيعية والمثال التالي سيوضح ذلك:

The following example illustrate the square root method

مثال 10

حل المعادلات التالية باستخدام طريقة الجذر التربيعي

Solve the following quadratic equation using the square root method

a) 
$$x^2 - 13 = 0$$

وبإضافة 13 لطرفي المعادل نحصل على:

$$x^2 = 13$$

والآن ما هو العدد الحقيقي والذي تربيعه يساوي 13 لذلك فإن:

$$x = \mp \sqrt{13}$$

 $-\sqrt{13}$  ويعني ذلك أن حل المعادلة التربيعية هو  $\sqrt{13}$  أو

ويمكن كتابة هذا الحل بشكل ما يمثل مجموعة الحل set of general

solution كما يلى:

$$S = \{ +\sqrt{13}, -\sqrt{13} \}$$

b) 
$$2x^2 - 6 = 0$$

وبإضافة 6 لطرفي المعادلة نحصل على:

$$2x^2 = 6$$

وبالقسمة على 2 نحصل على:

$$x^2 = 3$$

والآن ما هو العدد الحقيقي والذي تربيعه يساوي 3 لذلك فإن:

$$x=\mp\sqrt{3}$$
 ويعني ذلك أن حل المعادلة التربيعية هو  $\sqrt{3}$  أو  $\sqrt{3}$  ويمكن كتابة مجموعة الحل بالشكل:

$$S = \{ +\sqrt{3}, -\sqrt{3} \}$$

c) 
$$3x^2 + 12 = 0$$

وبطرح 12 من طرفي المعادلة نحصل على:

$$3x^2 = -12$$

وبالقسمة على 3 نحصل على:

$$x^2 = -4$$

والآن ما هو العدد الحقيقي والذي تربيعه يساوي 4-، وبما أنه لا يوجد مثل هذا العدد لذلك لا يوجد حل حقيقي للمعادلة التربيعية هنا وعندئذ

There is no real solution.

# 2-4-2 الحل بطريقة التجزئة إلى العوامل Solution by factoring:

إذا كان الطريق الأيسر المعادلة التربيعية يمكن تجزئته أو تحليله عندئذ نستطيع حل المعادلة بهذه الطريقة

If the left side of a quadratic equation when written in standard form can be factored, then the equation can be solved very quickly.

وطريقة الحل بالتجزئة أو التحليل تعتمد على خاصية التحليل، والتي تم شرحها سابقاً وبالشكل التالي:

The method of solution by factoring depend on the following property of real numbers:

If A and B are real numbers. Then, AB = 0 if and only if A = 0 or B = 0, or both are zero.

وهـذا يعنـي إذا كان A و B عددان حقيقيان فإن حاصل ضربهما يساوي صفراً إذا وفقط إذا كان أي منهما أو كلاهما صفراً.

والمــثال التالــي سيوضح خصائص التحليل السابق ذكرها وحل المعادلات التـربيعية باستخدام طريقة التحليل لتحديد قيم المتغيرات فيها مستخدمين الخاصية أعلاه.

#### مثال 11

حل المعادلات التربيعية التالية باستخدام طريقة التحليل إن أمكن Solve the following quadratic equations by factoring, if possible:

a) 
$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

وبالرجوع لعمليات التحليل السابقة لدينا:

$$(x + 2) (x + 1) = 0$$

ولذلك فإن:

$$x + 2 = 0$$
 or  $x + 1 = 0$ 

وبالتالي فإن الحل هو:

$$x = -2$$
 or  $x = -1$ 

ويعني هذا أن الحل العام للمعادلة التربيعية هو المجموعة التالية:

$$S = \{-2, -1\}$$

b) 
$$3x^2 - 6x - 24 = 0$$

وبقسمة جميع حدود المعادلة على 3 نحصل على:

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

وباستخدام التحليل إلى العوامل لدينا:

$$(x + 2) (x - 4) = 0$$

ولذلك فإن:

$$x + 2 = 0$$
 or  $x - 4 = 0$ 

وبالتالي فإن الحل هو:

$$x = -2$$
 or  $x = 4$ 

ويعني هذا أن الحل العام للمعادلة التربيعية هو المجموعة التالية:

$$S = \{-2, 4\}$$

c) 
$$x^2 - 25 = 0$$

وباستخدام الفرق بين مربعين نحلل المعادلة أعلاه لنحصل على:

$$(x - 5)(x + 5) = 0$$

و لذلك فان:

$$x - 5 = 0$$

or

$$x + 5 = 0$$

وبالتالي فإن الحل هو:

$$x = 5$$

or

$$x = -5$$

ويعنى هذا أن الحل العام للمعادلة التربيعية هو المجموعة التالية:

$$S = \{-5, 5\}$$

ويجدر القول هنا بأن هذه المعادلة التربيعية  $x^2 - 25 = 0$  يمكن حلها

$$x = \pm 5$$
 وبالتالي فإن  $x^2 = 25$  وبالتالي فإن  $x = \pm 5$ 

وبهذا نقول بأنه يمكن حل معادلة تربيعية معينة بأكثر من طريقة من طرق حل المعادلات التربيعية.

We can solve a quadratic equation by one or more of the solving methods.

d) 
$$6y^2 = 4y$$

وبطرح 4y من طرفي المعادلة نحصل على:

$$6y_2 - 4y = 0$$

وباستخراج y كعامل مشترك نحصل على:

$$y(6y-4)=0$$

و لذلك فان:

$$6y - 4 = 0$$

or y = 0

$$6y = 4$$

or

 $y = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 

ويعنى هذا أن حل المعادلة التربيعية هو المجموعة:

$$S = \{0, \frac{2}{3}\}$$

e) 
$$6x^2 + 7x + 1 = 0$$

وباعتماد طريقة التحليل نحصل على:

$$(6x + 1)(x + 1) = 0$$

ولذلك فإن:

$$6x + 1 = 0$$

or x + 1 = 0

وبالتالي فإن الحل هو:

$$6x = -1$$

or 
$$x = -1$$

$$x = \frac{-1}{6}$$

ويعنى هذا أن حل المعادل التربيعية هو المجموعة:

$$S = \{-1, -\frac{1}{6}\}$$

# 3-4-2 الحل بطريقة المميز (الصيغة التربيعية):

#### Solution by Quadratic formula

طريقة المميز أو طريقة الصيغة التربيعية تعتبر من أكثر الطرق استخداماً وذلك الكونها طريقة يمكن بواسطتها حل جميع أنواع المعادلات التربيعية (من الدرجة الثانية)، حيث أنها تعتبر الطريقة الأنسب عندما تعجز الطرق الأخرى للوصول إلى الحل.

وبالرجوع إلى الصيغة العامة للمعادلات التربيعية وبالشكل:

$$ax^2 + bx + c = 0$$
 ,  $(a \neq 0)$ 

فإن تطبيق الصيغة التربيعية quadratic formula أو ما يسمى بطريقة المميز يكون كالآتى:

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ويمكن أن يكون لدينا تصور عن حل المعادلات من خلال ملاحظة المقدار ويمكن أن يكون لدينا تصور عن حل المقدار موجبة دل ذلك على أن هناك حلين حقيقيين  $b^2 - 4$  ac

للمعادلة التربيعية، وإذا كانت نتيجة هذا المقدار zero فيدل ذلك على وجود حل حقيقي واحد فقط للمعادلة التربيعية، أما إذا كانت نتيجة هذا المقدار سالبة فهذا يعني عدم وجود حل حقيقي للمعادلة التربيعية أو للمتغير.

والأمثلة التطبيقية التالية هي حالات مختلفة لحل المعادلات التربيعية بطريقة الصيغة التربيعية.

#### ا مثال 12

حل المعادلة التربيعية التالية باستخدام طريقة الصيغة التربيعية Solve the following quadratic equation using the quadratic formula  $x^2-2x-1=0$ 

بمقارنة بشكل المعادلة التربيعية أعلاه مع الشكل العام للمعادلة التربيعية نلحظ أن:

$$a=1$$
 ,  $b=2$  , and  $c=-1$ 

وبالتالي فإن:

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-2) \mp \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-1)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{2 \mp \sqrt{4 + 4}}{2} = \frac{2 \mp \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \mp 2\sqrt{2}}{2} = 1 \mp \sqrt{2}$$

 $1+\sqrt{2}$  or  $1-\sqrt{2}$  هذا وجود حلين للمعادلة التربيعية هما وجود حلين المعادلة التربيعية و

وللتأكد من الحل نعوض في المعادلة الأصلية عن x كالآتي:

$$x^{2} - 2x - 1 = 0$$
 when  $x = 1 + \sqrt{2}$  we have

$$(1+\sqrt{2})^2-2(1+\sqrt{2})-1=0$$

$$1 + 2\sqrt{2} + 2 - 2 - 2\sqrt{2} - 1 = 0$$

$$0 = 0$$

وهذا يعني أن الحل صحيح.

also, 
$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

when  $x = 1 - \sqrt{2}$  we have

$$(1-\sqrt{2})^2-2(1-\sqrt{2})-1=0$$

$$1 - 2\sqrt{2} + 2 - 2 + 2\sqrt{2} - 1 = 0$$

$$0 = 0$$

وهذا يعنى أن الحل صحيح.

#### مثال 13

حل المعادلة التربيعية التالية باستخدام الصيغة التربيعية

Solve the following quadratic equation using the quadratic formula

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

وبمقارنة هذه الدالة التربيعية بالشكل العام للدالة التربيعية نجد أن:

$$a = 1$$
.

$$b = -4$$

a = 1 , b = -4 , and c = 4

وبالتعويض في الصيغة التربيعية نجد أن:

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-4) \mp \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(4)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{4 \mp \sqrt{16 - 16}}{2} = \frac{4 \mp \sqrt{0}}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

x = 2 ويعني هذا أن حل المعادلة التربيعية هو حل واحد حقيقي وهو أن و السبب في ذلك أن قيمة  $b^2 - 4$  ac تساوي صفر أ.

وللتأكد من الحل نعوض في المعادلة التربيعية الأصلية عن قيمة x بــ2 لنحصل على:

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$2^2 + 4(2) + 4 = 0$$

$$4 - 8 + 4 = 0$$

$$0 = 0$$

مثال 14

حل المعادلة التربيعية التالية باستخدام الصيغة التربيعية

Solve the following quadratic equation using the quadratic formula

$$3x^2 - 5x + 6 = 0$$

وبمقارنة هذه المعادلة التربيعية بالشكل العام نجد أن:

$$a = 3$$
 ,  $b = -5$  , and  $c = 6$ 

وبالتعويض في الصيغة التربيعية نجد أن:

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-5) \mp \sqrt{(-5)^2 - 4(3)(6)}}{2(6)}$$

$$x = \frac{5 \mp \sqrt{25 - 72}}{12} = \frac{5 \mp \sqrt{-47}}{12}$$

لا يـوجد حل حقيقي لهذه المعادلة التربيعية وذلك لكون المقدار داخل الجذر سالك.

# :Completing the Square Method طريقة إكمال المربع 2-4-4

تعتبر طريقة إكمال المربع من الطرق المهمة لحل المعادلات التربيعية وذلك لكونها أيضاً تستخدم لمعظم المعادلات التربيعية. وتستند هذه الطريقة على تحويل الشكل العام للمعادلة التربيعية  $ax^2 + bx + c = 0$  إلى معادلة طرفها الأيسر على شكل مربع كامل، أما طرفها الأيمن فيحتوي على الثابت المتبقي من المعادلة لتصبح بالشكل  $(X + A)^2 = B$ 

This method is based on the process of arranging the equation of the standard form  $ax^2 + bx + c = 0$  into the form  $(X + A)^2 = B$ , where A and B are real constants.

وبعدئَ نقوم بحل المعادلة بعد أخذ الجذر لطرفي المعادلة وإكمال عملية التبسيط لإيجاد قيم المتغير إن كانت له قيم حقيقية.

The equation can be solved by taking the square root of both sides of the equation, if it has a real solution.

والأمثلة التالية تطبيقات لهذه الطريقة كالآتى:

ا مثال 15 ا

حل المعادلة التربيعية التالية باستخدام طريقة إكمال المربع

Solve the following quadratic equation using completing the square method

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

بإضافة الثابت 1 لطرفي المعادلة نحصل على:

$$x^2 - 2x = 1$$

نحاول إيجاد العدد الحقيقي الذي يمكن إضافته لطرفي المعادلة ويجعل الطرف الأيسر مربعاً كاملاً.

والقاعدة (Rule):

أ- عـندما يكون معامل  $x^2$  هو 1 نقوم بقسمة معامل x على 2 ثم نربع ذلك المقدار .

 $x^2$  لا يساوي 1 فنقسم جميع أطراف المعادلة  $x^2$  لا يساوي 1 فنقسم جميع أطراف المعادلة على على هذا المعامل ليصبح المعامل الجديد  $x^2$  هو 1. ثم نقوم بتطبيق الفقرة (أ) أعلاه.

وبالرجوع للمعادلة في هذا المثال لدينا:

$$x^2 - 2x = 1$$

أي أن معامل  $x^2$  يساوي 1 وأن معامل x هو  $x^2$  ولذلك فإننا سنقوم بإضافة لحد  $(-1)^2 = (-1)^2 = (1-1)^2$  الحد

$$x^2 - 2x + 1 = 1 + 1$$

$$x^2 - 2x + 1 = 2$$

وباستخدام المربع الكامل نحصل على:

$$(x-1)^2 = 2$$

وبأخذ الجذر لطرفي المعادلة نحصل على:

$$x - 1 = \mp \sqrt{2}$$

وبالتالي فإن:

$$x - 1 = -\sqrt{2}$$

or

$$x - 1 = \sqrt{2}$$

ن:

$$x = 1 - \sqrt{2}$$

or

$$x = 1 + \sqrt{2}$$

 $1-\sqrt{2}$  or  $1+\sqrt{2}$  هما ويعني ذلك وجود حلين للمعادلة التربيعية هما

مثال 16

حل المعادلة التربيعية التالية باستخدام طريقة إكمال المربع

Solve the following quadratic equation using the completing square method

$$2x^2 - 8x + 3 = 0$$

بطرق الثابت 3 من طرفي المعادلة نحصل على:

$$2x^2 - 8 = -3$$

وبقسمة طرفي المعادلة على 2 نحصل على:

$$x^2 - 4x = \frac{-3}{2}$$

نضيف الثابت لإكمال المربع وباتباع القاعدة السابقة بالشكل

$$\left(\frac{-4}{2}\right)^2 = (-2)^2 = 4$$

إلى طرفي المعادلة لنحصل على:

$$x^2 - 4x + 4 = \frac{-3}{2} + 4$$

$$x^2 - 4x + 4 = \frac{5}{2}$$

وبإكمال المربع نحصل على:

$$(x-2)^2 = \frac{5}{2}$$

أي أن:

$$x - 2 = \mp \sqrt{\frac{5}{2}}$$

وبالتالي فإن:

$$x - 2 = -\sqrt{\frac{5}{2}}$$

or

$$x - 2 = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

أي أن:

$$x = 2 - \sqrt{\frac{5}{2}}$$

or

$$x = 2 + \sqrt{\frac{5}{2}}$$

ويعني هذا أن هناك حلين حقيقيين للمعادلة التربيعية هما:  $x = 2 - \sqrt{\frac{5}{2}} \qquad \text{or} \qquad x = 2 + \sqrt{\frac{5}{2}}$ 

$$x = 2 - \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$x = 2 + \sqrt{\frac{5}{2}}$$

ويمكن تلخيص الخطوات الواجب اتباعها لحل المعادلات التربيعية بطريقة إكمال المربع كالآتى:

The following are the steps to solve the quadratic equation by completing the square method

1- الخطوة الأولى: نضيف ثابت اطرفي المعادلة لحذف الثابت الموجود في طرفها الأسر

Add constant to both sides of the equation to remove the constant term from the left side.

 $x^2$  الخطوة الثانية: نقسم على معامل  $x^2$  إذا كان المعامل x بساوى و احد لحعله واحد

Divide by the coefficient of  $x^2$  if it is not equal to one.

3- الخطوة الثالثة: لإكمال المربع للطرف الأيسر للمعادلة يجب إضافة ثابت نحصل عليه من قسمة معامل x على 2 ثم نربع المقدار

To complete the square in equation, add the square of one – half the coefficient of x to both sides.

4- الخطوة السرابعة: بعد أن يصبح الطرف الأيسر للمعادلة مربعاً كاملاً نأخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة ثم نقوم بتبسيط الناتج لإيجاد الحل أو الحلول للمعادلة التربيعية

Now the left side is a complete square, take the square root to both sides and complete the solution.

# أسئلق الفصل الثانح **Exercises for chapter two**

حل المعادلات التالية للأسئلة (1-11):

#### Solve the following equations

1) 
$$1 + Y = 5 - Y$$

2) 
$$2Y - 5 = -3Y - 15$$

3) 
$$4Y - 5(1 - 3Y) = 1 - 3(1 - 4Y)$$

4) 
$$3x - 2 + 4(1 - x) = 5(1 - 2x) - 12$$

5) 
$$6[2x + 1 - 2(2x - 1)] + 4 = 4[1 + 2(3 - x)]$$

6) 
$$\frac{3Y-7}{2} = \frac{Y+1}{3}$$

7) 
$$1 - \frac{2x - 3}{4} = \frac{2 - 5x}{3} - 3x$$

8) 
$$\frac{1}{3}(2x+1) + \frac{1}{2}x = \frac{2}{3}(1-2x) - 4$$

9) 
$$\frac{1}{c} + \frac{1}{x} = \frac{1}{8}$$

(a) for c

(b) for z

10) 
$$\frac{2}{z} + \frac{3}{zt} = 1$$

; (a) for z,

(b) for t

11) 
$$z = \frac{x - ty}{1 - t}$$

(a) for t , (b) for y

حل التطبيقات التالية للأسئلة (12-14):

# Solve the following applications

12) قبل خمس سنوات، عمر أحمد كان ضعف عمر على. أوجد عمر أحمد الآن إذا كان مجموع عمر هما اليوم يساوي (43) سنة.

Five years ago, Ahmed was twice as old as Ali. Find the present age of Ahmed if the sum of their ages today is (43) years.

13) استثمر علي مبلغ بنسبة 10% والذي يمثل ضعفين ما استثمره بسبة 7%.

مجموع ما حصل عليه عمر لسنة كاملة من الاستثمارين هو \$1200. ما

هو المبلغ المستثمر لكل نسبة من النسب؟

Omar invests twice as much at 10% as he invested at 7%. His total annual income from the two investments is 1200\$. How much is invested at each rate?

14) استثمر محمد مبلغ 5000\$ لنسبة 10% أكثر من نسبة 15%، ومجموع ما حصل عليه لسنة واحدة من الاستثمار هو 1500\$. ما هو المبلغ الذي استثمر لكل نسبة من النسب؟

Mohamed invested 5000\$ more at 10% than at 15%, and received a total interest income of 1500\$ for one year. How much did he invest at each rate?

حل المعادلات التربيعية التالية بأي من الطرق المناسبة للأسئلة (15–39): Solve the following quadratice equations by any appropriate method

15) 
$$15x^2 = 30 (x + 2)$$

16) 
$$3x(2x-6) = -2x + 3$$

17) 
$$x^2 = 4(x-1)(x-2)$$

18) 
$$2x^2 - 6x - 4 = 0$$

19) 
$$3x^2 = 12x - 4$$

20) 
$$(2x +3) (x +1) = (x +2) (x -3) + 4$$

$$21) 2x^2 + 12x - 2 = 0$$

22) 
$$2x^2 + 4x - 8 = 0$$

23) 
$$2x^2 - 6x - 2 = 0$$

24) 
$$2x^2 + 10x + 10 = 0$$

$$25) 4x^2 - 8x = 3$$

26) 
$$14x + 6(x^2 - 5) = 2x - 6$$

$$27) 2x^2 + 6x + 2 = 0$$

28) 
$$4x^2 + 6x - 8 = 0$$

29) 
$$2x^2 + 2x - 6 = 0$$

30) 
$$2x^2 + 10x + 12 = 0$$

31) 
$$6x(x+2) + 7 = 4$$

32) 
$$(x + 1)^2 = 2 (x - 1)^2$$

33) 
$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

34) 
$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

35) 
$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$36) x^2 + 4x + 4 = 0$$

37) 
$$2x^2 + 5x + 3 = 0$$

38) 
$$(x + 3) (x - 3) = x - 9$$

39) 
$$2x^2 + 2x - 3 = 0$$

# الفصل الثالث

# المتباينات

- 3-1 مقدمة
- 2-3 المجموعات ونظرية المجموعات
  - 3-3 الفترات
- 4-3 المتباينات الخطية بمتغير واحد
- 5-3 المتباينات التربيعية بمتغير واحد
  - 6-3 القيم المطلقة
  - أسئلة الفصل الثالث

THE THE TOTAL PARTS.

# الفصل الثالث المتباينـــــات Inequalities

# 1-3 مقدمة Introduction:

تم في الفصل الأول التعرف على الأعداد الحقيقية تم التعرف على معنى الأعداد الحقيقية Their Properties وخصائصها العامة Their Properties وفي الفصل الثاني تم التعرف على المعادلات الحقيقية Meaning of Reals. وفي الفصل الخطية والتربيعية لمتغير واحد Their Solving Methods وفي هذا الفصل Variable وطرق الحل المناسبة لها Their Solving Methods. وفي هذا الفصل المعالمة التعرف على مفاهيم رياضية جديدة Wew Mathematical Concepts على المجموعات Sets وثيقة بتعريف وخصائص ومعنى الأعداد الحقيقية ألا وهي المجموعات Sets والفترات المتعالمة والمتبايات الخطية والتربيعية بمتغير واحد Linear and والمتبايات الخطية والتربيعية بمتغير واحد Quadratic Inequalities In One Variable ورموزها واستخداماتها وتطبيقاتها الكثيرة. وكذلك سيتم حل كثير من الأمناة Examples والأمناء التطبيقية. وسيحتوي الفصل التطبيقية، وسيحتوي الفصل في نهايته على كثير من الأسئلة Exercises.

سيتضمن الفصل عدة مباحث وهي المبحث 3-2 المجموعات Sets ونظرية عالمجموعات Set Theory ونظرية المجموعات Intervals والمبحث 3-4 المجموعات Set Theory والمبحث المتبايات الخطية بمتغير واحد Linear Inequality In One Variable والمبحث 3-5 المتبايات التربيعية بمتغير واحد Absolute Values.

# 3-2 الجموعات Sets:

# ونظرية الجموعات Set theory:

سنبدأ الحديث عن المجموعات Sets وطرق التعامل معها How to Deal وطرق التعامل معها Sets تعريف with Sets والعلاقات التي تخصها Their Relationships بمحاولة تعريف المجموعة set ولاً كالآتى:

Set: Any well-defined collection of objects, These objects are called members or elements of that set.

These members or elements usually written within this kind of parentheses  $\{ \}$  to designate a set using one of these letters A, B, C, D, ... or if the number of sets are very big, then we usually use the letters  $A_1, A_2, A_3, \ldots$  to designate our sets.

#### **Examples of sets:**

- 1) The set of all students in Math. course.
- 2) The football team in a university.
- 3) The set of all households in Amman.
- 4) The set of Integer numbers.

ويلاحظ من الأمثلة أعلاه أن المجموعة set هي تجمع من مفردات ويلاحظ من الأمثلة أعلاه أن المجموعة فريق كرة elements يفترض أن يكون لها صفة أو صفات مشتركة، فمجموعة فريق كرة القدم في الجامعة واللذين يلعبون ضمن نفس الطلبة في الجامعة واللذين يلعبون ضمن نفس الفريق، أما مجموعة الأعداد الصحيحة فهي جميع الأعداد الصحيحة التي تم التعرف إليها سابقاً وهكذا لوصف بقية المجموعات ومماثلاتها.

وحيث أننا سندرس المجموعات ضمن مادة الرياضيات من خلال هذا الكتاب لذلك سيتم التركيز هنا لكتابة والتعامل مع مجموعات الأعداد.

أما عن طرق كتابة المجموعات Methods for writing sets.

#### 1) Listing Method:

if it is possible to specify all elements of a set, then, we can use this method to describe the set by listing all the elements and enclosing the list inside braces.

The general form of listing the elements  $a_1$  ,  $a_2$  ,  $a_3$  , ... ,  $a_n$  inside the set A, me have:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$$

where,  $a_i$  , i=1 , 2 , 3 ,  $\dots$  , n  $\;$  are called members or elements of the set.

We say that element  $a_i$  is a member of (belongs to) the set A, and write  $a_i \in A$ .

for example, set A consists of the elements 1, 2, 3. Then, we write  $A = \{1, 2, 3\}$ , and  $1 \in A$ ,  $2 \in A$ , and  $3 \in A$ .

#### 2) Rule Method:

if it is not possible or in which it would be inconvenient to list all members or elements of a particular set. Then, we can use what is called the Rule – Method. In which, we have to specify and state a rule for membership of the elements in the set.

For example to write the set of real numbers between the two numbers a and b. Then, we use

$$A = \{ x \mid a < x < b , where a and b are reals \}$$

#### 3) Venn - Diagram:

this method is to present the set by a graph, this graph may be a rectangular or a circle to designate the set and then specify all elements in side this set. Also, this graph maybe the real line and all sets can be presented by the specified points or intervals on this line.

The general form for Venn – Diagram may be:

سنقوم الآن وبعض استعراض طرق عرض المجموعات بالتعامل مع بعض الأمثلة المناسبة لتعريف وكتابة مجموعات الأعداد وكالآتي:

#### مثال 1

Write the set of Natural Numbers الأعداد الطبيعية

الأعداد الطبيعية وكما تم وصفها سابقاً هي الأعداد ..., 2, 2, 1, ويرمز لمجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز N وستمثل المجموعة التالية:

$$N = \{1, 2, 3, ...\}$$

#### مثال 2

Write the set of Integer Numbers الأعداد الصحيحة

الأعداد الصحيحة وكما تم وصفها سابقاً هي الأعداد الطبيعية N ومماثلاتها من القيم السالبة ونقطة الصفر، ويرمز لمجموعة الأعداد الصحيحة بالرمز I وستمثل المجموعة التالية:

$$I = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}$$

#### مثال 3

Write the set of odd Naturals الأعداد الطبيعية الفردية

هذه المجموعة هي جزء Subset من الأعداد الطبيعية السابقة الذكر N والتي لها خاصية أن تكون تلك الفردية منها وبالتالي فإن هذه المجموعة ولتكن  $A=\{1,3,5,7,\ldots\}$ 

#### مثال 4

اكتب مجموعة الأعداد الطبيعية بين العددين 2, 7

Write the set of Naturals between 2 and 7

لكتابة هذه المجموعة علينا تمييز أربعة حالات مختلفة كالآتي:

a) Both 2 and 7 are included in the set, say A, then:

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

b) Both 2 and 7 are not included in the set, say B, then:

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

c) 2 is included in the set, say C, but 7 is not, then:

$$C = \{2, 3, 45, 6\}$$

d) 7 is included in the set, say D, but 2 is not, then:

$$D = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

ويلاحظ من خلال الحالات أعلاه أن هناك فرق واضح في وصف المجموعات من خلال المفردات الداخلة فيها عن طريق وصف تلك المجموعات القائمة Listing the elements.

مثال 5

Write the set of Real Numbers الأعداد الحقيقية

وكما تم وصف الأعداد الحقيقية سابقاً والتي لا يمكن تمييز مفرداتها وبالتالي فإننا لا نستطيع استخدام طريقة القائمة Listing والتي تم اعتمادها للأمثلة السابقة وذلك اصبعوبة تحديد جميع العناصر الداخلة ضمن هذه المجموعة. ولذلك يجب علينا استخدام طريقة القاعدة Rule بالشكل التالي:

$$R = \{ |x| - \infty < x < \infty \}$$

مثال 6

اكتب مجموعة الأعداد الحقيقية وارسمها بين العددين 2 و 7 Write and graph the set of Reals between 2 and 7

وكما تلام ملاحظته ضمن مثال (4) السابق فإن هناك أربعة حالات مختلفة يمكن تمييز ها كالآتى:

a) 2 and 7 are included in the set, say  $A_1$ , then:

$$A_1 = \{ x \mid 2 \le x \le 7, x \text{ is real number } \}$$

b) 2 and 7 not included in the set, say A<sub>2</sub>, then:

$$A_2 = \{ x \mid 2 < x < 7, x \text{ is real number } \}$$

c) 2 is included in the set, say A<sub>3</sub>, but 7 is not, then:


$$A_3 = \{ x \mid 2 \le x < 7, x \text{ is real number } \}$$

d) 7 is included in the set, say A<sub>4</sub>, but 2 is not, then:

$$A_4 = \{ x \mid 2 < x \le 7, x \text{ is real number } \}$$

وهنا أيضاً يمكن ملحظة أن الحالات الأربعة أعلاه تعطي مجموعات

أما عن رسم هذه المجمو عات فلدينا:



سنقوم الآن بتعريف وتسمية عدد من المجموعات بأسماء محددة وأشكال معينة ورموز معتمدة كالآتي:

**Identity Set:** A set that contains only one element such as  $A = \{1\}$ ,  $B = \{0\}$ , and  $C = \{c\}$ 

Empty Set: A set that contains no elements, denoted by  $\varphi$  , which is also called the null set. Such as


 $A = \{ x \mid x \text{ is an integer between 7 and 8} \}$ 

 $B = \{ x \mid x \text{ is a real number and } x^2 = -1 \}$ 

Universal Set: A set that contains all subsets and all elements of a given study, denoted by U or S. This set is also called a Sample Space, denoted by  $\Omega$ .

**Subset:** A set A is said to be a subset of another set B if every element of A is also an element of B. In such a case, we write  $A \subseteq B$ .

This relationship can be presented by Venn-diagram as follows:



Note: From the above definitions, we can notice that:

- 1) Any set A is a subset of the Universal set U

  That is ,  $A \subseteq U$
- 2) Any set A is a subset of itself.

That is,  $A \subseteq A$ 

3) An empty set  $\phi$  is a subset of any set A.

That is,  $\phi \subseteq A$ 

Therefore, we can say, in general,  $\phi \subseteq A \subseteq U$ 

مثال 7

اكتب المجموعات الجزئية للأعداد 1,2,3

Write all subsets of 1, 2, 3


وهنا يمكن القول بأن المجموعات الجزئية subsets والتي يمكن تكوينها من استخدام الأعداد 0,2,3 هي تبدأ من أصغر مجموعة وهي 0

ثـم نأخـذ الأعداد كلاً على حدة لتكون المجموعات  $\{1\}$ ،  $\{2\}$ ،  $\{3\}$  ثم نأخذ الأعداد كل اثنين مع بعض لنحصل على المجموعات  $\{2, 1\}$ ،  $\{3, 1\}$ ،  $\{3, 2\}$  وأخيراً نأخذ الأعداد الثلاثة مع بعضها لتكون المجموعة الأكبر  $\{1, 2, 3\}$  وبالتالى فإن المجموعات الجزئية هي:

Subsets:  $\phi$ ,  $\{1\}$ ,  $\{2\}$ ,  $\{3\}$ ,  $\{1,2\}$ ,  $\{1,3\}$ ,  $\{2,3\}$ , U

أما عن العلاقات التي يمكن ملاحظتها للمجموعات Relationships on Sets:


1) Intersection: The intersection of two sets A and B, denoted by  $A \cap B$  is the set that contains all elements in A and in B presented as



2) Union: The union of two sets A and B, denoted by  $A \cup B$  is the set that contains all elements that are in A or in B or in both presented as:




3) Complement: The complement of a set A, denoted by  $\overline{A}$  or  $A^c$ , is the set of all elements that are in U, but not is A presented as:




- 4) Equal: Two sets A and B are said to be equal if  $A \subseteq B$  and  $B \subseteq A$ . In such a case we write A = B.
- 5) Mutually Exclusive: Two sets A and B are said to be mutually exclusive (or disjoint) if and only if  $A \cap B = \phi$  presented as:

or



U



ويلاحظ أن الفرق بين الشكلين أن  $U = A \cup B$  للحالة التي في الجهة اليمنى، أما الأخرى فليست كذلك.

باستخدام العلاقات السابقة التعريف هناك بعض العلاقات التي نستطيع إيجادها أو تحديدها من ذلك وهي كالآتي:

1) 
$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

2) 
$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

وتسمى خاصية التبادل Commutative laws

3) 
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

وتسمى خاصية التشارك Associative laws

4) 
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

وتسمى خاصية التوزيع Distributive laws

5) 
$$A \cup U = U$$

$$A \cup \phi = A$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cap \phi = \phi$$

وتسمى خاصية الوحدة Identity laws

6) 
$$A \cup A^c = \Omega$$

$$A \cap A^c = \phi$$

وتسمى خاصية المتممة Complement laws

7) 
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

وتسمى قوانين دي مور غان Demorgan's laws

أما عن بعض الأمثلة التي تستخدم الخصائص والتسميات أعلاه فيمكن عرضها كالآتى:

مثال 8

افترض أن U = I وافترض المجموعات الجزئية التالية:

A the set of integers greater than or equal -2 and less than 5.

B the set of integers greater than or equal 0.

N the Natural set.

حدد العلاقات وأوجد المجموعات التي يمكن الحصول عليها من المجموعات أعلاه.

 $U = I = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ 

في هذا المثال لدينا المجموعات التالية:

 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ 

 $B = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$ 

 $N = \{1, 2, 3, 4, ...\}$ 

 $N\cap B=N$  و فلاحظ هنا أن  $N \subset B$  و هذا يعني  $N \subset B$ 

وكذلك لدينا ما يلى من العلاقات:

 $A \cap B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 

 $A \cup B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$ 

 $A \cap N = \{1, 2, 3, 4\}$ 

 $A \cup N = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ 

 $A \cup B = A \cup N$ 

 $A^{c} = \{..., -4, -3, 5, 6, ...\}$ 

 $B^c = \{ \dots, -3, -2, -1 \}$ 

مثال 9

U=R افترض أن U تمثل مجموعة الأعداد الحقيقية

و افترض أن:

 $A = \{ x \mid 1 \le x \le 2 \}$ 

 $B = \{ x \mid 1.5 \le x < 3 \}$ 

 $^{1}$  C = { x | 1 \le x \le 4 }

$$D = \{x \mid x \ge 4\}$$

حدد العلاقات وأوجد المجموعات التي يمكن الحصول عليها من المجموعات أعلاه.

نلاحظ هنا أن  $A \subset C$  و هذا يعني أن  $A \cup C = C$  و للحظ أيضًا أن  $A \cap C = A$  وهذا يعني أن  $A \cap D = A$  متنافيتان وكذلك لدينا ما يلي من العلاقات:

$$A \cap B = \{ x \mid 1.5 \le x \le 2 \}$$

$$A \cup B = \{ x \mid 1 \le x < 3 \}$$

$$C \cap D = \{ x \mid x = 4 \} = \{4\}$$

$$C \cup D = \{ x \mid 1 \le x < \infty \}$$

$$A \cup D = \{ x \mid 1 \le x \le 2 \} \cup \{ x \mid 1 \ge 4 \}$$

$$A^{c} = \{ x \mid -\infty < x < 1 \} \cup \{ x \mid 2 < x < \infty \}$$

$$B^{c} = \{ x \mid -\infty < x < 1.5 \} \cup \{ x \mid 3 \le x < \infty \}$$

$$C^{c} = \{ x \mid -\infty < x < 1 \} \cup \{ x \mid 4 < x < \infty \}$$

$$D^{c} = \{ x \mid x < 4 \}$$

مثال 10

أوجد العلاقات التي تربط بين المجموعات التالية:

Find all relationships between the following sets

a) Let 
$$A = \{ 1, 3, 5 \}$$
 and  $B = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$   
we notice here that  $A \subseteq B$ 

b) Let 
$$A = \{-2, +2\}$$
 and  $B = \{x \mid x^2 = 4\}$ 

solving the quadratic equation  $x^2 = 4$  gives the solution  $x = \pm 2$ . Therefore, A = B

# 3-3 الفترات Intervals:

كما رأينا سابقاً وعند الحديث عن خاصية الترتيب لمجموعات الأعداد وبالأخص الأعداد الحقيقية Properties in Real Numbers هي:

If a and b are real numbers, such that a is less than b. Then, we write a < b which is called an inequality.

وفي هذا المبحث سنركز على وصف هذه المتباينة ومماثلاتها بشكل فترات Intervals كالآتى:

a) If a and b are real numbers, such that a < b. Then, the open interval from a to b, denoted by (a, b), is the set of all real numbers x that lie between a and b. Thus,

(a, b) = 
$$\{x \mid x \text{ is real number and } a < x < b\}$$

b) Similarly, the closed interval from a to b, denoted by [a, b], is the set of all real numbers that lie between a and b together with a and b included. Thus,

$$[a, b] = \{x \mid x \text{ is real number and } a \le x \le b\}$$

c) Semi closed or Semi open intervals are defined as follows:

$$[a, b) = \{x \mid x \text{ is real number and } a \le x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \mid \text{is real number and } a < x \le b\}$$

لجميع الفترات الأربعة (a, b)، [a, b]، [a, b]، و (a, b) الحدان b, a الجميع الفترات الأربعة (a, b)، و (a, b)، و (a, b) (a

ويلاحظ هنا مدى التشابه الكبير بين قراءة ورسم الفترات وتعريف المجموعات كما تم في المبحث السابق.

Unbounded ويجب الإشارة هنا إلى أنه هناك بعض الفترات الغير محدودة ويجب الإشارة هنا إلى أنه هناك بعض الشكل أن تبدأ بقيمة معينة وتكون مفتوحة إلى  $\infty$ + أو أن تبدأ من  $\infty$ - وتنتهى بقيمة معينة. ومن أشكال هذه الفترات التالى:

a) 
$$(a, \infty) = \{x : x > a\}$$

b) 
$$[a, \infty) = \{x : x \ge a\}$$

c) 
$$[-\infty, b] = \{x : x < b\}$$

d) 
$$(-\infty, b] = \{x : x \le b\}$$

وفي نهاية المبحث سنعرض بعض الأمثلة المناسبة لقراءة الفترات ورسمها وعلاقاتها كالآتي:

#### مثال 11

write the following in the interval form: اكتب التالى بشكل فترات

a) 
$$2 \le x \le 8$$

الفترة التي تمثل هذه القيم هي الفترة المغلقة بالشكل:

$$[2, 8] = \{x : 2 \le x \le 8\}$$

و رسمها بالشكل:

b) x > -4

هذه الفترة المفتوحة تمثل جميع القيم الحقيقية والتي تبدأ من القيمة 4-بالشكل:

$$(-4, \infty) = \{x : -4 < x < \infty\} = \{x : x > -4\}$$

ورسمها بالشكل:

# 3-4 التباينات الخطية بمتغير واحد:

# Linear Inequalities in one variable

بالرجوع لتعريف المعادلة الخطية بمتغير واحد Linear equation in one variable، وكما رأينا سابقاً، يمكن تعريف المتباينة الخطية بمتغير واحد ضمن هذا المبحث حيث أن الشكل العام للمتباينة بمتغير واحد هو أحد الحالات التالية:

$$ax + b < 0$$

or

ax + b > 0

$$ax + b \le 0$$

or

 $ax + b \ge 0$ 

where  $a \neq 0$ , a and b are real numbers.

وكما تم تعريف حل المعادلة الخطية يتم تعريف حل المتباينة الخطية بأحد الأشكال التالية:

General form for the solution of Linear inequality in one variable:

$$x < -\frac{b}{a}$$

or  $x > -\frac{b}{a}$ 

$$x \le -\frac{b}{a}$$

or

$$x \ge -\frac{b}{a}$$

ولا بد من الإشارة هنا إلى الرجوع للقوانين التي سبق ذكرها في خاصية الترتيب المتعلقة بمجموعة الأعداد الحقيقية عندحل الأمثلة والتي سيتم عرضها كالآتى:

مثال 12

أوجد حل المتباينات التالية:

Find all real numbers that satisfy the inequality

- a)  $2x \ge 1$ 
  - 2 على العدد على المتباينة هو  $x \ge \frac{1}{2}$  وذلك بقسمة طرفي المتباينة على العدد
- b) 3x 5 < 10

وحل هذه المتباينة يتم بإضافة العدد 5 لطرفي المتباينة لنحصل على: 3x < 15

x < 5 من ثم نقسم طرفي المتباينة على العدد 3 لنحصل على الحل

c)  $3 - x \le 2x + 4$ 

لحل هذه المتباينة نضيف x لطرفي المتباينة لنحصل على:

 $3 \le 3x + 4$ 

ثم نقوم بطرح العدد 4 من طرفي المتباينة لنحصل على:

 $-1 \le 3x$ 

وأخيراً نقوم بقسمة طرفى المتباينة على العدد 3 لنحصل على الحل:

$$-\frac{1}{3} \le x$$

or

$$x \ge -\frac{1}{3}$$

مثال 13

أوجد حل المتباينات التالية Solve the following inequalities:

a) 5 - 2 x < 7

حل هذه المتباينة يتم بطرح العدد 5 من طرفي المتباينة لنحصل على:

-2 x < 2

وعند قسمة طرفي المتباينة على العدد (2-) لإيجاد الحل، علينا مراعاة أن القسمة على عدد سالب يعكس شكل المتباينة وبالتالى نحصل على:

$$x > -1$$

b) 
$$5x - \frac{1}{2} < x + 3$$

يمكن حل هذه المتباينة بعدة طرق منها يمكن ضرب طرفي المتباينة بالعدد  $\frac{1}{2}$  وذلك للتخلص من العدد  $\frac{1}{2}$  ولتسهيل العمليات الحسابية فنحصل على:

$$10 x - 1 < 2 x + 6$$

وبطرح 2x من طرفي المتباينة وكذلك بإضافة العدد 1 للطرفين نحصل

وأخيراً وعند قسمة طرفى المتباينة على العدد 8 نحصل على الحل وهو:

$$x < \frac{7}{8}$$

#### مثال 14

على:

حل المتباينة المزدوجة التالية:

Solve the double inequality for x

$$5 < 2x + 7 < 13$$

في هذه المتباينة المردوجة يظهر المتغير x في وسط الشكل وبالتالي فإن حل هذه المتباينة المردوجة سيتم بحل المتباينتين الناتجتين معاً كالآتي:

نبدأ بطرح العدد 7 من جميع أطراف هذه المتباينة لنحصل على:

$$-2 < 2x < 6$$

وبالقسمة على العدد 2 نحصل على الحل وهو:

$$-1 < x < 3$$

#### مثال 15

حل المتباينة المزدوجة التالية:

Solve the double inequality

$$2x + 1 < 3 - x < 2x + 5$$

لحل هذا النوع من المتباينات المزدوجة علينا أو لا قراءتها على شكل متباينين كالآتى:

$$2x + 1 < 3 - x$$
 المتباينة الأولى

المتباينة الثانية 
$$3 - x < 2x + 5$$

ثم نقوم بحل كل منها على حدة كالآتي:

a) 
$$3x + 1 < 3 - x$$

$$x < \frac{1}{2}$$

b) 
$$3 - x < 2x + 5$$

$$-3x < 2$$

$$x > -\frac{2}{3}$$

وبالتالى فإن حل المتباينة المزدوجة هو:

$$x < \frac{1}{2}$$

$$x > -\frac{2}{3}$$

ويمكن كتابة الحل بالشكل النهائي التالى:

$$-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{2}$$

and

أما عن تطبيقات المتباينات فكثيرة منها التطبيقات التي تخص تحديد الأرباح Manufacturer's profit والذي سيعرض في المثال (16) التالي، وتطبيقات اتخاذ الاستثمار Investment والذي سيتم في المثال (17) التالي وكذلك تطبيقات اتخاذ

القرارات بشأن الإنتاجية Production Decision والذي سيتم في المثال (18) التالى:

مثال 16

مصنع للأجهزة الإلكترونية يبيع الأجهزة المنتجة لديه بسعر 100 دينار للجهاز الواحد، علماً بأن التكاليف الأسبوعية هي 10000 دينار وأن تكلفة الجهاز السواحد هو 80 ديناراً. أوجد عدد الأجهزة الإلكترونية التي باستطاعة المصنع صنعها وبيعها أسبوعياً لتحقيق ربحاً أسبوعياً 1000 دينار على الأقل.

The manufacturer of electronic appliances can sell all he can produce at the selling price of 100 J.D. each. It costs him 80 J.D. to produce each item, and he has overhead costs of 10000 J.D. per week. Find the number of units he should produce and sell to make a profit of at least 1000 J.D. per week.

لنفرض أن عدد الأجهزة المنتجة والمباعة لهذا المصنع هي x وبالتالي فإن:

Cost = 10000 + 80 x

Revenue = 100 x

Profit = Revenue - Cost

P = 100 x - (10000 + 80 x)

P = 20 x - 10000

ولناك فإن قيمة x ، أي عدد الأجهزة المنتجة والمباعة والتي تحقق ربحاً على الأقل 1000 دينار أسبوعياً هي قيمة x التي تحقق التالي:

 $P \ge 1000$ 

ويعني ذلك:

 $20 \text{ x} - 10000 \ge 1000$ 

ويمكن حل هذه المتباينة بإضافة 10000 لطرفي المتباينة ثم القسمة على 20 لنحصل على:

$$x \ge \frac{9000}{20}$$

أي أن:

x ≥ 450

ويعني ذلك أن على المصنع أن ينتج على الأقل 450 جهاز لتحقيق على الأقل 1000 ديناراً كربح أسبوعي.

#### مثال 17

يستطيع أحد رجال الأعمال استثمار 7000 ديناراً بحيث يضع قسم منه بمعدل ربح %7 والباقي بمعدل رقم %10. ما هي الكمية القصوى التي يجب عليه أن يستثمر ها بالمعدل %7 لتحقيق على الأقل 500 دينار كربح سنوي.

A Business man has 7000 J.D. to invest. He wants to invest some of it at 7% and the rest at 10%. What is the maximum amount he should invest at 7% if he wants an annual invest income of at least 500 J.D. per year.

لنفرض أن الكمية التي سيضعها بمعدل ربح 7% هو x وبالتالي فإن الكمية التي سيضعها بمعدل ربح 10%. ولتحقيق ربحاً على الأقل 500 دينار لدينا المتاينة التالية:

$$7\% x + 10\% (7000 - x) \ge 500$$

أي أن:

 $0.07 \text{ x} + 700 - 0.10 \text{ x} \ge 500$ 

أي أن:

 $-0.17 \text{ x} \ge -200$ 

وبالتالي فإن:

 $x \le 1176.47$  ويعني ذلك أن  $x \le \frac{200}{0.17}$ 

وبالتالي فإن رجل الأعمال يمكن أن يضع 1176.47 ديناراً كحد أقصى بالمعدل %7 لتحقيق الربح المعين.

#### مثال 18

يود مدير مصنع اتخاذ القرار بشأن التصنيع من عدمه لأحد الأجهزة الواجب تهيئتها لإدارة مصنعه، فإذا أراد شراء هذا الجهاز من الخارج فإن تكلفة الجهاز السواحد 1.5 ديسناراً أما إذا أراد تصنيعه في المصنع فإنه سيزيد من الكلفة الكلية بالمقدار 500 ديناراً شهرياً علماً أن تكلفة الجهاز الواحد هو 1 دينار، فما هو عدد الأجهزة التي عليه تهيئتها شهرياً ليستطيع اتخاذ القرار بشأن تصنيع الأجهزة داخل المصنع.

The management of a manufacturing firm wants to decide whether they should manufacture their own items, which the firm has been purchasing from outside suppliers at 1.5 J.D. each. Manufacturing the item will increase the overhead costs of the firm by 500 J.D. per month, and the cost of the item will be 1 J.D. How many items would have to be used by the firm each month to justify a decision to manufacture their own items.

لأجل اتخاذ القرار بشأن التصنيع داخل المصنع يجب أن تكون كلفة الشراء أكبر من كلفة التصنيع كالآتى:

Cost of purchasing	>	Cost of manufacturing	
1.5 x	>	x + 500	
0.5 x	>	500	
X	>	1000	

لـذلك فـإذا احـتاج المصنع على الأقل 1000 جهاز شهرياً على صاحب المصنع تصنيعها في الداخل.

#### 5-3 المتباينات التربيعية بمتغير واحد:

#### Quadratic Inequalities in one variable

وكما تم تعريف المعادلة التربيعية بمتغير واحد، سابقاً، بالشكل العام التالي:

$$a x^{2} + b x + c = 0$$

where  $a \neq 0$ , a, b, and c are real constants

يمكن تعريف المتباينة التربيعية بمتغير واحد بأحد الأشكال التالية:

$$a x^{2} + b x + c > 0$$

$$a x^2 + b x + c \ge 0$$

where  $a \neq 0$ . a, b, and c are real constants

وبنفس الأسلوب الذي تم اتباعه لحل المعادلات التربيعية، كما ورد سابقاً، نستطيع حل المتباينات التربيعية والأمثلة التالية تشير إلى المعنى كالآتى:

# مثال 19 أ

حل المتباينة التالية Solve the following inequality

$$x^2 - 3 x > 0$$

سنقوم بحل هذه المتباينة أولاً عن طريق تحويلها إلى معادلة لنحصل على:

$$x^2 - 3 x = 0$$

وباستخراج الحد المشترك x نحصل على:

$$x(x-3) = 0$$

وذلك يعني أن أصفار المعادلة التربيعية هما x = 0 و x = 0 و الذي يعني

x = 3

نقوم الآن برسم هاتين النقطتين على خط الأعداد الحقيقية وتحديد الإشارات

كالآتي:

6

والذي يمثل الحل فإن الحل  $x^2 - 3 > 0$  والذي يمثل الحل فإن الحل والمتحديد الإشارة الموجبة للمتباينة

هو :

x < -3

or

x > 0

مثال 20

حل المتباينة التربيعية التالية Solve the following inequality:

$$x^2 + 3x - 4 \le 0$$

وبنفس الأسلوب المتبع في المثال السابق نحول المتباينة إلى معادلة تربيعية كالآتى:

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

وباستخدام أسلوب التحليل إلى العوامل نحصل على:

$$(x + 4)(x - 1) = 0$$

وعند حل كل من حدود المعادلة نحصل على الحل:

$$x = -4$$

or

x = 1

ولتحديد الإشارة لدينا:

وبالتالي فإن حل المتباينة التربيعية سيكون عندما  $1 \le x \le 4$ 

# :Absolute values القيم الطلقة

If x is a real number, then the absolute value of x, denoted by |x|, is defined by:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{if } x \ge 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

for example: |2| = 2, |-3| = -(-3) = 3, and |0| = 0.

وبالتالي فإنه من الواضح أن القيمة المطلقة لأي عدد حقيقي هو عدد حقيقي موجب nonnegative real numbers ويعنى ذلك أن  $|x| \ge 0$ .

وهناك بعض العلاقات الواجب معرفتها قبل الدخول في حساب القيم المطلقة والتي سيتم عرضها كالآتي (بدون براهين لأنها خارجة عن أهداف هذا الكتاب):

1) If 
$$|a| = b$$
, where  $b \ge 0$  then either  $a = b$  or  $a = -b$ 

2) If 
$$|a| = |b|$$
, then either  $a = b$  or  $a = -b$ 

3) 
$$|x| = |-x| = \sqrt{x^2}$$

- 4) |x| < a if and only if -a < x < a
- 5) |x| > a if and only if either x > a or x < -a

6) 
$$|a b| = |a| \cdot |b|$$

7) 
$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$
 ,  $b \neq 0$ 

والآن سنقوم بعرض بعض الأمثلة للتعامل مع مفهوم القيم المطلقة وباتباع العلاقات التي ورد ذكرها أعلاه لحل المعادلات والمتباينات والمتضمنة لمفهوم القيمة المطلقة كالآتى:

#### مثال 21

:Solve for x

أوجد قيمة x لكل مما يأتي

a) 
$$|2x - 4| = 6$$

بالرجوع لتعريف القيمة المطلقة واستخدام العلاقة رقم (1) أعلاه نجد أن

لدينا:

$$2x - 4 = 6$$

or

$$2x - 4 = -6$$

وبحل كل واحدة من هاتين المعادلتين بالطرق السابق ذكرها نحصل على:

$$x = 5$$

or

$$x = -1$$

b) 
$$|2x + 5| = |3x - 1|$$

وبالرجوع لتعريف القيمة المطلقة واستخدام العلاقة رقم (2) أعلاه نجد أن

لدينا:

$$2x + 5 = 3x - 1$$

or

$$2x + 5 = -(3x - 1)$$

$$2x + 5 = 3x - 1$$

or

$$2x + 5 = -3x + 1$$

وبحل كل واحد من هاتين المعادلتين بالطرق السابقة نحصل على:

$$x = 4$$

or

$$x = \frac{-4}{5}$$

مثال 22

عبر عن ما يلى باستخدام القيم المطلقة:

Express the following using absolute values

- a) x is at distance of 2 units from 5: |x 5| = 2
- b) x is at most 3 units from 4:  $|x 4| \le 3$
- c) x is at least 5 units from 4:  $|x 4| \ge 5$
- d) x is greater than 8 units from 3: |x 3| > 8
- e) x is within a units from c:  $|x c| \le a$

مثال 23

أوجد قيمة x التي تحقق المتباينات التالية:

Solve for x the following inequalities

- a) |3x 4| < 5
  - بالرجوع لتعريف القيمة المطلقة واستخدام العلاقة رقم (4) أعلاه نجد أن:

-5 < 3x - 4 < 5

وبالرجوع لحل المتباينة المزدوجة أعلاه (كما رأينا سابقاً) وبإضافة العدد 4 لأطراف المتباينة نحصل على:

-1 < 3x < 9

ثم بالقسمة على العدد 3 نحصل على الحل:

 $-\frac{1}{3} < x < 3$ 

- b) |3x 4| > 7
  - وبالرجوع لتعريف القيمة المطلقة واستخدام العلاقة رقم (5) أعلاه نجد أن:

3x - 4 > 7

Ωť

3x - 4 < -7

سنحل كل من هاتين المتباينتين كالآتي:

3x > 11

or

3x < -3

 $x > \frac{11}{3}$ 

or

x < -1

مثال 24

أوجد ناتج كل مما يأتي Evaluate the following:

- a)  $|(2)(3)| = |2||3| = 2 \cdot 3 = 6$
- b)  $|(-2)(3)| = |-2||3| = 2 \cdot 3 = 6$
- c) |(x-2)(x+3)| = |x-2||x+3|

$$d) \left| \frac{x-2}{x+3} \right| = \frac{|x-2|}{|x+3|}$$

$$x \neq -3$$

شال 25

حل المتباينة التالية Solve the following inequality:

$$\left|\frac{2x-3}{7}\right| \geq 1$$

بالرجوع لتعريف القيمة المطلقة واستخدام العلاقة رقم (5) أعلاه نجد أن:

$$\frac{2x-3}{7} \ge 1$$

or

$$\frac{2x-3}{7} \le -1$$

وسنقوم بحل كل من هاتين المتباينتين كالآتى:

$$2x - 3 \ge 7$$

or

$$2x - 3 \le -7$$

$$2x \ge 10$$

or

$$2x \le -4$$

$$x \ge 5$$


or

$$x \le -2$$


# أسئلت الفصل الثالث Exercises for chapter three

# اكتب المجموعات التالية Describe the following sets للأسئلة (1-8):


- 1) The set of natural numbers less than 10.
- 2) The set of even integers greater than 3.
- 3) The set of all prime natural numbers less than 20.
- 4) The set of real numbers in the interval [-1, 1].
- 5) The set of real numbers greater than -5 and less than or equal to 3.
- 6) The set of real numbers greater than of equal to zero.
- 7) The set of real numbers and  $x^2 x 2 = 0$
- 8) The set of all numbers y such that  $y = \frac{1}{h+1}$ , where h is a natural numbers.
- 9) Write S , A, and  $A^c$ . Then find  $A \cup A^c$  ,  $A \cap A^c$



10) Write S , A , and B. The find  $A\cap B$  ,  $A\cup B$  ,  $A^c$  ,  $B^c$  ,  $A^c\cap B^c$  ,  $A^c\cup B^c$  for the following three cases.



 $\begin{pmatrix} *E_1 & *E_2 & E_3* \\ \mathbf{A} & *E_4 & \mathbf{B} \\ *E_7 & *E_5 & E_6* \end{pmatrix}$ 



11) Let  $\Omega = R$ 

$$A = \{x : -1 \le x \le 1\}$$

$$B = \{x : x \ge 0 \}$$

$$C = \{x : x > -1 \}$$

$$D = \{x : x < 1\}$$

$$\begin{split} \text{Find: } A \cap B \text{ , } A \cap C \text{ , } A \cap D \text{ , } B \cap C \text{ , } B \cap D \text{ , } C \cap D \text{ , } A^C \text{ , } B^C \text{ , } C^C \text{ , } \\ D^C \text{ , } A \cup B \text{ , } A \cup C \text{ , } A \cup D \text{ , } B \cup C \text{ , } B \cup D \text{ , } B \cup D \text{ , } (A \cap B)^C \text{ , } \\ (A \cup B)^C \text{ , } (A \cap C)^C \text{ , } (A \cup C)^C \text{ , } (A \cap D)^C \text{ , } (A \cup D)^C \text{ , } \\ (B \cap C)^C \text{ , } (B \cup C)^C \text{ , } (B \cap D)^C \text{ , } (B \cup D)^C \text{ , } (C \cap D)^C \text{ , } (C \cup D)^C \text{ , } \\ A^C \cap B^C \text{ , } A^C \cup B^C \text{ , } A^C \cap C^C \text{ , } A^C \cup C^C \text{ , } A^C \cap D^C \text{ , } A^C \cup D^C \text{ , } \\ B^C \cap C^C \text{ , } B^C \cup C^C \text{ , } B^C \cap D^C \text{ , } B^C \cup D^C \text{ , } C^C \cap D^C \text{ , and } C^C \cup D^C \end{split}$$

حل المتباينات التالية Solve the following inequalities للأسئلة (27-12):

12) 
$$3 - 2x \ge 7$$

13) 
$$31 - 3y < 5y + 7$$

14) 
$$2(3x-1) > 2 + 5(x-1)$$

15) 
$$\frac{x+1}{2} - \frac{x}{3} > 1 + \frac{2x-1}{5}$$

16) 
$$5 - \frac{1}{3}x < 2 + \frac{1}{2}(x+1)$$

17) 
$$2x + \frac{7}{9} < 13$$

18) 
$$7 < 2x + 5 < 13$$

19) 
$$-4 < x - 2 < 4$$

20) 
$$6x - 11 < 3x + 1 < 5x - 7$$

21) 
$$2x > x + 1 > 3x - 5$$

22) 
$$(x + 2) (x + 3) > (x - 2)^2$$

23) 
$$(3x + 1)(x - 2) < (x - 4)(3x+3)$$

24) 
$$9 \le 4 - 6x < 12$$

25) 
$$x^2 - 3x > 10$$

26) 
$$\frac{4x-10}{x-2} > 3$$

27) 
$$1 \le \frac{1-3x}{4} \le 4$$

حل لإيجاد قيمة x لكل مما يأتي Solve for x للأسئلة (x

28) 
$$|x - 5| = 2$$

29) 
$$|4x - 3| = |3x + 5|$$

30) 
$$|x - 2| < 3$$

31) 
$$|x + 5| \ge 2$$

$$32) \ \frac{1}{|3x-5|} < 2$$

33) 
$$|6x - 2| = 7$$

34) 
$$|6x - 7| = |3 + 2x|$$

$$35) \left| \frac{x+5}{2-x} \right| = 6$$

36) 
$$|x + 6| < 3$$

37) 
$$|2x - 3| \le 6$$

38) 
$$|x + 2| > 1$$

$$39) \left| \frac{2 - 5x}{4} \right| \ge 3$$

# حل التطبيقات التالية Solve the following applications للأسئلة (42-40)

(40) لــدى شخص 5000 دينار للاستثمار بحيث يضع قسم منها بمعدل ربح 6% والباقــي بمعدل ربح 8%. فإذا رغب الشخص بتحقيق ربح سنوي قدره على الأقل 370 ديناراً. ما هي الكمية القصوى التي يجب أن يستثمرها بمعدل 6% لتحقيق ذلك الربح.

A man has 5000 J.D. which he wants to invest. Some at 6% and the rest at 8%. If he wants an annual interest income of at least 370 J.D. what is the maximum amount he should invest at 6%.

41) شركة تستطيع بيع كل ما تنتجه من وحدات مصنعة بسعر 200 دينار للوحدة الــواحدة. الــتكلفة الشــهرية الثابتة للشركة هي 30000 دينار وكلفة تصنيع الــوحدة الــواحدة هو 130 دينار. أوجد عدد القطع الواجب تصنيعها وبيعها شهرياً لتحقيق ربح شهري على الأقل 2500 دينار.

A company can sell all the units produced at a price of 200 J.D. each. Monthly fixed costs are 30000 J.D. and the units cost 130 J.D. each. Find the number of units which must be manufactured and sold each month to obtain a monthly profit of at least 2500 J.D.

(42) مصنع لصناعة السيارات يرغب في اتخاذ القرار بشأن تصنيع قطع معينة يحتاج إليها في صنع السيارات والتي كان يشتريها من مصنع آخر بسعر 3.00 دينار للقطعة الواحدة. تصنيع هذه القطع سيزيد من الكلفة الثابتة للمصنع

أسبوعياً 1000 دينار مضافاً على كلفة صنع الوحدة الواحدة بمقدار 1.90 دينار. أوجد عدد القطع التي يحتاجها المصنع أسبوعياً لاتخاذ القرار بشأن تصنيعها داخل المصنع.

A firm manufacturing cars wants to know whether to manufacture their own gaskets, which the firm has been purchasing from outside supplier at 3.00 J.D. for each unit. Manufacturing the items will increase the overhead costs by 1000 J.D. each week ant it will cost 1.90 J.D. to manufacture each gasket. How many gaskets must be used by the firm each week to justify manufacturing the gaskets in the firm.

# الفصل الرابع

# الخطوط المستقيمة وأنظمة المعادلات الخطية

- 4-1 مقدمة
- 2-4 نظام المحاور الكارتيزية
  - 3-4 صيغة المسافة
- 4-4 رسم المعادلات الخطية لمتغيرين
  - 4-5 الميل
  - 4-6 صبغة الميل والتقطة
- 7-4 المعادلات للخطوط أو المستقيمات الأفقية والعمودية
  - 8-4 الخطوط المستقيمة المتوازية والمتعامدة
    - 9-4 تطبيقات ورسم المعادلات الخطية
    - 4-10 أنظمة المعادلات الخطية لمتغيرين
  - 4-11 أنظمة المعادلات الخطية لثلاث متغيرات

أسئلة الفصل الرابع

ارية والإفتشادية

# الفصل الرابعي الخطوط المستقيمة وأنظمة المصادلات الخطية Straight lines and Systems of Linear Equations

# 1-4 مقدمة Introduction:

تم في الفصل الثاني دراسة المعادلات الخطية Straight Lines بجميع تفاصيلها، وفي هذا الفصل سيتم التعامل مع الخطوط المستقيمة والتمامل مع الخطوط المستقيمة والتمامل مع الخطوط مستقيمة. والتمامل المعادلات الخطية ورسوماتها التي تتضح بكونها خطوط مستقيمة. Systems of وكذلك سيتم التعرف في هذا الفصل على أنظمة المعادلات الخطية والدي يمثل معادلة خطية أو أكثر One Linear Equation or والذي يمثل معادلة خطية أو أكثر من المفاهيم الرياضية المعادلات الكارتيزية الكارتيزية الكارتيزية (Cartesian Coordinates المستقيم المعادلات الخطية وكذلك على طريقة رسم المعادلات الخطية الخطية Slope وكذلك على طريقة رسم المعادلات الخطية الخطية المعادلات الخطية وكالمستقيم Slope

وسيتضمن الفصل أيضاً على كثير من الأمثلة Examples وكثير من الأمثلة التطبيقية هذا الفصل في الجانب التطبيقي وكذلك سيتضمن الفصل في نهايته على كثير من الأسئلة Exercises.

سيتضمن الفصل عدة مباحث هي المبحث 2-4 نظام المحاور الكارتيزية المستخصمن الفصل عدة مباحث هي المبحث 3-4 صيغة المسافة Cartesian Coordinates System Graphing Linear والمبحث 4-4 رسم المعادلات الخطية لمتغيرين Formula والمبحث 5-4 الميل The Slope والمبحث 5-4 الميل والنقطة والمبحث 5-4 المعادلات الخطية أو Point-Slope Formula والمبحث 7-4 المعادلات الخطية أو المستقيمات الأفقية والعمودية والعمودية والمتعامدة Horizontal and Vertical Lines والمبحث 6-4 تطبيقات ورسم المعادلات الخطية الميل والمبحث 6-4 تطبيقات ورسم المعادلات الخطية المستقيمة ورسم المعادلات الخطية والمستقيمة المستقيمة المست


A Parameter State of the State

Systems والمبحث النظمة المعادلات الخطية لمتغيرين linear equations والمبحث 4-10 والخطية لمتغيرين of linear equations in two variables الخطية لثلاث متغيرات System of linear equations in three variables.

# 2-4 نظام المحاور الكارتيزية Cartesian coordinates system

يعتبر نظام الأعداد الحقيقية هو القاعدة الأساسية لهذا الفصل ولهذا الكتاب بصورة عامة في نفس الوقت، حيث أن هذا النظام The system of real numbers مصوعة من الأعداد الحقيقية مع بعض العمليات الجبرية من جمع وطرح وضرب وقسمة addition, subtraction, multiplication and division للأعداد الحقيقية كما تم الحديث عنه وبكافة التفاصيل في الفصل الأول.

ويكون من المفيد والنافع لعرض مجموعة الأعداد الحقيقية وكما تم في الفصل الأول من خلال معنى الأعداد الحقيقية أن مجموعة الأعداد الحقيقية تمثل خط line من القيم الحقيقية ويسمى هذا الخط بالخط الكارتيزي Cartesian خط nine من القيم الحقيقية على شكل رسم بياني يمثل خط مستقيم للأرقام numbers line. ويمكن تحديد نقطة على شكل رسم بياني يمثل خط عشوائي لتمثل الرقم صفر zero point وتمثل هذه النقطة نقطة البداية أو الأصل عشوائي لتمثل الرقم صفر point وتمثل هذه النقطة نقطة البداية أو الأصل origin، ومن هذه النقطة نأخذ على الاتجاهين الأيمن والأيسر مسافات محددة ومتساوية لتحديد وحدات القياس right of zero ونضع الأعداد الحقيقية ونبدأ على جهة اليمين من الصفر right of zero الأعداد الموجبة من 1 صعوداً إلى ح-، وكما هو واضح من الشكل رقم (1) التالي:



الشكل رقم (1) رسم خط الأعداد الحقيقية

وبالتالي يمكن تلخيص ما ورد أعلاه في التعريف التالي:

الخط الكارتيزي Cartesian line: هو الخط من الأعداد الحقيقية والمتمثل unit of ووحدة قياس positive direction ووحدة قياس origin واتجاه موجب one-to-one بين مجموعة «measurements» بحيث أن هناك علاقة واحد لواحد one-to-one بين مجموعة الأعداد الحقيقية set of real numbers والنقاط التي تقع على الخط الكارتيزي أو ما يسمى بخط الأعداد الحقيقية real line.

أما عندما يكون لدينا محورين متعامدين perpendicular lines أحدهما أفقي horizontal line والآخر عمودي horizontal line يتقاطعان عند نقطة الأصل horizontal line عندئذ يمثل تمثيل النقاط في مستوى plane والذي يسمى نظام المحاور الكارتيزية Cartesian coordinate system.

يسمى المستقيم الأفقي باسم الإحداثي السيني x-axis ويسمى المستقيم العمودي باسم الإحداثي الصادي y-axis وهذان المستقيمان يتقاطعان في نقطة تسمى بنقطة الأصل origin وهي النقطة (0,0)، حيث أن الإحداثي السيني لها صفر والإحداثي الصادي أيضاً صفر.

ولتحديد مقياس الرسم للنظام ترتب القيم الموجبة على يمين نقطة الأصل والقيم السالبة على يسار نقطة الأصل بالنسبة للإحداثي الأفقى x-axis

Positive numbers to the right of the origin and negative numbers to the left of the origin.

أما بالنسبة للإحداثي الصادي y-axis فإن القيم الموجبة تكون أعلى نقطة الأصل أما القيم السالبة فتكون أسفل نقطة الأصل

Positive numbers lying above the origin and negative numbers lying below the origin.

أما عن مقاييس الرسم unit of measurements فلا تحتاج أن تكون نفسها وقد تم عمل ذلك فعلاً في التطبيقات المختلفة حيث يمكن عرض كميات مختلفة لكل محدور فمثلاً عندما يمثل المحور السيني x عدد الحاسبات المباعة ويمثل المحور

الصادي y المبالغ العائدة من البيع فإن مقاييس الرسم يفضل أن تكون مختلفة في وحدة القياس different number of scales وبالتالي يمكن تلخيص ما سبق بالتعريف التالي:


الخطوط الكارتيزية Cartesian coordinates: أو ما يسمى بالمستوى الكارتيزي Cartesian مو زوج من المحاور المتعامدة في نقطة الأصل الكارتيزي y-axis والإحداثي الصيني x-axis والإحداثي الصيادي y-axis.

ويمكن رسم النقاط points والمعادلات equations والدوال points عادة على هذه الإحداثيات كالآتى:

السنقطة point في المستوى plane يمكن عرضها وتمثيلها بشكل أحادي porder pairs في أي مكان على هذا المستوى بواسطة الأزواج المرتبة uniquely مسن الأعداد. والزوج (x,y) حيث أن x يمثل الرقم الأول first number و يمثل الثانسي second number و هما الإحداثي السيني x والإحداثي الصادي x للنقطة x والتي يمكن رسمها على المستوى x المستوى x والتي يمكن رسمها على المستوى

الشكل رقم (2) التالي يمثل المستوى xy-plane ورسم النقاط التالية: النقطة A بالإحداثيات (5, 3-) والنقطة B بالإحداثيات (5, 3-) والنقطة D بالإحداثيات (5-, 3-) وكذلك نقطة الأصل (0, 0).

هذا الشكل يمثل المحورين المتعامدين في نقطة الأصل (0,0) حيث يقسمان المستوى xy-plane إلى أربعة أجزاء متساوية هي الربع الأول والذي يمثل جميع النقاط بالقيم الموجبة لـx والقيم الموجبة لـx والقيم الموجبة لـx والقيم الموجبة لـx والربع الثالث والذي يمثل جميع النقاط بالقيم السالبة لـx والقيم السالبة لـx وأخيراً الربع الرابع والذي يمثل جميع النقاط بالقيم الموجبة لـx والقيم السالبة لـx والقيم السالبة لـx والقيم السالبة لـx والقيم السالبة لـx



رسم النقاط D, C, B, A على المستوى

ويلاحظ أنه وبصورة عامة لا توجد نقطتين على المستوى متساويتين، حيث أن  $(y,x) \neq (x,y)$  ويمكن ملاحظة ذلك وبوضوح من النقطتين D,A.

# د4-3 عيغة السافة The Distance Formula:

Cartesian Coordinate System إحدى استخدامات نظام المحاور الكارتيزية The distance between any والمهمة هو إيجاد المسافة بين نقطتين على المستوى two points in the plane من خلال الإحداثيات coordinates الخاصة بهذه النقاط. بافتراض أن النقطتين هما  $(x_2, y_2), (x_1, y_1)$  فإن المسافة بين هاتين النقطتين هما ويرمز لها بالرمز  $(x_1, y_1)$  ويرمز لها بالرمز  $(x_2, y_2)$  النقطة نظرية بيشكورن Distance between these two points البحادها وبواسطة نظرية بيشكورن

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

وسيتم تطبيق هذه الطريقة لإيجاد المسافة بين نقطتين كما في الأمثلة التالية:

مثال ٦

أوجد المسافة بين النقطتين C, A من الشكل السابق:

Find the distance between the points (4,3) and (-3,-4):

using the distance formula لإيجاد المسافة نستخدم العلاقة أعلاه

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(-3 - 4)^2 + (-4 - 3)^2} = \sqrt{(-7)^2 + (-7)^2} = \sqrt{49 + 49} = \sqrt{98}$$

مثال 2

أوجد المسافة بين النقطتين B, A

Find the distance between the points (-6,-6) and (6,6)

بتطبيق صيغة المسافة the distance formula لدينا:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(-6 - 6)^2 + (-6 - 6)^2} = \sqrt{(-12)^2 + (-12)^2} = \sqrt{144 + 144} = \sqrt{288}$$


$$d = 16.97056$$

مثال 3

أربعة مدن 1، 2، 3، 4 كما في الشكل رقم (3) التالي. يراد ربط المدينة 4 و 4 بطريقين سريعين. الطريق الأول (1) ينطلق من المدينة 2 إلى المدينة 4 مرن خلال المدينة 1 حيث أن الطريق الذي يربط المدينة 1 بالمدينة 4 هو طريق سراحلي. أما الطريق الثاني (2) فينطلق من المدينة 2 إلى المدينة 4 من خلال المدينة 3 حيث أنه يتضمن طريق جبلي بين المدينتين 3 و 4. رغب أحد السائقين الذهاب من المدينة 2 إلى المدينة 4 بمعدل سرعة 60 ميل/ساعة باستخدام الطريق

الأول (1) وبمعدل سرعة 50 ميل/ساعة باستخدام الطريق الثاني (2). ما هو الطريق الذي يسلكه للوصول بوقت أقل.

Towns 1, 2, 3, and 4 are located as in figure (3). Two highways connect towns and 4. Highway (1), from town 2 to town 4 via town 1, includes coastal highway joining towns 1 and 4. And highway (2), from town 2 to town 4, includes a mountain highway joining towns 3 and 4. Driver wishes to drive from town 2 to town 4 and can drive with average of 60 mph using highway (1) and 50 mph using highway (2). Which road should he take minimizing the time spent for driving.



لتحديد الطريق الذي سيستغرق وقتاً أقصر، علينا حساب الوقت اللازم لقطع الطريق (1) ومقارنته مع الوقت اللازم لقطع الطريق (2) كالآتي:

1) إذا سلك السائق الطريق (1) فالمسافة  $d_1$  المقطوعة بتطبيق صيغة المسافة هي:

$$d_1 = \sqrt{(150 - 0)^2 + (0 - 0)^2} + \sqrt{(50 - 0)^2 + (150 - 0)^2}$$

$$= \sqrt{(150)^2 + 0^2} + \sqrt{(50)^2 + (150)^2}$$

$$= \sqrt{(150)^2} + \sqrt{2500 + 22500}$$

$$= 150 + \sqrt{25000}$$

$$= 150 + 158.11383 = 308.11388$$

وبالتالي فإن الوقت  $T_1$  اللازمة لقطع هذه المسافة هو  $T_1$  كالآتى:

$$(T_1)$$
 =  $\frac{d_1 \left( \text{المسافة بالأميال} \right)}{S_1 \left( \text{السرعة بالساعة/ ميل} \right)} = \frac{308.11388}{60} = 5.14$ 

ويعني هذا أن الوقت اللازم لهذه الرحلة هو 5.14 ساعة

2) أما إذا سلك السائق الطريق (2) فالمسافة d<sub>2</sub> المقطوعة بتطبيق صيغة المسافة هي:

$$d_2 = \sqrt{(200 - 150)^2 + (100 - 0)^2} + \sqrt{(50 - 200)^2 + (150 - 100)^2}$$

$$= \sqrt{(50)^2 + (100)^2} + \sqrt{(-150)^2 + (50)^2}$$

$$= \sqrt{2500 + 10000} + \sqrt{22500 + 2500}$$

$$= \sqrt{12500} + \sqrt{25000}$$

$$= 111.8034 + 158.114 = 269.9174 \approx 270$$

وبالتالي فإن الوقت Time اللازم لقطع هذه المسافة هو  $T_2$  كالآتى:

$$(T_2)$$
 الزمن ( $T_2$ ) النصافة بالأميال  $\frac{d_2}{S_2}$  (السرعة بالساعة/ ميل) =  $\frac{270}{50}$  = 5.4

ويعني هذا أن الوقت اللازم لهذه الرحلة هو 5.40 ساعة.

وبمقارنة الوقتين نقول بأن على السائق أن يسلك الطريق (1) بالوقت 5.14 ساعة وهو الوقت الأفضل والأقل.

#### 4-4 رسم المعادلات الخطية لتغيرين:

# Graphing linear equations in two variables

المعادلة الخطية لمتغيرين هي المعادلة التي يمكن تكتب بالشكل أو الصيغة التالية:

Ax + By = C

حيث أن C, B, A هي ثوابت حقيقية ولكن ليس B, A كليهما صفر، وتسمى هذه الصيغة بالصيغة القياسية Standard form.

على سبيل المثال لدينا المعادلات التالية:

$$5x - 4y = 10$$
,  $y = 3x - 3$ ,  $y = -4$ ,  $x = 6$ 

وجميعها معادلات خطية بمتغيرين، حيث أننا نستطيع تحويل جميع هذه المعادلات من أشكالها العادية إلى الشكل أو المعادلة القياسية standard form.

أما حل المعادلة بمتغيرين فهو الأزواج المرتبة ordered pairs من الأعداد الحقيقية التي تحقق المعادلة satisfy the equation.

فعلى سبيل المثال الزوج المرتب أو النقطة (3-, 0) هو الحل للمعادلة: -3x + 4y = -3(0) + 4(-3) = -12

مجموعة الحل solution set للمعادلة بمتغيرين هو المجموعة لجميع حلول المعادلة.

وعندما نقول رسم المعادلة graph an equation لمتغيرين فإننا نعني رسم مجموعة الحل في المستطيل للمحاور set on a rectangular coordinate system مجموعة الحل في المستطيل للمحاور straight line وتكون جميع النقاط أو الحلول على شكل خط مستقيم straight linear equation in two variables بالصيغة المعادلة الخطية بمتغيرين linear equation in two variables التالية:

حيث أن: b, m ثوابت حقيقية.

وهي أيضاً تمثل معادلة خطية وأن رسمها يكون على شكل خط مستقيم، سوى أن هذا الشكل يدل على اعتماد المتغير x بالشكل الخطي mx + b وأن m يمثل ميل الخط المستقيم slope of the straight line وأن d يمثل الإحداثي الصادي للخط المستقيم line وهذان المفهومان سيتم الحديث عنهما وبشكل أوسع لاحقاً.

المعادلة أو الصيغة الثانية y=mx+b هي حالة خاصة من المعادلة أو  $B\neq 0$  عندما يكون Ax+By=C

والرسم يمكن أن يتم باستخدام أي من الصيغتين، حيث أننا نقوم برسم أي نقطتين من مجموعة الحل Graph any two points from the solution set ثم نصل النقطتين بخط ليمثل رسم الخط المستقيم.

عندما يقطع الخط المستقيم أياً من المحاور x-axis و أبسط طريقة أو نقـاط التقاطع تسمى بالمساقط أو معاملات التقاطع intercepts. وأبسط طريقة أو أسـلوب لإيجاد هذه التقاطعات هو بافتراض أن x = 0 ثم إيجاد قيمة x المقابلة بعد التعويض فـي المعادلة الخطية لإيجاد معامل التقاطع x-intercept ثم نفرض أن y و إيجـاد قـيمة y المقابلة بعد التعويض في المعادلة الخطية لإيجاد معامل التقاطع y- intercept ومن المفضل أحياناً أن نجد نقطة ثالثة لغرض التأكد. ومن شم رسم نقطتي التقاطع وإيصالهما بالخط المستقيم الذي يمثل رسم المعادلة الخطية والأمثلة التالية لتوضيح ذلك.

مثال 4


ارسم المعادلة التالية Graph the following equation:

-3x + 4y = 12

لأجل الرسم علينا تحديد بعض النقاط والتي تمثل بعض من حلول المعادلة كالآتي:

X	-4	0	4
Y	0	3	6

ومـن الواضح أننا اخترنا قيمة موجبة وهي 4 وقيمة سالبة وهي 4- ونقطة الصـفر لعمـل هذا الجدول المصغر من القيم المحتملة للمعادلة. وكذلك يلاحظ أن النقطتين (0,3) و(0, 4-) هما نقطتا تقاطع المعادلة مع الإحداثيين السيني والصادي intercepts. وبتعيـين تلك النقاط على xy-plane يكون الرسم كما في الشكل رقم (4) التالي:



الشكل رقم (4)

-3x + 4y = 12 مسم المعادلة

مثال 5


ارسم المعادلة التالية Graph the following equation:

$$y = 3x - 1$$

لأجل الرسم يمكننا إيجاد وتحديد النقاط التالية:

X	0	1	2
Y	-1	2 , ,	5





# الشكل رقم (5)

y = 3x - 1 لمعادلة


# 4-5 البيل Slope:

يعتبر الميل slope للخط المستقيم من الخصائص المهمة للمعادلة الخطية ومقياس رقمي مفيد جداً لقياس انحدار الخط المستقيم، ولهذا فإن فكرة الميل استخدمت بشكل واسع لهذه الغاية. والميل slope، والذي يرمز له بالرمز  $(x_1, y_1)$  two points المستقيم المار بنقطتين The following formula:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{Rise}{Run}$$

x حيث أن  $\Delta x$  يمثل مقياس التغير في قيمة x ، وتقرأ دلتا x وأن x يمثل مقياس التغير في قيمة x ، وتقرأ دلتا x





# توضيح معنى الميل slope

ويلاحظ هنا أن الميل للخط المستقيم الأفقي يساوي صفراً، أما الميل للخط المستقيم العمودي فهو غير موجود أو غير معرف.

The slope of a horizontal line is zero, and the slope of a vertical line is not defined.

يمكن إيضاح ذلك بالمثال التالى:

#### مثال 6

أوجد الميل للخط المستقيم لكل زوج من النقاط:

Find the slope of the line through each pair of points.

a) 
$$(-2, 5)$$
 and  $(4, -7)$ 

$$(x_2,y_2)=(x_1,y_1)=(-2,5)$$
 الميل للخط المار بالنقطتين بافتراض أن  $(x_1,y_1)=(-2,5)$  وأن  $(x_1,y_1)=(-2,5)$  هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-7 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-12}{4 + 2} = \frac{-12}{6} = -2$$

ويلاحظ أن الميل لا تتغير قيمته في حال تغيير النقاط الأولى بدل الثانية وبالعكس. فبافتراض أن  $(x_1,y_1)=(4,-7)$  و أن  $(x_2,y_2)=(-2,5)$  فإن الميل هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - (-7)}{-2 - 4} = \frac{5 + 7}{-6} = \frac{12}{-6} = -2$$

b) (-3, -1) and (-3, 5)

بافتر اض أن  $(x_1,y_1)=(-3,5)$  وأن  $(x_2,y_2)=(-3,5)$  هو فإن الميل هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - (-1)}{-3 - (-3)} = \frac{5 + 1}{-3 + 3} = \frac{6}{0}$$
 not defined

ويعني هذا أن الميل غير معرف والسبب أن  $x_1 = x_2$  أي أن المستقيم عمو دي vertical

c) (6, 4), (2, 2)

بافتر اض أن  $(x_2, y_2) = (6, 4)$  وأن  $(x_1, y_1) = (2, 2)$  فإن الميل هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 2}{4 - 2} = \frac{4}{2} = 2$$


بصورة عامة يمكن أن يكون ميل المستقيم موجب positive أو سالب negative أو حصفر zero أو حصفر negative أو صفر أن يكون الميل غير معرفاً undefined. وهذه الحالات موضحة بأشكالها في الجدول التالي:

Line 1) Rising


Slope

Example

Positive (m>0)




2) Failing



 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1}{1} = -1$ 


3) Vertical

Not defined



 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{0}$  undefined

4) Horizontal Zero (m = 0)



جدول رقم (1)

الحالات المختلفة لقيم الميل

# Point – Slope Formula صيغة الميل والنقطة

افرض أن المستقيم الذي ميله m يمر بنقطة ثابتة  $(x_1,y_1)$ . ولو كانت النقطة m هي أي نقطة أخرى يمر خلالها هذا المستقيم. فإن الميل m هو:

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

ونستطيع أن نضع صيغة الميل m بضرب الوسطين والطرفين كما يلي:

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$

وهذه الصيغة تسمى معادلة الميل والنقطة point-slope formula للخط المستقيم وهذه المعادلة مهمة جداً ونستطيع من خلالها إيجاد معادلة الخط المستقيم عن طريق معرفة ميل ذلك الخط وأي نقطة تقع على ذلك الخط المستقيم. وكذلك نستطيع من خلالها إيجاد معادلة الخط المستقيم المار بنقطتين. والمثال التالي يوضح هاتين الحالتين كالآتي:

# مثال **7**

Find the equation for the line أوجد معادلة الخط المستقيم

a) passing through (-4,4) with slope  $\frac{1}{4}$ 

يمر بالنقطة (4، 
$$-4$$
) والميل  $\frac{1}{4}$  واكتبها بالشكل النهائي:

$$AX + BY = C$$

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$
 باستخدام الصيغة

وبافتر اض أن 
$$(x_1, y_1) = (-4,4)$$
 وأن  $m = \frac{1}{4}$  ادينا:

$$y-4=\frac{1}{4}(x-(-4))$$

$$y - 4 = \frac{1}{4} (x + 4)$$

$$y - 4 = \frac{1}{4} x + \frac{4}{4}$$

$$y - 4 = \frac{1}{4} x + 1$$

$$y - \frac{1}{4} x = 5$$

b) passing through the points (-3,3) and (-4,4)

 $(x_2,y_2)=(-3,3)$  و  $(x_1,y_1)=(-4,4)$  و  $(x_2,y_2)=(-3,3)$  و  $(x_1,y_1)=(-4,4)$  علينا أو y أيجاد ميل المستقيم المار خلال النقطتين وهو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 4}{-3 - (-4)} = \frac{-1}{-3 + 4} = \frac{-1}{1} = -1$$

وباستخدام هذا الميل m=-1 وأي من النقطتين ولتكن  $(x_1,y_1)=(-3,3)$  فإن معادلة الخط المستقيم ستكون:

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$
  
 $y - 3 = 1 - (x - (-3))$   
 $y - 3 = -(x + 3)$ 

$$y - 3 = -x - 3$$

$$y = -x$$

# 7-4 المعادلات للخطوط أو المستقيمات الأفقية والعمودية:

# **Equations for Horizontal and vertical lines**

وكما تم ذكره سابقاً فإن الخط الأفقي horizontal line وكما تم ذكره سابقاً فإن الخط الأفقي y=c بالشكل y=c والدي يمثل خطاً موازياً للإحداثي السيني y=c عند القيمة y=c ويسمى معامل تقاطع y=c بالمتحدوث وهذه الخطوط بصورة عامة يكون ميلها y=c يساوي صفر، أي أن المعادلة هي y=c y=c أما الخط العمودي فهو الخط الذي يساوي صفر، أي أن المعادلة هي y=c والذي يمثل خطاً موازياً للإحداثي الصادي y=c عند القيمة y=c ويسمى معامل تقاطع y=c د منا يكون وهذه الخطوط بصورة عامة عندما يكون y=c

معامل y يساوي صفرا، أي أن المعادلة هي x + 0y = c. والأمثلة التالية توضح معنى و أهمية مثل هذه الخطوط.

√ مثال 8

معادلة الخط المستقيم الأفقي Horizontal line والذي يمر بالنقطة (3,4-) هي y=4 ومعادلة الخط المستقيم العمودي vertical line والذي يمر بنفس النقطة هي x=-3.

مثال و

إذا علمت أن المعادلة الخطية هي 12=4y+6x=12 . أوجد الميل y ومعامل تقاطع y لرسم المعادلة.

Given the linear equation 4y + 6x = 12. Find the slope and y-intercept of its graph.

لإيجاد الميل ومعامل تقاطع y يجب وضع المعادلة بالصيغة الخاصة y=mx+b وبالتالي علينا حل المعادلة المعطاة لإيجاد y

$$4y + 6x = 12$$

$$4y = 12 - 6x$$

$$y = 3 - \frac{3}{2}x$$

وبالتالي فإن  $m=-\frac{3}{2}$  وأن معامل تقاطع y هو b=3

# 8-4 الخطوط الستقيمة المتوازية والمتعامدة:

## Parallel and perpendicular lines

في هذا المبحث سيتم ملاحظة الحالتين عندما يكون الخطان متوازيان أي لا يلتقيا مهما امتدا أو أن يكون أحدهما عمودي على الآخر وكما هو موضح لاحقاً بالإنجليزي والعربي.

Let  $L_1$  and  $L_2$  be two given lines, where  $m_1$  is the slope of  $L_1$  and  $m_2$  is the slope of  $L_2$ . Then,  $L_1$  and  $L_2$  are said to be parallel, written as

 $L_1 \parallel L_2$ , if and only if  $m_1 = m_2$ . On the other hand,  $L_1$  and  $L_2$  are said to be perpendicular, written as  $L_1 \perp L_2$ , if and only if  $m_1m_2 = -1$  or  $m_2 = \frac{-1}{m_1}$ .

ويتضح من ذلك أن معنى أن يكون الخطان المستقيمان متوازيان فهو أن يكون ميلهما متساوي  $(m_1=m_2)$ . أما أن يكون الخطان متعامدان فهو أن يكون عاصل ضرب ميلهما يساوي  $1-(1-m_1m_2)$ . وبالتالي نستطيع من خلال هاتين العلاقتين تحديد ميل أحد المستقيمات إذا علمنا أنه موازي أو متعامد مع مستقيم آخر معلوم الميل وغيرها من التطبيقات التي تعتمد على هذا المعنى وسيتم من خلال الأمثلة توضيح ذلك كالآتى:

#### مثال 10

لتكن x - 2y = 4 معادلة خط مستقيم. أوجد معادلة الخطان المستقيمان اللذان يمران بالنقطة (3-,2) ويكون أحدهما موازي والآخر متعامد مع الخط المستقيم المعلوم.

Given the equation line as x - 2y = 4. Find the equation of a line that passes through (3,-3) and is:

- a) Parallel to the given line.
- b) Perpendicular to the given line.

x - 2y = 4 المستقيم المعلوم المستقيم المعلوم y = mx + b العامة

$$x - 2y = 4$$

$$-2y = 4 - x$$

$$y = -2 + \frac{1}{2}x$$

$$y = \frac{1}{2}x - 2$$

 $m = \frac{1}{2}$  ويعني هذا أن ميل الخط المستقيم المعلوم

فإن كان هذا الخط موازياً للخط المستقيم المطلوب فإن ميل الخطان متساوي وبالتالي فإن ميل الخط المطلوب هو  $\frac{1}{2}$  وبما أنه يمر بالنقطة (3-,3) لذلك فإن معادلة الخط المستقيم يمكن إيجادها كما يلى:

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$

$$y - (-3) = \frac{1}{2} (x - 3)$$

$$y + 3 = \frac{1}{2} x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{2} x - \frac{9}{2}$$

وهي معادلة الخط المطلوب في الفرع (a) أعلاه.

و إن كان الخط متعامداً مع الخط المستقيم المطلوب فإن حاصل ضرب ميلهما هو -1 و بالتالي فإن ميل الخط المطلوب هو  $m_2=\frac{1-}{m_1}$  أي أن:

$$M_2 = \frac{-1}{\frac{1}{2}} = -2$$

وبما أن هذا الخط يمر بالنقطة (3-,3) لذلك فإن معادلة الخط المستقيم يمكن إيجادها كما يلى:

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$
  
 $y - (-3) = -2 (x - 3)$ 

$$y + 3 = -2x + 6$$

$$y = -2x + 3$$

وهي معادلة الخط المطلوب في الفرع (b) أعلاه.

#### مثال 11

$$4x + 3y = 6$$
 lball plant | 4x + 3y = 6

$$x - 3y + 1 = 0$$
 ب) متعامد مع المستقيم الخاص بالمعادلة

Fine the equations of the lines passing through (2,3) that are:

$$4x + 3y = 6$$

b) perpendicular to the line 
$$x - 3y + 1 = 0$$

$$x - 3y + 1 = 0$$

لحل الفرع (a) يجب علينا أو لا إيجاد ميل الخط المعلوم بعد تحويله إلى الصبغة العامة v = mx + b كالآتى:

$$4x + 3y = 6$$

$$3y = 6 - 4x$$

$$y = 2 - \frac{4}{3}x$$

وبالتالي فإن  $m = \frac{-4}{3}$  وإن كان هذا الخط موازياً للخط المطلوب فإن ميل الخط المطلوب هو أيضاً  $\frac{-4}{3}$  =  $\frac{-4}{3}$  والذي يمر بالنقطة (2,3) وبالتالي يمكن إيجاد معادلته كالآتى:

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$

$$y-3=\frac{-4}{3}(x-3)$$

$$y - 3 = \frac{-4}{3}x + 4$$

$$y = \frac{-4}{3}x + 7$$

وهي معادلة الخط المطلوب في الفرع (a) أعلاه.

أما لحل الفرع (b) فيجب علينا إيجاد ميل الخط المعلوم بعد تحويله للصيغة العامة y = mx + b كالآتى:

$$x - 3y + 1 = 0$$

$$-3y = -x - 1$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

وبالتالي فإن  $\frac{1}{2}$  = m وإن كان هذا الخط متعامداً مع الخط المطلوب فإن ميل الخط المطلوب 3 –  $\frac{-1}{1/2} = -3$  والذي يمر بالنقطة (2,3) وبالتالي فإن معادلته يمكن الحادها كالآتي:

$$y - y_1 = m (x - x_1)$$

$$y - 3 = -3 (x - 2)$$

$$y - 3 = -3x + 6$$

$$y = -3x + 9$$

وهي معادلة الخط المستقيم للفرع (b) أعلاه.

مثال 12

حدد إن كانت أزواج المستقيمات التالية متوازية أم متعامدة أم غير ذلك:

Determine whether the following pairs of lines are parallel, perpendicular, or neither:

a) 
$$2x + 3y = 6$$

and 
$$3x - 2y = 6$$

b) 
$$2y + 4x + 1 = 0$$

$$y - 2 + 2x = 0$$

لتحديد فيما إذا كان المستقيمان متوازيان أم متعامدان أم غير ذلك علينا أو لاً تحديد ميل كل منهما ثم تحديد الحالة المعينة. ولذلك فلدينا:

a) 
$$2x + 3y = 6$$

$$3y = 6 - 2x$$

$$y = 2 - \frac{2}{3}x$$

$$\therefore m_1 = -\frac{2}{3}$$

و لإيجاد ميل المعادلة الثانية لدينا:

$$3x - 2y = 6$$

$$-2y = 6 - 3x$$

$$y = -3 + \frac{3}{2}x$$

$$\therefore m_2 = \frac{3}{2}$$

وعند مقارنة الميلين  $m_1 = \frac{-2}{3}$  and  $m_2 = \frac{3}{2}$  يتبين أنهما المقلوب السالب كي عند مقارنة الميلين أن حاصل ضربهما هو  $m_1 = -1$  فهما  $m_1 = -1$  لذلك فإنها خطوط لمعادلات مستقيمة متعامدة فيما بينها.

The pair of lines are perpendicular

لإيجاد ميل المعادلة الأولى لدينا:

$$2y + 4x - 1 = 0$$

$$2y = -4x + 1$$

$$y = -2x + \frac{1}{2}$$

$$m_1 = -2$$

لإيجاد ميل المعادلة الثانية لدينا:

$$y - 2 + 2x = 0$$

$$y = -2x + 2$$

$$m_2 = -2$$

4

و بمقارنــة الميلــين  $m_1 = -2$  and  $m_2 = -2$  ، يتبين أنهما متساويان، أي أن  $m_1 = m_2$  لذلك فهما خطوط لمعادلات مستقيمة متوازية مع بعضها

The pair of lines are parallel.

#### 9-4 تطبيقات رسم المعادلات الخطية:

# **Applications and Graphing Linear Equations**

من خلال الوصف السابق لأنواع المعادلات الخطية والمعادلات الخاصة بها ومحاولة رسم قسم منها نستطيع في هذا المبحث تلخيص جميع الأشكال ورسم المعادلات الخطية كالآتى:

Equations of straight line:

1) General formula AX + BY + C = 0 (A, B, C are constants, and A,B are both non zero)

2) Slope – Intercept formula Y = mx + b

3) Point – slope formula  $y - y_1 = m(x - x_1)$ 

4) Horizontal y = b (m = 0)

5) Vertical x = a (m is undefined)

وجميع هذه الأشكال يمكن رسمها عن طريق عمل جدول من القيم (x,y) حيث أنه وبافتراض قيم x نحصل على قيم y من التعويض في أي من أشكال المعادلات، كما ويمكن الاستعانة بالمساقط intercepts لتحديد نقطتين على أي من الأشكال ثم رسم الخط المستقيم الواصل بينها. والأمثلة التالية لتوضيح عملية رسم المعادلات الخطية كالآتي:

مثال 13

ارسم معادلة الخط المستقيم التالية:

Graph the following linear equation:

$$2x - 3y = 6$$

وكما تم وسبق ذكره يمكن الاستعانة بنقطتي المساقط intercepts إن وجدت شم رسم الخط المستقيم الواصل بينها. ويمكن أن نجد نقطة ثالثة للتأكد من صحة الحل. وهنا لدينا:

عندما x = 0 لدينا:

$$2x - 3y = 6$$

$$2(0) - 3y = 6$$

$$-3y = 6$$

$$y = -2$$

$$(x_1, y_1) = (0, -2)$$
 لذلك فإن النقطة الأولى

أما عندما y = 0 فلدينا:

$$2x - 3y = 6$$

$$2 x - 3 (0) = 6$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

$$(x_2, y_2) = (3, 0)$$
 لذلك فإن النقطة الثانية

أما النقطة الثالثة فلتكن عندما y = 2 ولدينا:

$$2x - 3y = 6$$

$$2 x - 3 (2) = 6$$


$$2x - 6 = 6$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

$$(x_2, y_2) = (6, 2)$$
 لذلك فإن النقطة الثانية

ولهذا سيكون رسم المعادلة كما في الشكل رقم (7) التالي:



# 2x - 3y = 6 رسم المعادلة

### مثال 14

ارسم المعادلة الخطية التالية:

Graph the following equation:

$$4y + x - 8 = 0$$

وبنفس الأسلوب السابق يمكن إيجاد نقطتي المساقط كالآتي:

عندما x = 0 عندما

$$4y - 8 = 0$$

$$y = 2$$

أما عندما y = 0 فلدينا:

$$x - 8 = 0$$

$$x = 8$$

ولتكن 
$$x = 4$$
 لدينا:


$$4y + 4 - 8 = 0$$

$$4y - 4 = 0$$
$$y = 1$$

لذلك فإن النقاط الثلاث بشكل جدول هي:

X	0	4	8
Y	2	1	0

وبالتالي نحصل على الشكل رقم (8) لرسم المعادلة كالآتي:



الشكل رقم (8)

$$4y + x - 8 = 0$$
 رسم المعادلة

أما عن الأمثلة النطبيقية Applied examples للمعادلات الخطية وكيفية المتعامل معها ورسمها فسيتم من خلال الأمثلة القادمة، حيث أن تطبيقات نموذج الكلفة الكلفة الكلفة الكلفة Linear cost model سيظهر في المثال رقم (15) والمثال رقم (15)، أما علاقة العرض والطلب Supply and Demand فسيظهر في المثال رقم (18) كالآتي:

#### مثال 15

الكلفة الثابتة في اليوم الواحد هي \$100 والكلفة المتغير لعمل باوند واحد من الشاي هي أما أو \$0.6. حدد معادلة الكلفة وارسمها ثم أوجد كلفة عمل 500 باوند من الشاي في اليوم الواحد.

The fixed costs per day are \$100, and the variable cost of processing 1 pound of tea is ar \$0.6. Give the linear cost equation and graph it. Then, find the cost of processing 500 pounds of tea in one day.

لنفرض أن c تمثل الكلفة بالدو لار لعمل x باوند من الشاي لليوم الواحد. لهذا فإن الكلفة الكلية Total cost تتمثل بالمعادلة الخطية التالية:


C = mx + b

حيث أن: m يمثل الكلفة المتغيرة variable cost لكل وحدة (لكل بواند) b تمثل الكلفة الثابتة

ومن معديات هذا المثال لدينا العلاقة التالية:

$$C = 0.6 x + 100$$

ولرسم هذه المعادلة يمكننا استخدام نقطتين كالآتي: لنفرض أن x=100 فإن c=200 ونفرض أن c=200 فإن c=160 وسيكون الرسم كما في الشكل رقم (9) التالى: (100, 160)



الشكل رقم (9)

رسم المعادلة للمثال رقم (15)

أما لإيجاد كلفة إنتاج 500 وحدة لدينا:

C = 0.6 (500) + 100 = 400

أي أن إنتاج وتهيئة 500 باوند يكلف 400\$.

## مثال 16

أوجد معادلة الكلفة C لنموذج العلاقة الخطية إذا كانت الكلفة الثابتة هي 400\$ لليوم الواحد وكلفة إنتاج 20 وحدة من المنتج هي 600\$.

Find an equation for C as a linear cost model of the fixed cost is \$400 per day and it costs \$600 to produce 20 units.

المعادلة الخطية للكلفة هي:

$$C = mx + b$$

C=600 و x=20 ، b=400 : التعويض في هذه المعادلة بالقيمة التالية: x=20 ، x=

$$600 = 20m + 400$$

$$200 = 20m$$

$$m = \frac{200}{20} = 10$$

و الذي يمثل ميل slope للمعادلة الخطية المطلوبة، وبالتالي فإن معادلة الكلفة المطلوبة هي:


$$c = 10x + 400$$

# مثال 17

كلفة إنستاج 10 حاسبات في اليوم الواحد هي 2000\$ بينما الكلفة هي 3500 x إنستاج 25 حاسبة في اليوم الواحد. افترض الموديل الخطي للكلفة، حدد العلاقة التي تمثل معادلة الكلفة x لإنتاج x حاسبة في اليوم الواحد وارسم المعادلة.

The cost of manufacturing 10 computers per day is \$2000, while it costs \$3500 to produce 25 computers per day. Assuming a linear cost model determine the relationship representing the total cost c of producing x computers per day and graph the equation.

من المعلومات المتوفرة في هذا التطبيق لدينا نقطتين تمثلان العلاقة بين عدد السوحدات المنتجة x وكلفة الإنتاج y هما (10,2000) و (25,3500). وعند رسم هاتين النقطتين وإيصالهما بالخط المستقيم فهو يمثل الرسم بالنسبة لمعادلة الكلفة الخطية c والذي يظهر في الشكل رقم (10) التالي:



الشكل رقم (10)

رسم العلاقة في المثال رقم (17)

أما الميل m للخط المستقيم الذي يربط بين هاتين النقطتين هو:

$$M = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3500 - 2000}{25 - 10} = \frac{1500}{15} = 100$$

وباستخدام صيغة النقطة والميل فإن المعادلة الخطية للكلفة المطلوبة للخط المستقيم Linear cost model والذي ميله 100 m = 100 هي:

$$C - C_1 = m (x - x_1)$$
  
 $c - 2000 = 100 (x - 10)$   
 $c = 100x + 1000$ 

وهي معادلة العلاقة المطلوبة.

#### مثال 18

تاجر للسيارات يستطيع أن يبيع 10 سيارات في اليوم الواحد بسعر 5000\$ للسيارة الواحدة ولكنه يستطيع أن يبيع 15 سيارة في اليوم إذا كان السعر 4500\$ للسيارة الواحدة. حدد معادلة الطلب وافترض أنها معادلة خطية.

A car dealer can sell 10 cars per day at \$5000 per car, but he can sell 15 cars if the price is \$4500 per car. Determine the demand equation, assuming it is linear.

نفترض أن x يمئل كمية الطلب quantity demand والذي يمثل المحور y-axis والذي يمثل المحور الأفقي x-axis فيمثل المحور العمودي price per unit وبالتالي فإن النقطتين على منحنى الطلب demand curve هما (10,5000) و (15,4500).

وبما أن معادلة الطلب هي معادلة خطية demand equation is liner فإن هده هد المعادلة هي معادلة خط مستقيم يمر بالنقطتين أعلاه. لذلك فإن الميل m لهذه المعادلة هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4500 - 5000}{15 - 10} = \frac{-500}{5} = -100$$

وباستخدام صيغة الميل 100 = m والنقطة (10,5000) نستطيع إيجاد العلاقة الخطية كالآتى:


$$y - y_1 = m (x - x_1)$$

$$p - 5000 = -100 (x - 10)$$

$$p - 5000 = -100x + 1000$$

$$p = -100x + 6000$$

وهي معادلة الطلبة المطلوبة والشكل رقم (11) يمثل رسم المعادلة:



# 4-10 أنظمة المعادلات الخطية لمتغيرين:

# Systems of Linear Equations in two variables

لقد تم تعريف المعادلة الخطية Linear equation وكذلك تم التعرف على كيفية حلها للحصول على قيمة المتغير فيها. وسيتم هنا تعريف نظام من المعادلات الخطية عندما تكون لدينا أكثر من معادلة خطية ولنفس المتغيرات ويراد منها الحصول على قيم المتغيرات فيها.

السنظام الذي يحتوي على معادلتين خطيتين وبمتغيرين هو النظام الذي له الشكل العام التالي:

$$A_1X + B_1Y = C_1$$

$$A_2X + B_2Y = C_2$$

حيث أن  $A_1,A_2$  و  $B_1,B_2$  و  $B_1,B_2$  جميعها ثوابت حقيقية ويسمى System of two equations and two variables

وهناك العديد من المشاكل في الاقتصاد والمالية والإدارة Systems of linear تقود إلى ما يعرف بأنظمة المعادلات الخطية equations والمطلوب هو حل هذه الأنظمة والتوصل إلى النتائج.

أما عن طرق حل أنظمة المعادلات الخطية بمتغيرين فهي:

1) Graph Method.

طريقة الرسم

2) Elimination by Addition.

طريقة الحذف

3) Substitution.

طريقة التعويض

وسيتم التعرف على هذه الطرق المختلفة وكيفية استخدامها لحل الأمثلة التطبيقية كالآتى:

# مثال 19

إذا كانت كلفة 2 قميص الكبار وقميص واحد للأطفال هي 9\$. وكانت كلفة قميص واحد للكبار وثلاث قميص للأطفال هي 12\$. ما هو سعر كل قميص.

Suppose that the cost of two adult shirts and one child shirt is \$9 and if one adult shirt and three child shirt cost \$12. What is the price for each.

لنفرض أن x يمثل سعر القميص للكبار

وأن y يمثل سعر القميص للصغار

وبالتالي فإن:

$$2x + y = 9$$

... (1)

$$x + 3y = 12$$

... (2)

وهاتان المعادلتان تكونان نظاماً من معادلتين خطيتين ومتغيرتين (مجهولين) هما x و y

System of two equations and two variables

و لأجل حل هذا النظام لدينا:

a) Graph Method:

نقوم برسم المعادلتين في مكان واحد والنقطة التي يتقاطع فيها الخطان المستقيمان للمعادلتين هو حل هاتين المعادلتين، بمعنى أنه حل النظام.

وكما تم رسم المعادلة الخطية سابقاً سنقوم برسم هاتين المعادلتين بعد عمل جدول بقيم كل منها كالآتى:


(1) المعادلة 2x + y = 9

X: 0 1 2 3 Y: 9 7 5

(2) المعادلة x + 3y = 12

X: 0 3 6 Y: 4 3 2

ورسم المعادلتين يظهر في الشكل رقم (12) التالية:



الشكل رقم (12)

رسم المعادلتين في المثال رقم (19)

ويلاحظ من الشكل أعلاه أن نقطة التقاطع هي (3,3) وبالتالي فإن سعر قميص الكبار 3\$ وسعر قميص الأطفال هو 3\$.

b) Elimination by Addition:

والآن سنقوم بحل نفس المثال باستخدام الطريقة الثانية وهي طريقة الحذف بالإضافة وسيتم عرضها كالآتي:

y أذا ضربنا المعادلة (1) في (3–) وجمعنا المعادلتين نستطيع حذف x وإذا ضربنا المعادلة (2) في (2–) وجمعنا المعادلتين نستطيع حذف

$$2x + y = 9$$

... (1)

$$-2x - 6y = -24$$

... (2)

جمع المعادلتين وحذف x

-5y = 15

y = 3

نعوض عن قيمة y في المعادلة (1) لإيجاد قيمة x كما يلي:

2x + 3 = 9

2x = 9

x = 3

وبالتالي في ن قيمة x هي 3 وقيمة y هي 3. وذلك يعني أن سعر قميص الكبار x وسعر قميص الأطفال هو x وسعر قميص الأطفال هو x

وهذه النتيجة متفقة تماماً مع الطريقة الأولى.

c) Substitution:

والآن سيتم حل نفس المثال بالطريقة الثالثة وهي طريقة التعويض باستخدام المعادلة (1) نجد قيمة y بدلالة x كالآتي:

$$y = 9 - 2x$$
 ... (3)

ثم يتم تعويض ذلك في المعادلة (2) ليصبح لدينا:

x + 3(9 - 2x) = 12

x + 27 - 6x = 12

-5x = -15

x = 3

وأخيراً نعوض عن قيمة x بالمقدار 3 في المعادلة (3) لنجد أن:

$$y = 9 - 2(3)$$

y = 3

وهذا يعني أن سعر قميص الكبار 3\$ وسعر قميص الأطفال هو \$\$. وهذه النتيجة منفقة تماماً مع الطريقتين السابقتين.

## مثال 20

أحد أصحاب معارض السيارات رغب بتوسيع عمله لشراء نوعين من السيارات الحديثة أحدهما صغيرة الحجم وكل سيارة تكلف \$3000 والنوع الثاني كبيرة الحجم وكل سيارة من النوع الصغير تستغل مساحة من المعرض مقداره 40 قدم مربع أما السيارة من النوع الكبير فتستغل مساحة مقدارها 50 قدم مربع من المعرض. فإذا كان المالك يملك فقط \$20000 لهذه الصفقة ولديه مساحة مقدارها 2600 قدم مربع في المعرض الخاص بالسيارات. ما هي العدد المطلوب شراءه من كل نوع لاستخدام المبالغ والمساحة المتوفران أفضل استغلال.

A car dealar wants to expand his business by buying and displaying two types of cars, that have recently appeared on the market. Each car of the first type costs \$3000 and each car of the second type costs \$4000. Each car of the first type occupies 40 square feet of floor space, where as each car of the second type occupies 50 square feet of the floor space. How many cars of each type should he bought and displayed to make fullure of the available \$200000 for capital and 2600 square feet for space.

افترض أن المالك اشترى x سيارة صغيرة و y سيارة كبيرة

فإن المعادلة الأولى والتي تمثل الكلفة هي:

3000 x + 4000 y = 200000

أما المعادلة الثانية والتي تمثل المساحة فهي:

40 x + 50 y = 2600

وبذلك فإن النظام هو:

 $3000 \text{ x} + 4000 \text{ y} = 200000 \dots (1)$ 

40 x + 50 y = 2600 ... (2)

وللحل بطريقة الحذف بالإضافة elimination by addition سنقوم بضرب المعادلة (2) في (80-) للحصول على:

$$3000 x + 4000 y = 200000$$

$$-3200 \text{ x} - 4000 \text{ y} = -208000$$

جمع المعادلتين

$$-200 x = -8000$$

$$X = 40$$

وبالتعويض في المعادلة (2) نحصل على:

$$40(40) + 50 y = 2600$$

$$1600 + 50 y = 2600$$

$$50 y = 1000$$

$$y = 20$$

وبعني ذلك أن العدد المطلوب من السيارات ذات الحجم الصغير هو 40 وذات الحجم الكبير هو 20 سيارة.

#### مثال 21

حل كلاً من أنظمة المعادلات التالية بالطرق الثلاث:


$$a) x - 2y = 2$$

... (1)

$$x + y = 5$$

... (2)

الحل بالرسم وبالرجوع إلى الشكل رقم (13) التالي:



الشكل رقم (13)

رسم مثال (21) الفرع (a)

$$y = 1$$
 و  $x = 4$  فإن الحل هو

الحل بالحذف:

$$x - 2y = 2 \qquad \dots (1)$$

$$x + y = 5 \qquad \dots (2)$$

نضرب المعادلة (1) في (1-) لنحصل على:

$$x - 2y = -2$$
$$x + y = 5$$

جمع المعادلتين

$$3 y = 3$$
$$y = 1$$

نعوض عن قيمة y في المعادلة (2) لنحصل على:

$$x + 1 = 5$$
$$x = 4$$

x = 5 - y (2) أما عن الحل بالتعويض فلدينا من المعادلة

ونعوض عن ذلك في المعادلة (1) لنحصل على:


$$(5-y)-2y=2$$
$$5-y-2y=2$$
$$-3y=-3$$
$$y=1$$

y = 1 و x = 4 و يلاحظ بأن الطرق الثلاث تتفق في النتيجة والحل وهو

b) 
$$x + 2y = -4$$
 ... (1)

$$2x + 4y = 8$$
 ... (2)

الحل بالرسم يتم في الشكل رقم (14) التالي:



رسم المثال (21) الفرع (b)

وبما أن الخطين متوازيين parallel lines فلا توجد نقاط تقاطع ويعني ذلك عدم وجود حل للمعادلتين.

أما عن حل النظام نفسه بطريقة الحذف لدينا:

$$x + 2y = 4$$
 ... (1)  
 $2x + 4y = 8$  ... (2)  
 $-2x - 4y = 8$   
 $2x + 4y = 8$   
 $2x + 4y = 8$   
 $zero = zero$ 

لا يوجد حل لهاتين المعادلتين أو لهذا النظام.

# 4-11 أنظمة المعادلات الخطية لثلاث متغيرات:

# Systems of linear equations in three variables

بعد أن تعرفنا على نظام المعادلات الخطية لمتغيرين يمكن تعميم كتابة المنموذج وحل الأنظمة لأكثر من متغيرين. وسيتم في هذا المبحث الحديث عن الأنظمة الثلاث متغيرات والتي تكتب بالشكل العام العالي:

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = k_1$$
  
 $a_2 x + b_2 y + c_2 z = k_2$ 

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = k_3$$

أما عن حل هذه الأنظمة فيتم باتباع طريقة الحذف Elimination السابق تطبيقها مع تعديل معين للتعامل مع المعادلات الثلاث كالآتي:

- 1) نختار أي معادلتين من النظام ونقوم بحذف أحد المتغيرات الثلاث بواسطة الحذف Elimination والنتيجة تعطي معادلة واحدة لمتغيرين two variables.
- 2) نختار أي معادلتين أخرى لنقوم بحذف نفس المتغير الذي تم حذفه في الخطوة رقم (1) لإيجاد معادلة ثانية لنفس المتغيرين السابقين.
- 3) نستخدم المعادلتين الناتجتين من الخطوتين (1) و(2) أعلاه لتكوين نظام من المعادلات الخطية بمتغيرين System of two Variables ونقوم بحل هذا النظام باتباع الطرق السابق ذكرها في المبحث السابق لإيجاد قيم المتغيرين المجهولين.
- 4) نعوض في أي من المعادلات الأصلية للنظام من الثلاث معادلات عن قيم المتغيرين اللذين تم حلهما في الخطوة رقم (3) لإيجاد المتغير الثالث

والذي تم حذفه سابقا. وبالتالي يصبح لدينا حل للنظام و المعادلات الثلاث.

ولتطبيق الخطوات السابقة يمكن اتباع خطوات حل الأمثلة التالية:

#### مثال 22

حل المعادلات التالية Solve the following Equations:

$$3x - 2y + 4z = 6$$
 ... (1)

$$2x + 3y - 5z = -8$$
 ... (2)

$$5x - 4y + 3z = 7$$
 ... (3)

يلاحظ هنا أنه تم ترقيم المعادلات وذلك لأن اتباع خطوات حل هذا النظام يكون أسهلاً وأوضح عند ذكر رقم المعادلة التي يراد التعامل معها.

وباختيار حذف المتغير y، وذلك لأن معاملاته z-، z-، z-، z- في المعادلات الثلاث أبسط في التعامل من معاملات المتغير ان الآخر ان z- أو z- الثلاث أبسط في التعامل من معاملات المتغير ان الآخر ان z- أو z- المتعامل من معاملات المتغير ان الآخر ان z- أو z- المتعامل من معاملات المتغير ان الآخر ان z- أو z- المتعامل من معاملات المتغير ان الآخر ان z- أو z- المتعامل من معاملات المتعامل من المتعام

باستخدام المعادلتين (1) و(2) وبضرب المعادلة رقم (1) في 3 وضرب المعادلة رقم (2) في 2 نحصل على ما يلى:

وهنا قمنا بترقيم المعادلة الأخيرة بالمعادلة رقم (4)

وباستخدام المعادلتين (1) و(3) وبضرب المعادلة رقم (1) في 2- أما المعادلة رقم (3) فتبقى على حالها نحصل على ما يلى:

$$-6x + 4y - 8z = -12$$

$$5x - 4y + 3z = 7$$

$$-x - 5z = -5$$
... (5)

وهنا قمنا بترقيم المعادلة الأخيرة بالمعادلة رقم (5).

أما الآن فسنضع المعادلتين (4) و (5) مع بعضهما ليكونا نظاماً خطياً من متغيرين كالآتى:

$$13x + 2z = 2$$
 ... (4)

$$-x - 5z = -5$$
 ... (5)

ونختار الآن حذف أحد المتغيرين x أو z بملاحظة معاملات كل منهم وباتباع نفس الخطوات السابق ذكرها لحل الأمثلة في المبحث السابق.

وبضرب المعادلة رقم (5) في 13 وإضافتها للمعادلة رقم (4) نقوم بحذف x والحصول على ما يلى:

$$13x + 2z = 2$$

$$-13x - 65z = -65$$

$$-63z = -63$$

وبجمع المعادلتين

$$z = 1$$

والآن نقوم بالتعويض عن z بالقيمة (1) في أي من المعادلتين (4) أو (5) لإيجاد قيمة المتغير x. وباستخدام المعادلة رقم (5) نحصل على:

$$-x - 5z = -5$$
  
 $-x - 5(1) = -5$ 

$$-x = 0$$

$$x = 0$$

وأخيراً نقوم بالتعويض عن z بالقيمة (1) وعن x بالقيمة (0) بأي من المعادلات (1)، (2) أو (3) لإيجاد قيمة المتغير الثالث والأخير y كالآتي. وباستخدام المعادلة رقم (1) نحصل على:

$$3x - 2y + 4z = 5$$

$$3(0) - 2y + 4(1) = 6$$

$$-2y = 2$$

$$y = -1$$

وبالتالى فإن حل النظام المطلوب من ثلاث معادلات بثلاث متغيرات هو:

$$x = 0 \qquad , \qquad y = -1$$

$$y = -1$$

and 
$$z = 1$$

وللتأكد من صحة الحل نستطيع التعويض عن قيم المتغيرات في المعادلات الثلاث للحصول على ما يلى:

$$3x - 2y + 4z$$

$$3(0) - 2(-1) + 4(1) = 6$$

$$2 + 4 = 6$$

$$6 = 6$$

وذلك يعنى أن قيم المتغيرات تحقق المعادلة رقم (1)

$$2x - 3y - 5z = -8$$

$$2(0) 3(-1) - 5(1) = -8$$

$$-3 - 5 = -8$$

وذلك يعني أن قيم المتغيرات تحقق المعادلة رقم (2)

$$5x - 4y + 3z$$

$$5(0) - 4(-1) + 3(1) = 7$$

$$4 + 3 = 7$$

$$7 = 7$$

وبما أن قيم المتغيرات تحقق المعادلات الثلاث فإن ذلك يعنى أن الحل صحيح و هو:

$$x = 0 \qquad , \qquad y = -1$$

$$z = 1$$

#### مثال 23

حل نظام المعادلات الخطية التالية:

Solve the following system of linear equations:

$$x + 3y - z = 4$$

$$2x + y + 2z = 10$$

$$3x - y + z = 4$$

وباتباع نفس الخطوات السابق ذكرها سيكون الحل كالآتي:

وباختيار المعادلتين (1) و(2) بعد ضرب المعادلة رقم (1) بالقيمة 2 وجمعها مع المعادلة رقم (2) نحصل على:

باستخدام المعادلتين (1) و (2) وبضرب المعادلة رقم (1) في 3 وضرب المعادلة رقم (2) في 2 نحصل على ما يلي:

$$-2x - 6y + 2z = -8$$

$$2x + y + 2z = 10$$

$$-5y + 4z = 2 \qquad ... (4)$$

وبجمع المعادلتين

وباختيار المعادلتين (1) و(3) بعد ضرب المعادلة رقم (1) بالقيمة 8-6 وجمعها مع المعادلة رقم (3) نحصل على:

$$-3x + 9y + 3z = -12$$
 $3x - y + z = 4$ 
 $-10y + 4z = -8$  ... (5)

نحصل على نظام من المعادلتين (4) و (5) وبمتغيرين y و z كالآتي:

$$-5y + 4z = 2$$
 ... (4)

$$-10y + 4z = -8$$
 ... (5)

وبضرب المعادلة رقم (4) في 2- وجمعها مع المعادلة رقم (5) نحصل

على:

$$10y - 8z = -4$$
  
 $-10y + 4z = -8$ 

وبجمع المعادلتين

$$-4z = -12$$

z = 3

وبالتعويض في المعادلة رقم (4) نحصل على:

$$-5y + 4z = 2$$

$$-5y + 5(3) = 2$$

$$-5y = -10$$

$$y = 2$$

وأخيراً بالتعويض في المعادلة رقم (1) نحصل على:

$$x + 3y - z = 4$$

$$x + 3(2) - 3 = 6$$

$$x + 3 = 4$$

$$x = 1$$

وبذلك فإن حل النظام هو:

$$x = 1$$
 ,  $y = 2$ 

and z = 3

وللتأكد من صحة الحل نعوض في المعادلات الأصلية ويكفي بالتعويض في

أحدهما ولتكن المعادلة رقم (2):

$$2x + y + 2z = 10$$

$$2(1) + 2 + 2(3) = 10$$

$$2 + 2 + 6 = 10$$

وبالتالي فإن الحل صحيح.

وكذلك غالباً ما نستخدم طريقة التعويض Substitution لحل أنظمة المعادلات لثلاث متغيرات وكما في الأمثلة التالية:

The method of substitution can also often be used to solve systems of equations with three or more variables, as in there two examples

مثال 24

حل نظام المعادلات التالية:

Solve the following system of linear equations:

$$X_1 - X_2 - X_3 = 1$$
 ... (1)

$$-4X_1 - 2X_2 + 3X_3 = 6 ... (2)$$

$$2X_1 + X_2 + 3X_3 = 6$$
 ... (3)

لحل هذا النظام بطريقة التعويض لدينا ما يلى:

نوجد قيمة  $X_1$  كما في المعادلة (4) باستخدام المعادلة (1) كالآتي:

$$X_1 = (X_2 + X_3 + 1)$$
 ... (4)

نعوض الآن بما يساوي  $X_1$  في المعادلتين (2) و (3).

Now we substitute this expression for X into the remaining two equations.

$$-4(X_2 + X_3 + 1) - 2X_2 + 3X_3 = 6$$

$$2(X_2 + X_3 + 1) + X_2 + 3X_3 = 6$$

الآن نقوم بتبسيط المعادلتين لإيجاد قيم  $X_2$  و  $X_3$  و كما يلي:

$$-4X_2 - 4X_3 - 4 - 2X_2 + 3X_3 = 6$$

$$-6X_2 - X_3 = 10 ... (5)$$

$$2X_2 + 2X_3 + 2 + X_2 + 3X_3 = 6$$

$$3X_2 + 5X_3 = 4$$
 ... (6)

الآن نحل المعادلتين (5) و(6) كالآتى:

$$-6X_2 - X_3 = 10 ... (5)$$

 $2(3X_2 + 5X_3 = 4)$ 

... (6)

 $-6X_2 - X_3 = 10$ 

... (5)

 $6X_2 + 10X_3 = 8$ 

... (6)

 $9X_3 = 18$ 

 $X_3 = 2$ 

الآن نعوض في المعادلة (5) قيمة  $X_3$  لنحصل على:

 $-6X_2 - 2 = 10$ 

 $-6X_2 = 12$ 

 $X_2 = -2$ 

الآن نعوض في المعادلة (4) لإيجاد قيمة  $X_1$ :

 $X_1 = (-2 + 2 + 1)$ 

 $X_1 = 1$ 

وللتحقيق من نتيجة الحل نعوض في المعادلة (1):

 $X_1 - X_2 - X_3 = 1$ 

1 + 2 - 2 = 1

الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن.

مثال 25

حل نظام المعادلات التالية:

Solve the following system of equations:

 $X_1 + X_2 + X_3 = 6$ 

... (1)

 $2X_1 - X_2 + 3X_3 = 9$ 

... (2)

 $-X_1 + 2X_2 + X_3 = 6$ 

... (3)

للحل أو لا نجد قيمة  $X_1$  وكما في المعادلة (4) باستخدام المعادلة (1) لنحصل

على:

 $X_1 = (6 - X_2 - X_3)$ 

... (4)

بالقسمة لطرفي المعادلة على (3-) نحصل على:

 $X_3 = 1$ 

نعوض في المعادلة (1) عن قيمة X3:

$$X_2 - 4(1) = -6$$

$$X_2 = -2$$

الآن نعوض عن  $X_3$  و  $X_2$  في معادلة (4) لإيجاد قيمة  $X_1$ :

$$X_1 = (1 - 3(-2) - 4(1))$$

$$X_1 = 1 + 6 - 4$$

$$X_1 = 3$$

$$X_1 = 3$$
 ,  $X_2 = -2$  ,  $X_3 = 1$ 

$$X_3 = 1$$

الآن للتأكد من الحل نعوض في إحدى المعادلات الثلاث وكما يلي:

$$3X_1 + 10X_2 + 8X_3 = -3$$

$$3(3) + 10(-2) + 8(1) = -3$$

$$9 - 20 + 8 = -3$$

$$-3 = -3$$

إذن الحل صحيح الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن.

## أسئلة الفصل الرابع Exercises for chapter four

أوجد الميل لكلاً من المستقيمات التي تربط أزواج النقاط التالية للأسئلة (1-4):

#### Find the slope of each line joining each pair of points:

- 1) (4, 6) and (1, 2)
- 2) (4, -3) and (1, -5)
- 3) (3, 0) and (5, 0)
- 4) (-4, 1)and (-4, 3)

## أوجد معادلة الخط المستقيم لكل مما يلي للأسئلة (5-19):

#### Find the equation of the line for the following:

- 5) passing through (3, 2) with slope 4.
- 6) passing through (2, -3) with slope -4.
- 7) passing through (5, 6) with zero slope.
- 8) passing through (4, -2) and (5, 6).
- 9) passing through (3, 2) and (4, 5).
- 10) passing through (4, -3) and (5, 9).
- 11) passing through (4, -3) with no slope.
- 12) with y-intercept –6 and slope  $\frac{1}{4}$ .
- 13) with y-intercept 3 and slope  $-\frac{1}{2}$ .
- 14) with y-intercept -4 and slope 4.
- 15) passing through (3, -1) and parallel to the line 6x + 2y + 4.
- 16) passing through (-2,0) and parallel to the line passing through (3,4) and (2,1).

- 18) passing through (3, -2) and perpendicular to the line 4x + 2y 4 = 0.
- 19) passing through (4, 3) and perpendicular to the line passing through (1, 2) and (3, 2).

أوجد معامل التقاطع للمتغير y للمعادلات الخطية التالية للأسئلة (20-24):

Find the slope and the y-intercept for each of the following linear relations:

20) 
$$4y - 6x = 12$$

21) 
$$5x + 4y = 18$$

22) 
$$4x + 8 = 0$$

23) 
$$5y - 7 = 0$$

$$24) \ \frac{y}{6} + \frac{x}{8} = 2$$

حدد فيما إذا كانت أزواج الخطوط المستقيمة التالية هي خطية متوازية أو متعامدة أو غير ذلك للأسئلة (25-30):

Determine whether the following pair of equations having parallel or perpendicular lines or not:

25) 
$$4x - 6y = 12$$

$$6x + 4y = 12$$

26) 
$$2x = 2y$$

$$2x + 2y = 4$$

27) 
$$4x = -y - 6$$

$$y = -2x - 4$$

28) 
$$x = -4 - 6y$$

$$4y + 6x = 10$$

29) 
$$x - 3 = 0$$

$$4 - x = 0$$

30) 
$$6x + 8y = 2$$

$$6x - 8y = 2$$

## حل الأسئلة التطبيقية التالية (31-32):

#### Solve the following applications:

- 31) (Linear cost Model) The total cost of manufacturing 50 computers per week is \$10000 and the total cost for 100 computers per week is \$15000:
  - a) Determine the cost equation, assuming it to be linear.
  - b) What are the fixed cost and the variable cost per unit.
  - c) What is the cost of producing 200 computers per.
- 32) (Demand Relation) A car manufacturer finds that at \$6000 per car, sales are 5000 cars per month. And at \$5000 per car, sales are 6000 cars per month. Determine the demand equation, assuming it to be linear.

## حل أنظمة المعادلات الخطية التالية للأسئلة (33-50):

#### Solve the following systems of linear equations:

34) 
$$2y - 4x = 1$$
 and

$$5y - 10x = \frac{5}{2}$$

35) 
$$y - 2x = 1$$

$$2y - 4x = -3$$

36) 
$$3x - 6y = -2$$

$$-4y + 8x = -1$$

$$37) -10y + 2x = 8$$

$$20y - 4x = -16$$

38) 
$$2y + 2x = 10$$

$$2y - 2x = 2$$

39) 
$$3y - x = 2$$

$$y + 2x = 10$$

$$40) 4y + 3x = 26$$

$$3y - 11x = -7$$

41) 
$$3y - 6x = -9$$

$$-2y + 4x = 12$$

42) 
$$2x_1 - x_2 - x_3 = 5$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 4$$
  
 $3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 3$ 

43) 
$$5x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -2$$

$$3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 19$$

$$2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = -15$$

44) 
$$2x_1 - 11x_2 - 3x_3 = 2$$
 and  $x_1 - 3x_2 + x_3 = 1$  and  $x_1 - 8x_2 + 2x_3 = -1$ 

45) 
$$6x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -17$$
 and  $4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = -5$  and  $3x_1 - 2x_2 - 4x_3 = -8$ 

46) 
$$-x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$$
 and  $x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -7$  and  $2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 6$ 

47) 
$$x_1 + 4x_2 - x_3 = -5$$
 and  $2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -5$  and  $3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 11$ 

48) 
$$2x_1 - x_2 + 5x_3 = -3$$
 and  $-x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 1$  and  $x_1 - 3x_2 + x_3 = 4$ 

49) 
$$4x_1 + 2x_2 - x_3 = -9$$
 and  $x_1 - 3x_3 = -6$  and  $2x_1 + x_3 = -5$ 

50) 
$$x_1 + 3x_2 - x_3 = 4$$
 and  $2x_1 + x_2 + 2x_3 = 10$  and  $x_1 + 3x_2 - x_3 = 4$ 

# الفصل الخامس

## الدوال والرسوم

- 1-5 مقدمة
- 2-5 الدوال
- 3-5 رسم الدوال
- 4-5 أنواع الدوال
- 5-5 تركيب الدوال

#### ومن أمثلة ذلك:

- أن مساحة الدائرة تعتمد على نصف قطرها.
- التكاليف الشهرية لمنتج معين يعتمد على عدد القطع المنتجة.
- الأرباح التي تحققها شركة معينة تعتمد على المبيعات لتلك الشركة.

وغيرها من العديد من الأمثلة التطبيقية والتي سنتناول العديد منها ضمن متن هذا الفصل وحسب المفاهيم التي سيتم در استها.

وعندما تكون هناك علاقة ولتكن f تربط عناصر مجموعة مثل A بعناصر مجموعة أخرى مثل B عندئذ تسمى العلاقة f اقتراناً أو دالة function. وبذلك يمكن تعريف الدالة كالآتى:

#### **Function:**

Let A and B are two nonempty sets. Then, a function, say f, from A to B is a rule that assigns to each element in A a unique element in B.

وتستخدم عادة الرموز f, g, F, or G للدالة.

Let f denote a given function, The set A for which f assigns a unique value in B is called the Domain of the function f, The corresponding set of values in B is called the range of the function.

إذا كانت العلاقة f تربط كل عنصر من A بعنصر وحيد من B عندئذ نسمي المجموعة الثانية B بالمدى للدالة المجموعة A بمصنطاق الدالة Domain ونسمي المجموعة الثانية A بالمتغير A بالمتغير Range ويرمز للدوال عادة بالرمز A ويقال عن المتغير A بالمتغير A بالمتغير A بالمتغير A بالمتغير A بالمتغير A المستقل Independent variable ويقال عن المتغير A هناك قيمة مقابلة للمتغير A وبذلك فإن variable وأن لكل قيمة من قيم المتغير A هناك قيمة مقابلة للمتغير A وبذلك فإن المصنطلق Domain هـو المجموعة التي تمثل المتغير المستقل A أما مدى الدالة عن Range قيم المجموعة التي تمثل قيم المتغير التابع A بعد التعويض في الدالة عن قيم المتغير A

If for each x their exists exactly one value of y, we say that y is a function of x, and we write y = f(x).

for example y - 4x + 1, then for each value of x in the real line there is a value for y which is also must be in the real line.

We usually write  $f(x) = x^2$  to define a function that associates the  $x^2$  value with the number x.

Thus,

$$f(3) = 3^2 = 9$$
 , so f associate 9 with 3

$$f(-2) = (-2)^2 = 4$$
, so f associate 4 with -2

$$f(0) = 0^2 = 0$$
 , so f associate 0 with 0

$$f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 = 2$$
, so f associate 2 with  $\sqrt{2}$ 

This formula does not involve a dependent variable.

في كثير من الأحيان، المتغير المستقل x للدالة (x) f(x) لا يكون حراً في قيمه. بمعنى آخر، هناك بعض القيود على تلك القيم وبذلك علينا تعريف وتفسير ما يعرف بالمنطلق للدالة Domain of a function كالآتي:

#### Domain:

If the function f and y = f(x), then the domain of f can be viewed as the set of allowable values for the independent variable x.

وما يعنى بتعريف مفهوم المنطلق Domain أنه إذا كانت الدالة هي y = f(x) وبالشكل y = f(x)

x أما القيم التي نحصل عليها من التعويض في الدالة y = f(x) المتغير y = f(x) أما القيم التبع y = f(x) وتسمى المجموعة بالمجال أو المدى للدالة y = f(x) function .

If x is a number in the domain of f, then the number f(x) that f associates with x is called the value of f at x or the image of x under f.

Thus, if  $f(x) = x^2$ , then the value of f at x = 3 is f(3) = 9, (i,e) 9 is the image of 3 under f.

وبالتالي يمكن تعريف مجال الدالة كالآتي:

#### Range:

Is the set of all possible values of f (x) as x varies over the domain of f.

ويمكن حصر النقاط الواجب مراعاتها لتحديد منطلق الدالة بالتالى:

Restrictions on the indep. Variable that determine the domain of a function generally come about in one of three ways:

- 1) Physical or geometic considerations.
- 2) Natural restrictions that result from a formula used to define a function.
- 3) Artificial restrictions imposed by a problem solver for one purpose or another.

الـنقاط الـثلاثة أعلاه يمكن توضيحها بالأمثلة المحددة عند عرض الأمثلة التالية لتحديد منطلق دالة معينة.

مثال [

أوجد منطلق الدوال التالية:

Find the domain for the following functions:

a) 
$$f(x) = 4x + 1$$

يلاحظ هنا أنه لا توجد أي شروط لتحديد منطلق هذه الدالة وبالتالي فإن المنطلق هو جميع الأعداد الحقيقية \R أي أن:

Domain is  $\Re = (-\infty, +\infty)$ 

b) 
$$f(x) = x^2$$

وهـنا أيضاً يمكن ملاحظة أنه لا توجد أي شروط لتحديد منطلق هذه الدالة باعتـبار أنـه يمكـن تربيع القيم الموجبة والسالبة وبالتالي فإن المنطلق هو جميع الأعداد الحقيقية ٩٦، أي أنه:

Domain is  $\Re = (-\infty, +\infty)$ 

c) 
$$f(x) = \sqrt{x}$$

في هذه الحالة يلاحظ أن هناك شروط لتحديد منطلق هذه الدالة هو من الشكل Natural domain، حيث أنه يمكن جذر القيم الموجبة ولا يمكن جذر القيم

السالبة للحصول على أعداد حقيقية، بمعنى أن الجذور السالبة تسمى وكما تم تعريفه سابقاً بالأعداد الخيالية imaginary وبالتالي فإن منطلق هذه الدالة هو فقط القيم الموجبة، أي أن:

Domain is  $\{x \mid x \ge 0\}$ 

d) f (x) = 
$$\frac{1}{(x-1)(x-3)}$$

وكذلك يلاحظ هنا أن هناك شروط لتحديد منطلق هذه الدالة من الشكل Natural domain وهي أنه لا يمكن القسمة على صفر وذلك لحصولنا على قيم غير معرفة. وهذه الحالة تكون عندما x = 1 أو x = 3 وبذلك فإن منطلق هذه الدالة هو جميع الأعداد الحقيقية ما عدا القيمتين x = 1 أن:

Domain is  $\{x \mid x \neq 1, 3, x \text{ is Reals}\}\$ 

or Domain is  $(-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, \infty)$ 

e) 
$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad x \neq 0$$

But if we write 
$$y = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$$

then, h(x) is defined at x - 2, since

$$h(2) = 2 + 2 = 4$$

Thus, we must write h(x) = x + 2,  $x \ne 2$ 

وفي هذه الحالة نلاحظ أنه عند تطبيق العمليات الجبرية وبواسطة استخدام طريقة الحد المشترك common factor وبعد حذفه من البسط والمقام فإن هذه العملية (تبتر) قطع alter للمنطلق الحقيقي للدالة.

أما عن تحديد مدى الدالة Range of a function فيتم بصورة عامة من الملاحظة Often, the Range of a function is evident by inspection وسيتم عرض ذلك بالمثال التالى:

مثال 2

حدد مدى الدوال التالية Determine the Range of the following:

a) 
$$f(x) = x^2$$

وبالرجوع للمثال (1) السابق فإن المنطلق الطبيعي لهذه الدالة هو الأعداد الحقيقية ( $\infty$ ,  $\infty$ -) =  $\Re$  . ولكن بما أن تربيع القيمة الموجبة وكذلك تربيع القيم السالبة هو قيمة موجبة دائماً positive values لذلك فإن مدى هذه الدالة سيكون فقط القيم الموجبة ، أي أن:

Range is  $\{x \mid x \ge 0\}$ 

b) f (x) = 
$$\frac{x+1}{x-1}$$

منطلق هذه الدالة هو جميع الأعداد الحقيقية ما عدا x=1 والتي تجعل المقام صفراً. ولذلك فلإيجاد القيم المناسبة والتي ستمثل المدى Range فعلينا تحديد شكل معين لإيجاد تلك القيم. والطريقة المناسبة هو حل المعادلة والتي تمثل الدالة f(x) والتي سيرمز لها بالرمز y بدلالة المتغير x وسنحاول تغيير هذه الدالة لتصبح بالشكل أن المتغير x هو بدلالة المتغير y وكالآتى:

$$y = \frac{x+1}{x-1}$$

$$y(x-1) = x+1$$

$$xy - y = x+1$$

$$xy - x = y+1$$

$$x(y-1) = y+1$$

$$x = \frac{y+1}{y-1}$$

y = 1 اعدا القيم ما عدا f(x) هو جميع القيم ما عدا

ويلاحظ من المثال السابق أن الدالة تظهر بشكل معين لمجموعة محددة من القيم. وعندئذ القيم ولكن يمكن أن تظهر الدالة بأكثر من شكل لمجاميع مختلفة من القيم. وعندئذ تعرف الدالة بالوصف functions defined piecewise والتي تظهر في المثال التالي:

مثال 3

Recognize the following function:

a) 
$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x > 2 \\ 4, & x \le 2 \end{cases}$$

وهذه الدالة لها شكل أن تكون x+2 للقيم x أكبر من x ولها شكل أن تكون بشكل الثابت x للقيم x أقل من أو تساوي x.

b) 
$$f(x) = \begin{cases} 2-2x, & x \le -1 \\ 4, & -1 \le x \le 3 \\ 2x-2, & x \ge 3 \end{cases}$$

وهذه الدالة لها ثلاثة أشكال مختلفة حسب المجموعات المختلفة والمؤلف منها منطلق هذه الدالة.

وببساطة يتضح من التعامل مع تعريف الدالة والأمثلة السابقة أنه إذا كانت الدالة معرفة لمجموعة من الحدود والذي يمثل منطلق تلك الدالة فإن قيم الدالة يمكن إيجادها بعد التعويض في الدالة لإيجاد قيمة الدالة value of the function والمثال التالى سيوضح ذلك.

مثال 4

Let 
$$f(x) = 2x + 1$$
,  $0 \le x \le 1$ 

Find: f (0) , f (1) , f (
$$\frac{1}{2}$$
) , f (a) , f (a + h) ,  $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 

ويلاحظ هنا أن المطلوب في هذا المثال إيجاد قيمة الدالة:

$$f(x) = 2x + 1$$

لقيم مختلفة من المتغير x وبذلك فإنه عندما x = 0 فإن:

$$f(0) = 2(0) + 1 = 1$$

و عندما x = 1 فإن:

$$f(1) = 2(1) + 1 = 3$$

أما عندما  $x = \frac{1}{2}$  فإن:

$$f(\frac{1}{2}) = 2(\frac{1}{2}) + 1 = 2$$

وعندما x = a فإن:

$$f(a) = 2 a + 1$$

وعندما x = a + h فإن:

$$f(a + h) = 2(a + h) + 1 = 2a + 2h + 1$$

وأخيراً إيجاد:

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{2a+2h+1-(2a+1)}{h} = \frac{2a+2h+1-2a-1}{h} = \frac{2h}{h} = 2$$

## :Graphs of Functions رسم الدوال

Domain of function عملية تحديد قيم المتغير X والتي تسمى منطلق الدالة Range of function وإيجاد قيم الدالة Y بعد التعويض والتي تسمى بمدى الدالة الدالة Y بعد القيم والذي يمثل قيم X وقيم Y أو Y المقابلة. وبتحديد هذه القيم على المستوى X يمكننا رسم النقاط التي تمثل تلك الدالة وبإيصال هذه النقاط نحصل على رسم للدالة.

الأمثلة التالية ستوضح ذلك:

#### ٰ مثال 5

ارسم الدوال التالية Graph the following functions:

a) 
$$f(x) = x$$


f(x) على قيم x والتي تعود للأعداد الحقيقية سنحصل على قيم x والتي تعود للأعداد الحقيقية كالآتى:

$$x:\dots, -3\;, -2\;, -1\;,\; 0\;, 1\;, 2\;, 3\;, \dots$$

$$f(x): ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...$$

وبذلك فإن رسم الدالة هي الخط الأفقي القطري الذي يظهر بالشكل رقم (1)

التالي:



الشكل رقم (1)

$$f(x) = x$$
رسم الدالة


b) 
$$f(x) = x + 2$$

2 بإضافة الثابت f(x) = x الشكل الشكل والذي يمثل الشابق والذي يمثل الشكل والمدول:

$$x: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...$$

$$f(x): ..., -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...$$

بمعنى أنه بزيادة ذلك الثابت قيم المتغير التابع y ازدادت بمقدار ذلك الثابت عن الدالة الأصلية والتي تم رسمها في الفرع (a) أعلاه. وبذلك فإن رسم هذه الدالة سيظهر في الشكل رقم (2) أدناه:



(2) الشكل رقم (1) f(x) = x + 2


ويلاحظ من هذا الفرع (b) من المثال أنه بإضافة أو طرح ثابت معين لدالة فيان الرسم سيكون مشابه للرسم الأصلي ولكن بإضافة أو طرح الثابت من قيم الدالة.

$$c) f(x) = x^2$$

الجدول المناسب لرسم هذه الدالة هو:

$$x: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...$$

بمعنى أن قيم الدالة جميعها موجبة وذلك لأن تربيع القيم الموجبة والسالبة للمتغير x ستعطينا قيمة موجبة للمتغير y. وبالتالي فإن الرسم سيظهر بالشكل رقم (3) التالي:



(3) الشكل رقم (3) 
$$f(x) = x^2$$
 رسم الدالة

d) 
$$f(x) = \sqrt{x}$$

بما أنه لا يمكن جذر القيم السالبة لذلك فيجب أن تكون قيم x هي فقط قيم موجبة بمعنى أن منطلق هذه الدالة Domain هو القيم الموجبة. ونكتب بذلك:


$$f(x) = \sqrt{x} , \qquad x \ge 0$$

وعن جدول قيم هذه الدالة لدينا:

x:0,1,2,3,...

f(x): 0, 1, 4, 9, ...

وبالتالي فإن رسم هذه الدالة هو بالشكل رقم (4) التالي:



## (4) الشكل رقم (4) الشكل رقم (10) الشكل رسم الدالة

يلاحظ من خلال المثال (5) السابق أن جميع الدوال التي تم رسمها هي لها شكل واحد لمنطلق معين. أما في المثال (6) التالي سنعرض كيفية رسم الدوال التي لها أكثر من شكل لأكثر من منطلق محدد.

#### مثال 6


ارسم الدوال التالية Graph the following functions:

a) 
$$f(x) = \begin{cases} 4, & x < 2 \\ x + 2, & x \ge 2 \end{cases}$$

لرسم هذه الدالة وبالاستعانة بجدول القيم لدينا الجدول التالي:

$$x: \dots -2$$
 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ...

حيث تم التعويض في الشكل الثابت للدالة وهو 4 لجميع القيم للمتغير x أقل من 2 أما عندما أصبح x يساوي 2 أو أكثر تم التعويض في الشكل الآخر للدالة وهو x وبذلك فإن رسم هذه الدالة يظهر في الشكل رقم (5) التالي:



الشكل رقم (5)

رسم الدالة في المثال (6) الفرع (a)


b) 
$$f(x) =$$

$$\begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 \le x \le 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

وبعمل جدول عن طريق التعويض في الشكل المناسب نحصل على:

$$x: ... -1, 0, 1, 2, 3, ...$$

وبالتالي فإن الشكل رقم (6) التالي هو رسم هذه الدالة:




رسم الدالة في المثال (6) الفرع (b)

c) 
$$f(x) = \begin{cases} -x, & x \le 0 \\ x^2, & 0 \le x \le 1 \\ 1, & x \ge 1 \end{cases}$$

جدول قيم هذه الدالة هو:

$$x: ..., -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...$$

وبذلك فإن رسم هذه الدالة يظهر في الشكل رقم (7) التالي: f(x)



الشكل رقم (7)

رسم الدالة في المثال (6) الفرع (c)

### 4-5 أنواع الدوال Kinds of Functions


#### الدالة التربيعية والقطع المكافئ Quadratic Functions and Parabolas

سنعرض في هذا المبحث أنواع الدوال بتسمياتها المختلفة كلاً حسب تعريفها وشكل الدالة الخاصة بها ورسمها وكذلك التطبيقات المختلفة لهذه الدوال.

We will present all kinds of functions with their definitions, graphs, and all applications as follows.

#### a) Constant Functions:

$$f(x) = a$$
, where a is a real constant  
for example,  $f(x) = 2$  and it's graph is:



f(x) = 2 رسم الدالة الثابتة

تعتبر دالة العائد الحدي Marginal Revenue (MR) من الأمثلة الاقتصادية المهمة للدالة الثابتة، حيث أن العائد الإضافي المستحصل من بيع وحدة إضافية من الناتج هو الذي يمثل العائد الحدي. فإذا كانت جميع الوحدات تباع بنفس السعر فإن العائد الحدي سيساوي السعر الذي تباع به وحدة الناتج.


#### b) Linear Function

f(x) = a x + b,

where a and b are real constants,  $a \neq 0$ 

f(x) = a x + b وهـذه الدوال الخطية والتي تتمثل بشكل معادلة خط مستقيم a, b حيث أن a, b

for example, f(x) = 2x + 1 and it's graph is:



f(x) = 2x + 1 رسم الدالة الخطية


#### c) Quadratic Functions:

 $f(x) = a x^2 + b x + c$ ,

where a, b and c are real constants,  $a \neq 0$ 

أما عن رسم هذه الدوال التربيعية فهي عبارة عن منحنى معين حسب شكل الدالة

for example,  $f(x) = a x^2$  and it's graph is:



الشكل رقم (10)


$$f(x) = ax^2$$
 رسم الدالة التربيعية

#### Theorem:

The graph of the quadratic function  $f(x) = a x^2 + b x + c$  ( $a \ne 0$ ) is a parabola that opens upward if a > 0 and downward if a < 0. Its vertex (which is the lowest point when a > 0 and the highest point when a < 0) is at the point.

$$x = \frac{-b}{2a}$$
 and  $y = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 

وعـن رسـم الدالـة التربيعية بتعيين نقطة الرأس أو نقطة الذروة vertex سيكون بالشكل رقم (11) التالى:



الشكل رقم (11)

رسم الدالة التربيعية وتعيين نقطة الرأس vertex

ويجب ملاحظة النقاط التالي في رسم x تعريف الدوال التربيعية كالتالي:

- 1) If b = c = 0, the quadratic function reduces to  $f(x) = a x^2$ , and the coordinates of the vertex given by the above theorem reduce to x = y = 0.
- 2) To get the y-axis of the vertex, it is easier to substitute the value  $x = \frac{-b}{2a}$  into the equation of the parabola instead of remembering the formula.
- 3) The parabola is symmetrical about the vertical line through the vertex.

الأمثلة التالية ستوضح استخدام هذه النقاط في رسم الدوال التربيعية كالآتي:

مثال 7

ارسم الدالة التربيعية التالية وحدد نقطة الرأس أو الذروة. Graph the following function and find its vertex.

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$$

بمقارنة هذه الدالة مع الشكل العام للدالة التربيعية نجد أن:

$$a = 2$$
 ,  $b = -8$  ,  $c = 5$ 

وبالتالي لـتحديد نقطة الرأس vertex علينا التعويض لإيجاد قيمة كل من y, x

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-8)}{2(2)} = \frac{8}{4} = 2$$

f(x) ويمكن التعويض المباشر في الدالة عن قيمة x=2 لإيجاد قيمة y أي الشكل:

$$y = f(2) = 2(2)^{2} - 8(2) + 5$$
  
= 8 - 16 + 5 = -3


أو يمكن إيجاد قيمة y بالتعويض في القانون المحدد بالنظرية للحصول على نفس القيمة كالآتي:

$$y = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{(4)(2)(5)(-8)^2}{4(2)} = \frac{40 - 64}{8} = \frac{-24}{8} = -3$$

ويمكن بسهولة ملاحظة أن التعويض المباشر أسهل وأسرع من التعويض الآخر.

أما عن رسم الدالة فيظهر في الشكل (12) التالي بعد عمل الجدول التالي لقيم الدالة:

$$f(x):...,5,-1,-3,-1,5,...$$



الشكل رقم (12)


## رسم الدالة للمثال رقم (7)

b) Absolute value function:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \ge 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

وعن رسم هذه الدالة والتي تسمى دالة القيم المطلقة فلدينا الشكل رقم (13)

التالي:




رسم دالة القيمة المطلقة

e) Exponential function:

$$f(x) = e^{g(x)}$$

for example,  $f(x) = e^{-x}$ ,  $x \ge 0$  and its graph is:



رسم الدالة الأسية

f) Logarithmic Function:

$$f(x) = \ln x$$

ومن المعروف أن هناك بعض الخصائص للوغاريتمات والتي من الممكن الاستفادة منها للتعامل مع الدوال اللوغاريتمية وهي:

- 1)  $\ln x y = \ln x + \ln y$
- 2)  $\ln \frac{x}{y} = \ln x \ln y$
- 3)  $\ln x^n = n \ln x$
- 4)  $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$

و من المعروف أيضاً أن الدالة الأسية هي معكوس الدالة اللوغاريتمية. وعادة ما يتم التعامل مع الدوال اللوغاريتمية بعد تحويلها إلى دوال أسية، حيث أن:

$$Y = e^x \implies ln y = x lne \implies x = lny$$

وسيتم الآن وبعد التعرف على المفاهيم السابقة وعلى أنواع الدوال وكيفية رسم تلك الدوال الدخول في بعض الأمثلة التطبيقية والتي لها أهمية كبيرة لفهم وتحديد الدور الأساسي للمفاهيم الرياضية في الحياة العملية.

مثال 8

إحدى شركات صناعة التلفزيون تدعى بأن الكلفة الكلية لإنتاج x من الأحمزة بمكن أن توصف حسب الدالة التالية:

A company produces t.v.'s claims that total production cost for x t.v.'s can be described by:

$$c(x) = 1000 + 200 x$$

Find: a) The constant cost

الكلفة الثابتة

b) Graph the function

رسم الدالة


c) The total cost to produce 100 t.v.'s كلفة إنتاج 100 جهاز

للـ تعامل مع هذه الدالة الخطية علينا مقارنتها مع الشكل العام للدالة الخطية وبالتالي فإن:

$$a = 200$$
 ,  $b = 1000$ 

c(0) = 1000 وبذلك فإن الكلفة الثابتة هي

أما عن رسم الدالة الخطية فيمكن ذلك باستخدام الدول التالي والرسم الذي يظهر في الشكل رقم (15) التالي:



C(x) = 1000 + 200x رسم الدالة الخطية

وأخيراً فإن كلفة صنع 100 جهاز هو:

$$c (100) = 1000 + 200 (100)$$
$$= 21000$$

مجمع سكني يحوي على خزان وقود لتزويد المجمع بالوقود. يتم تعبئة هذا الخران في الأول من كانون الثاني ولا توجد أية إضافة للوقود حتى نهاية الشهر. لنفرض أن t يمثل عدد الأيام بعد الأول من كانون الثاني وأن y يمثل عدد الغالونات من الوقود في الخزان. من خلال سجل المصروفات لوحظ وجود علاقة بين t و y تتمثل تقريباً بالمعادلة التالية:

Fuel conception for a block is given by:

$$y = 30000 - 400 t,$$

where t is # of days after Dec. 1 st and y is # callon's of fuel

Graph the function and find number of callon's of fuel remains after 20 days of conception.

هذه الدالة الخطية لمصروفات الوقود تكتب بالشكل التالى:

$$y = 30000 - 400 t$$

$$0 \le t \le 31$$

وبذلك فإن جدول القيم هو:

x: 0

1


2

3

,

y:30000 29600 29200 28800

وأن رسم الدالة يظهر في الشكل رقم (16) التالي:



الشكل رقم (16)

رسم الدالة للمثال رقم (9) y = 30000 - 400t

وأخيراً فإن ما تبقى من الوقود بعد مرور 20 يوماً هو:

$$y = 30000 - 400(20) = 30000 - 8000 = 2200$$

#### مثال 10 /


إحدى الشركات الصناعية الصغيرة طاقتها الإنتاجية محدودة y ويرتبط معدل الكلفة بحجم الإنستاج. وقد لوحظ أن معدل كلفة إنتاج 9 وحدات هو 8.5 دينار ومعدل كلفة إنتاج 10 وحدات هو 8 دنانير وأما معدل كلفة إنتاج 12 وحدة فهو 8.25. أوجد العلاقة الدالية التي تربط معدل الكلفة والإنتاج وارسم تلك الدالة.

A small factory with limited resources has the following data:

# products: 9 10 12

cost : 8.5 8 8.25

State and graph the function that relates # of products with cost واضح هنا أن جدول عدد الوحدات المنتجة والكلفة هو عبارة عن دالة تربط هذين المتغيرين وبذلك فإن رسم هذه الدالة سيظهر في الشكل رقم (17) التالي:



الشكل رقم (17) رسم الدالة للمثال رقم (10)

و المخطط يشير إلى أن الدالة تتناقص ثم تتزايد وبذلك فإن هذه العلاقة تصف دالة تربيعية Quadratic function. أحد محلات بيع الأصباغ يبيع الغالون الواحد من الدهان بــ 4 دنانير إذا كانت طلبية المستهلك أقل من 100 غالون. ويبيع بسعر 3 دنانير للغالون إذا كانت الطلبية على الأقل 100 غالون، بالإضافة لذلك فقد منح صاحب المحل خصم مقداره 50 ديناراً لمن يشتري على الأقل 500 غالون من الدهان. ما هي قائمة المبيعات (x) باعتبارها دالة لعدد الغالونات المباعة x ثم أوجد قائمة بيع 50 غالون، 200 غالون و 1000 غالون من الدهان.

A small company for selling paints sells each gallon by 4 J.D. if the order less than 100 gallon. And sells each gallon by 3 J.D. if the order is at least 100 gallon. Also, the owner gives a discount by 50 J.D. for those buying at least 500 gallons. Write the function and find the price for selling 500 gallon, 200 gallons, and 1000 gallons.

لنفرض أن عدد الغالونات المباعة هي x بسعر 4 دنانير للكمية أقل من 100 غالون وبسعر 3 دنانير للكمية على الأقل 100 غالون، بالإضافة إلى الخصم الثابت بالمقدار 50 ديناراً والذي يجب أن يطرح من سعر البيع إذا كانت الكمية على الأقل 500 غالون و بالتالى فإن الدالة ستكون:

$$f(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \le x < 100 \\ 3x, & 100 \le x < 500 \\ 3x - 50, & x \ge 0 \end{cases}$$

وعليه فإن قائمة بيع 50 غالون ستكون:

$$f(50) = 4(50) = 200$$

وقائمة بيع 200 غالون هي:

$$f(200) = 3(200) = 600$$

أما قائمة بيع 1000 غالون فهي:

$$f(1000) = 3(1000) - 50 = 2950$$

### :Combinations of functions تركيب الدوال

سنعرض هنا في هذا المبحث كيفية تركيب دوال جديدة من الدوال الأصلية على مجاميع مختلفة على مجاميع مختلفة كالآتى:

#### 1) Arithmetic operations on functions:

If f(x) and g(x) are two functions on the same variable x. Then:

a) 
$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

b) 
$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

c) 
$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

d) 
$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$
,  $g(x) \neq 0$ 

ويتضــح من الأشكال أعلاه أن العمليات الجبرية من جمع وطرح وضرب وقسمة على الدوال معرفة وموجودة إن كانت الدوال موجودة للحصول على دوال جديدة باسم  $\frac{f}{g}$ ، f.g  $\cdot$  f-g  $\cdot$  f-g  $\cdot$  f.g.

أما عن منطلق الدوال الجديدة هذه فهو عبارة عن مجموعة التقاطع لمنطلقي الدالتين الأصليتين مع مراعاة عدم إدخال القيم التي تجعل منطلق الدالة  $\frac{f}{g}$  غير معرفاً من خلال القسمة.

The domain of the functions f+g , f-g , f.g is defined to be the intersection of the domains of f and g. for  $\frac{f}{g}$  the domain is the intersection of f and g with the points where g (x) = 0 excluded.

وسيتم من خلال الأمثلة التالية تعريف هذه العمليات الرياضية كالآتى:

#### مثال 12

Let f (x) = x and g (x) =  $x^2$ . Find (f+g) (x), (f-g) (x), (f.g) (x), ( $\frac{f}{g}$ )(x) and state the domains.

عندما تكون:

f(x) = x and  $g(x) = x^2$  then:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = x + x^2$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = x - x^2$$

$$(f.g)(x) = f(x) \cdot g(x) = x \cdot x^2 = x^3$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x}{x^x} = \frac{1}{x}$$

وواضح أن منطلق الدوال الناتجة هو جميع الأعداد الحقيقية  $\Re$  باعتبار أن منطلق الدالة f هو f ما عدا أن منطلق الدالة الأخيرة f هو f ما عدا القيمة f والتي تجعل المقام صفراً.

مثال 13

Let f (x) = 
$$1 + \sqrt{x-2}$$
 and g (x) = x - 1

Find (f+g) (x), (f-g) (x), (f.g) (x),  $\frac{f}{g}(x)$  and state the domains.

بافتر اض أن:

$$f(x) = 1 + \sqrt{x-2}$$

وبافتراض أن:

$$g(x) = x - 1$$

$$(-\infty, \infty)$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = 1 + \sqrt{x-2} + x - 1 = x + \sqrt{x-1}$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = 1 + \sqrt{x-2} - (x-1)$$

$$= 1 + \sqrt{x-2} - x + 1$$

$$= 2 - x + \sqrt{x-2}$$

$$(f.g)(x) = f(x)g(x) = (1 + \sqrt{x-2})(x-1)$$

$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1 + \sqrt{x-2}}{x-1}$$

واضح أن منطلق جميع الدوال 
$$g-f$$
 ،  $f+g$  و  $g-f$  هو:  $g-f$  .  $g-f$  .  $g-f$   $g-f$  .  $g-f$ 

وكـذلك هـو منطلق الدالة الأخيرة  $\frac{f}{g}$  والسبب أن القيمة التي تجعل المقام صفراً لهذه الدالة هو x=1 والذي هو ليس موجودة في منطلق الدالة أصلاً.

#### 2) Composition of functions:

ويطلق على هذا المفهوم تركيب الدالة من دالة أو دوال أخرى بالشكل:

$$f \circ g(x) = f(g(x))$$

and g o f (x) = g(f(x))

و التي تخص دالتين f و g ويمكن من أعلاه إيجاد الدالة f للدالة g أو إيجاد الدالة g الدالة g

وسيتم توضيح المعنى من خلال الأمثلة التالية:

Let f(x) = x - 7, and  $g(x) = x^2$ 

Find f o g (x) and g o f (x)

إذا كان:

f(x) = x - 7, and  $g(x) = x^2$ 

فإن:

f o g (x) = f (g (x)) = f (x<sup>2</sup>) =  $x^2 - 7$ 

و كذلك فإن:

g o f (x) = g (f (x)) = g (x - 7) =  $(x - 7)^2$ 

ا شال 15

Let f (x) = x - 1, and g (x) = 1 +  $\sqrt{x-2}$ 

Find  $f \circ g(x)$  and  $g \circ f(x)$ 

إذا كان:

f(x) = x - 1, and  $g(x) = 1 + \sqrt{x - 2}$ 

فإن:

f o g (x) = f (g (x)) = f (1 +  $\sqrt{x-2}$ ) = 1 +  $\sqrt{x-2}$  - 1 =  $\sqrt{x-2}$ 

و أن:

g o f (x) = g (f (x)) = g (x - 1) = 1 +  $\sqrt{x-1-2}$ = 1 +  $\sqrt{x-3}$ 

#### 3) Inverse function:

To find the inverse function we have to:

a- Solve the function y = f(x) for x in terms of y

b- Switch x and y. The resulting formula will be  $y = f^{-1}(x)$ 

 $f^{-1}(x)$  is called the inverse function of f(x).

وسيتم توضيح خطوات إيجاد الدالة العكسية، حيث أنها الدالة الناتجة بعد تحويل الشكل من كون أن y معتمدة على x إلى أن تكون x معتمدة على y بالأمثلة التالية:

مثال 16

Let  $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$  find the inverse function

لإيجاد الدالة العكسية سنفرض أو y أن f(x) هي y وبالتالي يصبح لدينا:

$$y = \frac{1}{2} x + 1$$

ونحاول أن نعكس هذه الدالة لتصبح الشكل x بدلالة y كالآتي:

$$2y = x + 2 \Rightarrow x = 2y - 2 \Rightarrow x = 2(y - 1)$$

وبالتالي فإن الدالة العكسية f(x) للدالة وبالتالي فإن الدالة العكسية وبالتالي فإن الدالة وبالتالي

$$f^{-1}(x) = 2(x-1)$$

مثال77

Let  $f(x) = e^x$  Find  $f^{-1}(x)$ 

 $y = e^x$  ليجاد الدالة العكسية للدالة  $y = e^x$  نقوم بأخذ اللوغاريتم للطرفين فيصبح

لدينا:

 $\ln y = x \ln x \Rightarrow x = \ln y$ 

وبالتالي فإن  $f^{-1}(x)$  هي:

 $f^{-1}(x) = \ln x$ 

Let  $f(x) = x^2$ . Find the inverse function

نقوم بجذر الطرفين لنحصل على: 
$$y=x^2$$
 لإيجاد الدالة العكسية للدالة  $x=\mp\sqrt{y}$ 

Means that there is 1-1 value from x to y since any value for y gives two values for x.

Here, we can say that there are two inverse functions. But, if we restrict the domain of f(x) then, we can say that:

- a) If  $y = x^2$ ,  $x \ge 0$  then  $x = +\sqrt{y}$  and the inverse function here is  $f^1(x) = \sqrt{x}$ ,  $x \ge 0$
- b) If  $y = x^2$ , x < 0 then  $x = -\sqrt{y}$  and the inverse function will be  $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$ ,  $x \ge 0$

## أسئلق الفصاء الخامس **Exercises for chapter Five**

أوجد منطلق ومدى كلاً من الدوال التالية للأسئلة (1-10):

Find the domain and the range for each of the following functions:

1) 
$$f(x) = x + 1$$

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + 1$$

3) f (x) = 
$$\frac{x-1}{4}$$

5) f (x) = 
$$\sqrt{x-2}$$

7) f (x) = 
$$\frac{x}{x-1}$$

9) 
$$f(x) = (x-3)^2$$

2) 
$$f(x) = -x + 1$$

4) 
$$f(x) = \sqrt{x}$$

6) 
$$f(x) = \sqrt{x+4}$$

8) f (x) = 
$$\frac{x+1}{x-2}$$

$$10) f(x) = \frac{x}{\sqrt{x}}$$

ارسم الدوال التالية للأسئلة (11-21):

Graph the following functions:

11) 
$$f(x) = -\sqrt{x+2}$$

13) 
$$f(x) = \sqrt{4-x}$$

15) f (x) = 
$$\frac{1}{x^2}$$

17) 
$$f(x) = 2 - |x|$$

19) 
$$f(x) = \begin{cases} x, \\ 2-x, \\ 0 \end{cases}$$

12) 
$$f(x) = x^2 - 1$$

14) 
$$f(x) = \frac{1}{x}$$

16) 
$$f(x) = |x - 1|$$

18) f (x) = 
$$\frac{|x|}{x}$$

$$0 \le x \le 1$$
  
$$1 \le x \le 2$$
  
otherwise

20) 
$$f(x) = \begin{cases} -x, & x \le 0 \\ 0, & 0 \le x \le 2 \\ \sqrt{x-2}, & x \ge 0 \end{cases}$$

21) 
$$f(x) = \begin{cases} -x, & x \le 0 \\ x^2, & 0 \le x \le 1 \\ 1, & x \ge 1 \end{cases}$$

ارسم الدوال التربيعية التالية محدداً إحداثيات نقطة الرأس وفيما إذا كان القطع المكافئ للأعلى أو للأسفل للأسئلة (22–25):

Graph the following quadratic functions, and give coordinates of the vertex and state whether the parabola opens upward or downward:

22) 
$$f(x) = 2x^2 - 4x + 5$$

23) 
$$f(x) = 1 + 2x + x^2$$

24) 
$$f(x) = (1-x)^2 - 2$$

25) 
$$f(x) = (x + 1)^2 - 2(x - 1)^2$$

:(30-26) للأسئلة 
$$\frac{g}{f}$$
 ،  $\frac{f}{g}$  ، f.g ، f-g ، g-f ، f+g أوجد

26) f (x) = 
$$2x - 7$$
 and g (x) =  $\sqrt{x}$ 

27) 
$$f(x) = \frac{x}{x+2}$$
 and  $g(x) = x^2$ 

28) f (x) = 
$$\sqrt{x}$$
 and g (x) =  $\sqrt{1-x}$ 

29) 
$$f(x) = (x-1)^2$$
 and  $g(x) = x - 1$ 

30) f (x) = 
$$\frac{1}{x}$$
 and g (x) =  $\sqrt{x}$ 

أوجد fog و gof و fog للأسئلة (31-35):

31) 
$$f(x) = 2x - 7$$
 and  $g(x) = x + 1$ 

32) f (x) =  $\frac{x}{x+2}$ 

and

 $g(x) = x^{-1}$ 

33) f (x) =  $\sqrt{x}$ 

and

 $g(x) = \sqrt{1 - x}$ 

34)  $f(x) = (x-2)^2$ 

and

 $g(x) = \frac{1}{x}$ 

35)  $f(x) = x^2 + 2$ 

and

 $g(x) = \sqrt{x}$ 

أوجد (r) f1 للأسئلة (36-40):

36) f(x) = 2x + 5

37) f(x) = 2x - 7

38) f(x) = 7 - 2x

39) f (x) =  $\frac{x+1}{x-1}$ 

40) f (x) =  $\frac{x}{x+2}$ 

أكتب الأسئلة التطبيقية التالية بشكل دوال ثم أوجد الحل للأسئلة (41-43):

41) شركة كهرباء تصدر الفاتورة بمقدار 10 قروش للوحدة إذا كان عدد الوحدات المستهلكة أقلل أو تساوي 50 وحدة و 4 قروش لكل وحدة لما يزيد عن ذلك الاستهلاك. أكتب الدالة التي تبين قيمة الفاتورة للوحدات المستهلكة، ثم أوجد قيمة الفاتورة إذا كان الاستهلاك 60 وحدة مع الرسم.

Electricity is charged to consumers at the rate of  $10\phi$  for the first 50 units and  $\phi$  for amounts in excess of this. Find the function c (x) that gives the cost of using x units electricity, then find the cost for using 60 units with graph.

42) مكتب لتأجير السيارات يؤجر السيارة بعشرة دنانير في اليوم وعشرة قروش لكل كيلو متر تقطعها السيارة. أكتب مقدار الكلفة اليومية لأجر السيارة كدالة

من عدد الكيلومترات المقطوعة x، ثم ارسم الدالة وأوجد أجرة تأجير سيارة ليوم واحد وقطعت مسافة مقدار 100 كيلو متر.

A small company for canting cars charges 10 diner a day and 10 fils for each kilometer driving. Write the daily cost for renting a car as a function of number of kilometers x. Graph the function and find the cost for renting a car for one day driving 100 kilometers.

f(x) ليكن x عدد الوحدات المنتجة ولتكن f(x) دالة التكلفة الكلية المعتمدة على x أكتب الدالة f(x) والتي تمثل تكلفة ثابتة f(x) وتكلفة متغيرة الوحدة الواحدة f(x) عدد الوحدات المنتجة أقل من f(x) وحدة. وتمثل f(x) تكلفة ثابتة f(x) وتكلفة متغيرة الوحدة الواحدة f(x) إذا كان عدد الوحدات المنتجة f(x) عن f(x) وحدة. ثم أوجد تكلفة إنتاج f(x) وحدة وكذلك تكلفة إنتاج f(x) وحدة.

Let x be number of units produced and le f(x) be the function for the total cost. Write the function f(x) in term of a fixed cost of \$100 and a variable cost of \$5 for each unit produced if the number of units is less than 100 units. And f(x) in term of a fixed cost of \$200 and variable cost of \$4 for each unit produced if the number of units is at least 100 units. Graph the function and find the total cost for producing 50 units, and total cost for 150 units.

# الفصل السادس

# المصفوفات

- 1-6 مقدمة
- 2-6 المصفوفات
- 3-6 الجمع والطرح للمصفوفات
  - 4-6 ضرب المصفوفات
- 1-4-6 ضرب مصفوفة في ثابت
- 2-4-6 ضرب مصفوفية صفية في مصفوفة عمودية
  - 3-4-6 ضرب مصفوفتين
  - 5-6 المصفوفة الأحادية (المتماثلة)
  - 6-6 ضرب المصفوفة المرابعة في نفسها
    - 7-6 قوانين على المصفوفات
      - 8-6 المحددات
      - 9-6 المبدلة للمصفوفة
      - 10–6 معكوس المصفوفة
    - 1) استخدام الطريقة السريعة
    - 2) استخدام الطريقة المطولة
  - 11-6 حل المعادلات الخطية بأستخدام المصفوفات
- 11-1-6 حل المعادلات باستخدام طريقة معكوس المصفوفة
  - 12-1-6 حل المعادلات باستخبام طريقة كرامر
    - أسئلة الفصل السادس

## الفصل السادس المصفــوفـــات Matrices

#### 1-6 مقدمة Introduction:

سيتناول هذا الفصيل مفهوم المصفوفات Matrices Theory من بداية تعريفها Their Definitions إلى الرموز الخاصة بالمصيفوفات Matrices Theory of Matrices ومعكوس المصيفوفات Notation and Terminology of Matrices والمحددات Transpose ومعكوس المصيفوفة Transpose Add and ويتضيمن الفصل جميع العمليات الجبرية للمصفوفات من جمع وطرح Subtract ولنضرب في ثابت وضرب مصفوفتين Multiplications. وكذلك يتضمن الفصل حل أنظمة المعادلات الخطية بواسطة المصفوفات Subtract Use Matrices وسيتضيمن الفصيل العديد من الأمثلة و Solve Systems of Linear Equations و الأميثلة التطبيقية و Pamples وسيتضمن أيضاً في نهايته على العديد من الأسئلة Examples.

matrices الفصل من المباحث التالية: المبحث 6-2 المصفوفات Addition and subtraction of والمسبحث 6-3 الجمسع والطسرح للمصفوفات 6-4 الجمسع والطسرح المصفوفات multiplication of matrices والمبحث 6-4 ضسرب المصفوفات identity matrix (المتماثلة) والمبحث 5-6 المصفوفة في نفسها والمبحث 7-6 قوانين على المصفوفات Rules for ضسرب المصفوفة في نفسها والمبحث 7-6 قوانين على المصفوفات matrices والمسبحث 8-6 المسبدلة والمسبحث 6-8 المسبدلة والمسبحث 6-8 معكوس المصفوفة a matrix وأخيسراً المسبحث 10-6 حسل المعادلة الخطية باستخدام المصفوفات solving system of linear equations using matrices

#### 6-2 الصفوفات Matrices:

Three Types of لو فرضنا هناك مصنع firm لإنتاج ثلاثة أنواع من السلع firm لو فرضنا هناك مصنع Goods وهي  $g_3$ ,  $g_2$ ,  $g_1$  والتي تباع إلى اثنان من الشركات المستهلكة  $c_2$ ,  $c_1$  Customers وكانت المبيعات الشهرية مدرجة في جدول رقم (1) التالى:

		Goods		
		g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	<b>g</b> <sub>3</sub>
Customers	$C_1$	. 5	4	7
	$C_2$	6	8	10

جدول رقم (1) مبیعات ثلاث سلع لشرکتین

 $g_1$  وعدات من النوع الأول  $g_1$  إلى الشهر باع المصنع 5 وحدات من النوع الأول  $c_2$  المستهلك الثاني  $c_3$  المستهلك الثاني  $c_4$  وهكذا لقراءة بقية القيم.

عرض البيانات في هذا الشكل للجدول المرتب والذي يمثل شكل مستطيلي Rectangular Array وإذا تم إلغاء العناوين من الجدول سوف نحصل على مستطيل مرتب من الأرقام والذي يمثل المصفوفة Matrix بالشكل التالي:

وبصورة عامة، أي مستطيل من البيانات محاط بزوج من الأقواس يدعى مصفوفة Matrix. ومفردات الأرقام التي تكون هذا المستطيل تدعى بالعناصر Elements أو المفردات Entries. والمصفوفة تتألف من صفوف Rows وأعمدة .Columns

المصفوفة أعلاه تتكون من صفين Two Rows وثلاثة أعمدة على المصفوفة أعلاه تتكون من صفين Two Rows وبالتالي نقول بأن هذه المصفوفة من الدرجة Order × 2، ونعني بالدرجة order هنا حجم المصفوفة من عدد صفوفها وعدد أعمدتها. ويتضح مما سبق أنه يمكن تعريف المصفوفة كالآتى:

#### Matrix:

Is a rectangular array of numbers. The numbers are called elements, and the general form of matrix, say A, is:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

يتضح أن المصفوفة هي مستطيل من الأرقام الحقيقية المرتبة ومغلقة بأقواس كبيرة، وبصورة عامة المصفوفات تعرف بالحروف بالكبيرة مثل B ، A و C. كبيرة، وبصورة عامة المصفوفات تعرف Order بحاصل ضرب الصفوف في الأعمدة  $m \times n$  ويعرف درجتها Order بحاصل ضرب المجموعة بحرف مغير  $a_{ij}$  ورقمين ويعرب الأول i يمثل رقم الصف والثاني j يمثل رقم العمود.

والتالى أمثلة مختلفة للمضفوفات:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

ويتضح أن A تحتوي على ثلاث صفوف و عمودين وبالتالي فإن درجتها  $3 \times 2$  هي  $3 \times 2$  حيث أن عناصر الصف الأول Order B هي  $2 \times 3$  حيث أن عناصر الصف الأول Elements in First Column  $3 \times 4$  وعناصير العمود الأول Square Matrix وذلك لتساوي عدد الصفوف و عدد الأعمدة، هي مصفوفة مربعة Square Matrix وذلك لتساوي عدد الصفوف وعدد الأعمدة، أي أن درجتها and هو  $2 \times 2$  والمصفوفة  $2 \times 2$  والمصفوفة  $3 \times 4$  وخليد أما المصفوفة  $3 \times 4$  في عمود واحد وثلاثة صفوف وأن درجتها Adtrix هو  $3 \times 4$  أما المصفوفة  $3 \times 4$  فتتكون من قيمة واحدة. وأخيراً فإن المصفوفة  $3 \times 4$  مصفوفة صفية  $3 \times 4$  وذلك لكونها تحتوي على صف واحد وخمسة أعمدة.

وسنقوم الآن بالتعرف على بعض المصفوفات المعروفة بأسماء معينة وبأشكال محددة كالآتي:

المصفوفة التي يتساوى فيها Square Matrix: وهي المصفوفة التي يتساوى فيها عدد الصفوف وعدد الأعمدة ودرجتها  $n \times n$  أو  $m \times m$  مثلاً:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

ويمكن أن نقول أن A من الدرجة n ونكتب  $A_n$  للمصفوفة المربعة.

المصفوفة التي جميع عناصرها zero matrix وهي المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار zero، ويرمز لها عادة بالرمز 0 وتكتب بالشكل التالي:

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{or} \qquad 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

المصفوفات المتساوية equal matrices: وهي المصفوفات التي تحتوي على نفس العدد من الصفوف والأعمدة أو أن درجتيهما متساوية  $m_1 \times n_1 = m_2 \times n_2$ 

وأن كـل عنصـرين لهما نفس الموقع يكونان متساويين، مثلاً المصفوفتان B و C متساويتان equal matrices إذا كانتا كما يلي:

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 10 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 10 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

العناصر القطرية diagonal elements: وهي العناصر التي تظهر على القطر الرئيسي للمصفوفة والتي ظهرت في كتابة الشكل العام للمصفوفة. وهي العناصر المرية على نفس رقم الصف والعمود. مثلاً العناصر القطرية للمصفوفة التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

 $a_{33} = 9$  ,  $a_{22} = 5$  ,  $a_{11} = 1$  :  $a_{33} = 9$ 

المصفوفة القطرية diagonal matrix: هي المصفوفة المربعة square التي يكون جميع عناصرها أصفار zero باستثناء عناصر القطر الرئيسي elements ويمكن كتابة المصفوفة القطرية بالشكل التالى:

 $diag (a_{11} \qquad a_{22} \qquad \dots \qquad a_{nn})$ 

ومن أمثلة المصفوفات القطرية، المصفوفة B التالية:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ē

حيث أنها مصفوفة قطرية من الدرجة 3 × 3 والتي يمكن كتابتها بالشكل الآخر التالي:

### 6-3 الجمع والطرح للمصفوفات:

#### Addition and subtraction of matrices

يمكن إجراء عملية جمع عدة مصفوفات أو عملية طرح لمصفوفتين إذا كان B,A لهما نفس الحجم أو الدرجة the same size or order إذا كانت المصفوفتان A+B من نفس الدرجة، ولتكن a+B فإن مجموعهما a+B ونطلق عليه اسم a+B سيكون من الدرجة a+B والعناصر نحصل عليها من جمع العناصر المتناظرة في المصفوفتين.

If A and B are both of the same size or order. Then, the sum A + B is the matrix obtained by adding the elements of B to the corresponding elements of A. Similarly, we can obtain A-B

وسيتم توضيح هذه العملية الواضحة من خلال المثال التالي:

مثال 1

Let 
$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 10 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$
,  $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ , and

 المصفوفة A و B و كذلك طرحهما أما أي عملية جمع أو طرح B منهما مع المصفوفة C فلا يمكن ذلك. وبالتألي فإن النتائج ستكون كما يلي:

$$A + B = \begin{bmatrix} 4+3 & 3+2 & 5+4 \\ 10+4 \cdot 7+3 & 6+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 9 \\ 14 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$

$$B + A \begin{bmatrix} 3+4 & 2+3 & 4+5 \\ 4+10 & 3+7 & 2+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 9 \\ 14 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$

A + B = B + A ويلاحظ هنا أن

أما عن طرح المصفوفات فلدينا:

$$A - B = \begin{bmatrix} 4-3 & 3-2 & 5-4 \\ 10-4 & 7-3 & 6-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B - A \begin{bmatrix} 3-4 & 2-3 & 4-5 \\ 4-10 & 3-7 & 2-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -6 & -4 & -4 \end{bmatrix}$$

A - B = -(B - A) وبالتالي فإن

## •Multiplication of matrices ضرب المصفوفات

لتوضيح عملية الضرب سنبدأ بتوضيح عملية ضرب مصفوفة في ثابت ثم ضرب مصفوفة صفية في مصفوفة عمودية ثم ضرب مصفوفة كالآتى:

## Scalar multiplication ضرب مصفوفة في ثابت 6-4-1

ويعني ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة، ولتكن A، في الثابت الحقيقي، وليكن C، لنحصل على الناتج بالشكل C ويمثل مصفوفة من نفس درجة المصفوفة C، أما عناصر C فناتجة عن ضرب كل عنصر من عناصر المصفوفة C بالثابت C.

If A is any matrix and C is any constant (scalar). Then, the product cA is the matrix obtained by multiplying each element of A by c.

والمثال التالي يوضح ذلك:

مثال 2

Let B = 
$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$$
, and c = 5, d =  $\frac{1}{5}$ 

Find, if possible cB and dB

## واضح أن ناتج الضربين cB و dB كالآتي:

$$cB = 5 \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 15 \\ 10 & 25 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dB = \begin{array}{c|cccc} & 1 & & 4 & 3 \\ & 5 & & 2 & 5 \\ & 1 & 0 & & \end{array} = \begin{array}{c|ccccc} 4/5 & 3/5 \\ & 2/5 & 5/5 \\ & 1/5 & 0/5 \end{array}$$

ويتضـح مـن أعلاه أن عملية الضرب أو عملية القسمة لمصفوفة مع ثابت scalar يتم بتغيير جميع عناصر المصفوفة بالضرب أو القسمة على ذلك الثابت.

## 4-2-6 ضرب مصفوفية صفية في مصفوفة عمودية:

#### Multiplication of a row by a column

افترض أن هناك مصنع ينتج أربعة أنواع من السلع وكل سلعة تحتاج إلى عدد من الوحدات الأولية وكما معرف في المصفوفة الصفية A row matrix التالية:

$$A = \begin{bmatrix} D & R & N & Q \\ 6 & 5 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

وهذا يعني أن البضاعة D تحتاج إلى 6 وحدات والبضاعة R تحتاج إلى 5 وحدات والبضاعة R تحتاج إلى 10 وحدات والبضاعة Q فتحتاج إلى 10 وحدات أما البضاعة Q فتحتاج إلى 10 وحدات. وإذا كان كل وحدة من هذه الوحدات المختلفة لهذه السلع هي كما موضح في المصفوفة العمودية Column matrix وهي:

فان كلفة كل وحدة من وحدات D هو 7 وكلفة كل وحدة من وحدات R هو 8 وكلفة كل وحدة من وحدات Q فهو 3. فلإيجاد كلفة تصنيع هذه السلع الأربعة للمصنع سيكون:

$$= (6) (7) + (5) (8) + (4) (5) + (10) (3)$$

$$= 42 + 40 + 20 + 30$$

$$= 132$$

وبالإشارة إلى الأرقام السابقة فقد قمنا بضرب الرقم الأول من المصفوفة B والرقم الثاني من A بالرقم الثاني من B والرقم الثالث من A بالرقم الثالث من A بالرقم الثالث من A بالرقم الثالث من A بالرقم الأربعة لنحصل على قيمة واحدة هي 132.

وهـذه الطريقة لصيغة الضرب يمكن تطبيقها لضرب أي صف row بعمود column وهذه الطريقة من الضرب يمكن تلخيصها كالآتي:

إذا كان لدينا الصف i من الدرجة p × 1 بالشكل التالى:

 $\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \end{bmatrix}$ 

ولدينا العمود j من الدرجة  $p \times 1$  بالشكل التالى:

 $\begin{array}{c} b_{ij} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pi} \end{array}$ 

فإن حاصل الضرب هو قيمة واحدة one value نحصل عليها كالآتي:

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{ij} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pi} \end{bmatrix} = a_{i1} b_{ij} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{ip} b_{pj}$$

مثال 3

إذا كانت لدينا المصفوفات التالى:

Given the following matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$
, and  $D = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$ 

#### Find AB and CD

لإيجاد حاصل الضرب AB لدينا:

AB = 
$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$
  $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$  = (3) (2) + (0) (6) + (4) (5) = 6 + 0 + 20 = 26

و لإيجاد حاصل الضرب CD لدينا:

CD = 
$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$
  $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$  =  $(10)(2) + (7)(5) + (8)(3) + (4)(6)$  =  $20 + 35 + 24 + 24 = 103$ 

ويجدر بنا هنا ذكر الملاحظات المهمة التالية والتي يجب مراعاتها عند ضرب المصفوفات وهي:

- 1) يجب أن نضع مصفوفة الصف أولاً على جهة اليسار Left ومصفوفة العمود على جهة اليمين Right كما في المثال السابق.
- 2) يجب أن تكون عدد المفردات أو العناصر number of elements في مصفوفة العمود كما في مصفوفة العمود كما في المثال السابق، ولهذا لا يمكن ضرب AD أو CB لكونها غير معرفة not defined.

### :Multiplication of two matrices ضرب مصفوفتين 4-6-3

يمكن توسيع طريقة الضرب السابق ذكرها لتشمل ضرب المصفوفات التي تحتوي على أكثر من صف rows أو أكثر من عمود columns بالاعتماد على طريقة ضرب الصف في العمود لتتكرر إلى ضرب صفوف المصفوفة الأولى بأعمدة المصفوفة الثانية.

وبصورة عامة in general المصفوفة C الناتجة عن ضرب المصفوفة C المص

وبالتالي يمكن تلخيص عملية ضرب المصفوفتين A و B كالآتي:

 $p \times n$  والمصفوفة B من الدرجة  $p \times n$  والمصفوفة D من الدرجة  $m \times n$  وتحدد  $m \times n$  الضرب  $m \times n$  وتحدد  $m \times n$  الضرب  $m \times n$  وليكن المصفوفة  $m \times n$  هو من الدرجة  $m \times n$  وتحدد  $m \times n$  العنصر في الصف  $m \times n$  والعمود  $m \times n$  المصفوفة  $m \times n$  عملية ضرب الصف  $m \times n$  المصفوفة  $m \times n$  بالعمود  $m \times n$  المصفوفة  $m \times n$ 

If A is an  $m \times n$  matrix and B is an  $p \times n$  matrix. Then, the product AB is the  $m \times n$  matrix whose elements are defined as follows: To find the element in row i and column j of AB, single out row i from A and column j from B and multiply them using inner product.

وسيتم فيما يلي توضيح عملية الضرب عن طريق الأمثلة التالية:

مثال 4

اضر ب المصفوفات التالية:


Find the product AB and BA, if possible

where 
$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$
 and  $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 

يجب علينا أو لا التحقق من شرط مساواة عدد الأعمدة columns في المصفوفة A مع عدد الصفوف rows في المصفوفة B.

وهنا قد تحقق الشرط، حيث أن عدد الأعمدة في A هو 3 وعدد الصفوف في المصفوفة B هو 3 أيضاً ولهذا نستطيع إيجاد AB.

أما عن عملية الضرب فلدينا:



$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

وهنا نلاحظ أن ضرب الصف الأول في العمودين يعطينا الصف الأول للمصفوفة الجديدة، وضرب الصف الثاني في العمودين يعطينا الصف الثاني للمصفوفة الجديدة وكما يلى:

AB = 
$$(4)(1)+(3)(0)+(2)(4) (4)(-1)+(3)(2)+(3)(2)$$

$$(5)(1)+(6)(0)+(0)(4) (5)(1)+(6)(2)+(0)(3)$$

2×2

$$AB_{2\times 2} = \begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

عدد الصفوف في المصفوفة الجديدة يساوي عدد الصفوف في المصفوفة A وعدد الأعمدة في المصفوفة B. أما عن الضرب BA فلدينا:

أبعاد المصفوفة الجديدة BA<sub>3×3</sub>

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1- \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$BA_{3\times3} = \begin{pmatrix} (1)(4)+(-1)(5) & (1)(3)+(-1)(6) & (1)(2)+(-1)(0) \\ (0)(4)+(2)(5) & (0)(3)+(2)(6) & (0)(2)+(2)(0) \\ (4)(4)+(3)(5) & (4)(3)+(3)(6) & (4)(2)+(3)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -3 & -2 \\ 10 & 12 & 0 \\ 31 & 30 & 8 \end{bmatrix}$$

ولهذا من خلال المثال (4) أعلاه نجد إن المصفوفة الناتجة من ضرب المصفوفة A في B أي B لا تساوي المصفوفة الناتجة من ضرب B في B والتي هي BA، وكما تلاحظ أن أبعاد المصفوفة AB هو  $2 \times 2$  أما أبعاد BA فهو  $3 \times 3$ .

والملاحظة الثانية نلاحظ أن الصف للمصفوفة الأولى يكون ثابت أي نضرب جميع أعمدة المصفوفة B في صف واحد من A وهكذا لكل صف، ويمكن ملاحظة يكون كل عمود ثابت على مستوى العمود فالعمود الأول يضرب بجميع صفوف المصفوفة الأولىي ومنه يكون عمود المصفوفة الجديدة، فالعمود الأول ينتج منه العمود الأول للمصفوفة الجديدة والعمود الثاني للمصفوفة B ينتج منه العمود الثاني للمصفوفة الجديدة وهكذا.

#### مثال 5

اضرب المصفوفات التالية C و D، أي إيجاد CD و DC إذا كان كلاً منهما كما يلي:

Find the product of the matrices C and D, or find CD and DC if C and D as:

$$C_{1\times3} = \begin{bmatrix} & 3 & 0 & -1 & \end{bmatrix} \quad D_{-3\times1} = \begin{bmatrix} & 5 & \\ & 3 & \\ & 2 & \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} C_{1\times3} D_{3\times1} = \text{we can} \\ \text{product} \\ \text{them (3=3)} \end{array}$$

CD = 
$$(5)(3) + (0)(3) + (-1)(2)$$
 = 16

أما لإيجاد حاصل الضرب CD فلدينا:

$$D_{3\times1}C_{1\times2} = \begin{bmatrix} 5\\3\\2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 3&0&-1\\-\\ \end{bmatrix}$$

$$DC_{3\times3} = \begin{bmatrix} (5)(3) & (5)(0) & (5)(-1) \\ (3)(3) & (3)(0) & (3)(-1) \\ (2)(3) & (2)(0) & (2)(-1) \end{bmatrix}$$

$$DC = \begin{bmatrix} 19 & 0 & -5 \\ 9 & 0 & -3 \\ 6 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

ويمكن ملاحظة كيف يؤثر العمود من المصفوفة الثانية C في المصفوفة الجديدة DC فيإذا كان العمود يحتوي على zero فيكون جميع قيم العمود الجديد تساوي zero. وأيضاً نلاحظ عندما يكون هناك عمود إشارته سالبة فيكون العمود الجديد جميع قيمه سالبة. ويمكن أيضاً أن نلاحظ أن ضرب صف في عمود يكون العناتج قيمة واحدة ويكون هناك ثلاث أعمدة وثلاث صفوف وإذا غيرنا ترتيب ضرب المصفوفات كما في DC حيث تم احتساب مفردات العمود على أنها صفوف ومفردات الصفوفة DC في أبعادها 3 × 3.

#### مثال 7

اضرب المصفوفات التالية إذا أمكن C, B, A اضرب المصفوفات التالية إذا أمكن Find the product of the following matrices A, B, C, if possible.

$$A_{2\times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} B_{2\times 3} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 5 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} C_{3\times 3} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

لا يمكن ضرب المصفوفات التالية وذلك:

It is impossible to multiply the matrices:

## -6 الصفوفة الأحادية (المتماثلة) Identity Matrix:

تدعى المصفوفة المربعة square matrix مصفوفة أحادية أو متماثلة إذا كان جميع عناصرها على القطر diagonal يساوي واحد وجميع العناصر elements خارج القطر تساوي صفراً zero. والمصفوفات التالية تمثل مصفوفات أحادية متماثلة identity matrices للأحجام 2 × 2 و 3 × 3، وكما يلي:

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 \\
 0 & 1
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

وتعرف المصفوفة الأحادية المتماثلة بالحرف I عندما يكون حجمها أو ترتيبها معروف بدون غموض.

**مثال** 7

افرض لديك المصفوفة A كما يلى:

$$A = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$$

أوجد حاصل ضرب AI و AI، حيث أن I تمثل مصفوفة متماثلة أحادية. Find AI and IA, where I denotes the identity matrix

يمكن ضرب كلاً من AI و AI إذا كان كلاً من A و I مصفوفات مربعة square matrices لنفس الحجم أو الدرجة. وبما أن A مصفوفة A المصفوفة A المصفوفة المتماثلة الأحادية identity matrix يجب أن يكون حجمها A و لذلك:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AI = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c(1) + d(0) & c(0) + d(1) \\ a(1) + b(0) & a(0) + b(1) \end{bmatrix}$$

ونفس الشيء Similarly:

$$IA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix} = A$$

و لذلك: AI = IA = A

وتستطيع الملاحظة من هذا المثال هو عند ضرب أي مصفوفة في مصفوفة أحادية لا يحدث تغيير على المصفوفة الأصلية مهما كان حجمها. أو نستطيع القول

هو أن المصفوفة الأحادية I identity matrix I تسلك سلوك رقم 1 عند ضربها في أي مصفوفة ذات أرقام حقيقية real numbers. وهذا هو التبرير نسميه المصفوفة الأحادية identity matrix و لأي حجم من الأحجام. وكذلك إذا كانت A مصفوفة مصربعة square matrix لأي حجم من الأحجام يمكن أن تكون العلاقة التالية حقيقة بدون أي لبس أو غموض A = IA = A

# $(A.A = A^2)$ في نفسها (Square matrix ضرب المصفوفة المربعة ا

وكذلك نستطيع تعميم ضرب المصفوفة المربعة square matrix A في نفسها و التي حجمها  $n \times n$  و سوف تكون نتيجة الضرب  $n \times n$ 

وكذلك ضربها في نفسها مرة أخرى يعطينا ما يلي:

 $A.A.A = A^3$ 

ونستطيع الاستمرار على هذه الطريقة إلى أي عدد من مرات ضرب المصفوفة فكل مرة سوف تزداد القوى The power واحد.

## Rules for matrices قوانين على المصفوفات

سنعرض في هذا المبحث بعض القوانين أو النظريات (بدون براهين) والتي يمكن الاستفادة منها لحل الأمثلة والأسئلة الخاصة بالمصفوفات كالآتى:

1) 
$$A + B = B + A$$

2) 
$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$3) A (BC) = (AB) C$$

4) 
$$A (B + C) = AB + AC$$

$$5) (B + C) A = BA + CA$$

$$6) A (B - C) = AB - AC$$

$$7) (B - C) A = BA - CA$$

8) 
$$a (B + C) = aB + aC$$

9) 
$$a (B - C) = aB - aC$$

10) 
$$(a + b) C = aC + bC$$

(Commutative law for addition)

(Associative law for addition)

(Associative law for multiplication)

(Left distributive law)

(Right distributive Law)

11) 
$$(a - b) C = aC - bC$$

12) 
$$a(bC) = abC$$

13) 
$$a (BC) = (aB) C = B (aC)$$

14) 
$$A + 0 = 0 + A = A$$

15) 
$$A - A = 0$$

16) 
$$0 - A = -A$$

17) 
$$A0 = 0$$
 ,  $0A = 0$ 

18) 
$$AI = A$$
 ,  $IA = A$ 

#### 8-6 الحددات Determinants

تعتبر المحددات من الخصائص المهمة في دراسة المصفوفات وفكرة المحددات للمصفوفات المربعة square matrix ستعرض كما يلى:

An important attribute in studying matrix algebra is the concept of determinant for a square matrix.

يرمز إلى المحددة بخطين مستقيمين مثل محدد A هو |A| أو يمكن أن تمزج فقط في أول ثلاث حروف الصغيرة (A) . (A) وأيضاً يعطى للمصفوفة ترتيب مثلاً المصفوفة A.

$$A = \begin{bmatrix} + & - \\ a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

نرمز للمحددة لهذه المصفوفة A أو (A) أو det (A) أو يمكن أن تكتب بشكل كامل

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$
، ودرجتها order هو

ويمكن إيجاد المحددة لهذه المصفوفة كما يلي:

$$\det (A) = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{22}$$

وبصورة عامة لإيجاد المحددة للمصفوفة الرباعية 2 × 2 فهو حاصل ضرب ضاصر القطر الرئيسي main diagonal مطروحاً منه حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي cross-diagonal كما تلاحظ من المثال التالي:

مثال 8

أوجد المحددات للمصفوفات التالية A و B.

Find the determinants for the matrices A and B, where

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$$

$$det (B) = 5 \times 2 - (-1 \times 6) = 10 + 6 = 16$$

أما إذا كانت المصفوفة المربعة square matrix ودرجتها 3 × 3. فإن حساب المحددة لها يتم بعدة طرق. وأحد هذه الطرق هو إضافة العمودين الأول والثاني إلى المصفوفة ومن ثم نبدأ بضرب عناصر القطر الرئيسي وكذلك ضرب عناصر القطر الوطرح منهما حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي الأخرى اللذان بعده ونجمعها ونطرح منهما حاصل ضرب مفردات القطر الثانوي cross-diagonal والأقطار الثانوية الأخرى التي قبلها وكما في المثال التالي:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$det (A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$(1) (2) (3)$$

$$\det (A) = (a_{11} \times a_{22} \times a_{33} + a_{12} \times a_{23} \times a_{31} + a_{12} \times a_{21} \times a_{33})$$
$$- (a_{12} \times a_{21} \times a_{33} + a_{11} \times a_{23} \times a_{31} + a_{13} \times a_{22} \times a_{31})$$

مثال و

أوجد المحددات للمصفو فات التالية:

Find the following determinants:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

$$B = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\det (A) = (28 + 0 + 36) - (40 + 30 + 0) = -6$$

$$0 \qquad 0 \qquad -18$$

$$(1) \qquad (2) \qquad (3)$$

$$48 \qquad 10 \qquad 0$$

$$\det(\mathbf{B}) = (48 + 10 + 0) - (0 + 0 - 18) = 76$$

## و-6 البدلة للمصفوفة Transpose of a matrix البدلة المصفوفة

المبدلة للمصفوفة A هو تغيير صفوف المصفوفة A إلى أعمدة وتغيير أعمدتها إلى  $A^T$  أو تقرأ A (وتقرأ A برايم).

 $A_{ij} \Rightarrow A^{T}_{ji}$  and is obtained by interchanging the rows and columns of A.

مثال 10 أ

أوجد المبدلة للمصفوفات التالية:

Find the transpose for:

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} & a_{11} & a_{12} \\ & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \ , \ A^T{}_{ji} = \begin{bmatrix} & a_{11} & a_{21} \\ & a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$B_{ij} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & -10 \end{bmatrix}, \quad B_{ji}^{T} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 6 \\ -1 & 3 & 7 \\ 0 & 4 & -10 \end{bmatrix}$$

ويالحظ أن إيجاد المبدلة هو تبديل الصفوف إلى أعمدة وتبديل الأعمدة إلى صفوف، ومن أهم خصائص مبدلة المصفوفة هو Properties for transpose:

- $1) (A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$
- 2)  $(A + B)^{T} = A^{T} + B^{T}$
- $3) (AB)^{T} = B^{T} A^{T}$

وبالـرجوع لتعريف المبدلة يمكن تعريف المصفوفة المتماثلة matrix

إذا كانت المصفوفة المربعة A من الدرجة  $n \times n$  وكانت  $A = A^T$  فإن المصفوفة A تسمى مصفوفة متماثلة.

6

Let A be a square matrix of order  $n \times n$ . Then, if  $A = A^T$ , A is called a symmetric matrix.

for example  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ , and since  $A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  then A is a symmetric matrix.

 $AA^T$  فإن  $m \times n$  فإن  $A^T$  فإن  $A^T$  فإن  $A^T$  فإن  $A^T$  هما مصفوفات متماثلة.

If A is any matrix of order  $m \times n$ . Then,  $AA^T$  is a symmetric matrix, and so is  $A^TA$ .

والمثال التالي يوضح ذلك:

مثال 11

Let 
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$
 Find  $AA^{T}$  and  $A^{T}A$ 

و لإيجاد النواتج لدينا:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ and } A^{T} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 4}$$

$$AA^{T} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 14 & 3 & 8 \\ 14 & 20 & 4 & 12 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 8 & 12 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

ويلاحظ بأن الناتج يمثل مصفوفة متماثلة.

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 15 & 30 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

وكذلك فإن الناتج هو مصفوفة متماثلة.

ويتبين من المثال (11) أن استخدام المبدلة طريقة جيدة ومفيدة لكثير من التطبيقات لتحويل المصفوفات الغير متماثلة إلى أن تكون مصفوفات متماثلة.

### وا ـ 6 معكوس المصفوفة Inverse of a matrix:

إذا كانت A مصفوفة مربعة من الدرجة n وكان بالإمكان إيجاد مصفوفة مربعة أخرى، ولتكن B، من نفس الدرجة بحيث أن  $AB = BA = I_n$  يقال عندئذ أن المصفوفة A قابلة للانعكاس. وتسمى B معكوس المصفوفة A. ويرمز لمعكوس المصفوفة A عادة بالرمز  $A^{-1}$ .

If A is a square matrix of order n. And if we can find a square matrix of order n, say B, such that  $AB = BA = I_n$  then we say that A is invertable and B is the inverse of A. The inverse of a matrix A is denoted by  $A^{-1}$ .

ويلاحظ مما سبق ما يلى:

1) يعرف المعكوس فقط للمصفوفات المربعة

Inverse matrices are defined for square matrices only.

A معكوس للمصفوفة B فإن B معكوس للمصفوفة A إذا كان A معكوس للمصفوفة B أيضاً معكوس المصفوفة A إذا كان A معكوس المصفوفة B أيضاً

3) إذا كان للمصفوفة A معكوس عندئذ يقال بأن A قابلة للانعكاس.

If A has an inverse then we say that A is invertable.

4) إذا كان للمصفوفة A معكوس فهناك معكوس و احد فقط.

If A has an inverse then it is unique.

5) ليست جميع المصفوفات المربعة لها قابلية الانعكاس.

Not all square matrices are invertable.

ويمكن على ضوء الخصائص والملاحظات أعلاه إعطاء فكرة عن وجود معكوس لمصفوفة معينة أم لا والمثال التالى يوضح ذلك.

#### مثال 12

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$
 هل أن  $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  معكوس للمصفوفة

للإجابة على هذا التساؤل علينا إيجاد حاصل الضرب AB وكذلك حاصل الضرب BA وكذلك حاصل الضرب BA وإن كان كلاهما مساوياً إلى المصفوفة  $I_2$  عندئذ A هو معكوس  $I_3$  وكذلك B هو معكوس A.

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = I_2$$

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = I_2$$

وبالتالي فإن B هو معكوس A وكذلك فإن A هو معكوس B. معكوس المصفوفة المربعة A، والذي يرمز له بالرمز  $A^{-1}$ ، يمكن إيجاده بعدة طرق وأحد أهم هذه الطرق والتي سيتم ذكرها هنا هي:

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{\det(A)}$$

وتمثل قسمة ما يسمى بالمصفوفة المرافقة Adjoint matrix، والتي يرمز لها بالرمـز (A) والتي يرمز لها A والذي يرمز له (A) والذي يرمز له (A) والرمـز (A) والذي يرمز له (A). ويجـب الإشارة إلى أنه يوجد للمصفوفة معكوس إذا لم تكن المحددة صفراً، ويعنى ذلك أن A موجود إذا كان A

adj(A) أو |A| تم تعريفه سابقاً أما |A| فو |A| تم تعريفه سابقاً أما |A| فيجب علينا توضيح هذه المصفوفة قبل الدخول في إيجاد المعكوس كالآتي: |A| لمصفوفة |A| من الدرجة |A| فإن هناك طريقتان هما:

## 1) استخدام الطريقة السريعة وكما يلى:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad adj(A) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

ويتضح من ذلك أن هذه الطريقة تعتمد على تغيير مواقع عناصر القطر الرئيسي main diagonal وتغيير إشارات عناصر القطر الثانوي Cross diagonal، ويلاحظ هنا بأن هذه الطريقة مناسبة لمصفوفة من الدرجة 2×2 فقط.

#### مثال 13

أوجد معكوس المصفوفات التالية:

Find the inverse matrices for:

a) 
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

سنقوم بحل هذا المثال باستخدام الطريقة السريعة وإيجاد (Aj(A كالآتي:

$$adj(A) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

أما عن (det(A فلدينا:

$$\det(A) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

وبالتالي فإن المعكوس  $A^{-1}$  يمكن إيجاده ليكون:

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{\det(A)} = \frac{1}{[a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}]} \begin{bmatrix} a_{22} - a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

b) 
$$B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

وباستخدام الطريقة السريعة السابق ذكر ها لدينا:

$$adj(B) = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = (4)(8) - (3)(10) = 32 - 30 = 2$$

وبالتالي فإن B-1 هو:

$$B^{-1} = \frac{adj(B)}{\det(B)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3/2 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

2) استخدام الطريقة المطولة وكما يلى:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} = adj(A)$$
  $adj(A) = \begin{bmatrix} (i+j)^{-1} & A_{ij} \end{bmatrix}^{T}$ 

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = +a_{22}$$

تكون الإشارة موجبة لكون مجموع (i+j) زوجي أما إذا كان فردي فسوف تكون سالبة وكما في A<sub>12</sub>.

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -a_{12}$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = +a_{11}$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} +a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}^{T}$$

الآن نرجع المبدلة إلى المصفوفة لتكون المصفوفة المرافقة وكما يلي:

$$adj(A) = \begin{bmatrix} a_{22} - a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}$$

 $\det(A) = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$ 

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \begin{bmatrix} a_{22} - a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}$$

#### مثال 14

أوجد معكوس المصفوفة التالية:

Find the inverse matrices for:

a) B = 
$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

ولقد تم إيجاد معكوس هذه المصفوفة باتباع الطريقة السريعة وكما لاحظنا ذلك في المثال (13) السابق.

أما الآن فسنقوم بإيجاد معكوس هذه المصفوفة مرة ثانية وباتباع الطريقة المطولة وكما يلي:

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 8 \end{bmatrix} \qquad B^{-1} = \frac{1}{def(B)} [adj(B)]$$

$$\det(B) = (4)(8) - (10)(3) = 2$$

$$adj(B) = ((i+j)^{-1} Bij)^{T}$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ & 10 & 8 \end{vmatrix} = +4$$

$$adj(B) = \begin{bmatrix} 8 & -10 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}^{T} = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{2} & \frac{-3}{2} \\ \frac{-10}{2} & \frac{4}{2} \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \left[ \begin{array}{cc} 4 & \frac{-3}{2} \\ -5 & 2 \end{array} \right]$$

d) 
$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$
  $C^{-1} = \frac{1}{\det(C)} adj(C)$ 

$$det (C) = (0 + 0 + 0) - (0 + 12 - 2) = -10$$

$$adj (C) = [(-1)^{i+j} C_{ij}]^{-1}$$

$$C_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = +(-6) = -6$$

$$C_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -(-2) = 2$$

$$C_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = +(-2) = -2$$

$$C_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 = -2$$

$$C_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = +4 = 4$$

$$C_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 = -4$$

$$C_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = +3 = 3$$

$$C_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -6 = -6$$

$$C_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = +(+1) = 1$$

$$adj(C) = \begin{bmatrix} -6 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 3 & -6 & 1 \end{bmatrix}^{T} = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{-10} \begin{bmatrix} -6 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

c) 
$$D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$
  $D^{-1} = \frac{1}{\det(D)} adjD$ 

$$det(D) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ (1) & (2) & (3) & 24 & 3 & 32 \end{pmatrix}$$

 $\det(D) = (24 + 3 + 32) - (12 + 4 + 48) = -5$ 

$$adj(D) = [(-1)^{i+j} D_{ij}]^t$$

$$D_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = +10 \qquad D_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -15$$

$$D_{13} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5$$
  $D_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -4$ 

$$D_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = +4 \qquad D_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$D_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -9 \qquad D_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = +14$$

$$D_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(-6) = +6$$

$$adj(D) = \begin{bmatrix} 10 & -15 & -5 \\ -4 & 4 & -1 \\ -9 & 14 & 6 \end{bmatrix}^{T} = \begin{bmatrix} 10 & -4 & -9 \\ -15 & 4 & 14 \\ -5 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$


$$A^{-1} = \frac{1}{-5}$$
 
$$\begin{vmatrix} 10 & -4 & -9 \\ -15 & 4 & 14 \\ -5 & -1 & 6 \end{vmatrix}$$

d) 
$$E = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 9 & -4 \end{bmatrix}$$
  $E^{-1} = \frac{adj(E)}{\det(E)}$ 

$$\det(E) = (-3)(-6) - (9)(2) = +18 - 18 = 0$$

لا يمكن إيجاد المعكوسة للمصفوفة E وذلك لكون المحددة لهذه المصفوفة تساوى صفر.

e) 
$$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & 6 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$
  $F^{-1} = \frac{adj(F)}{\det(F)}$ 



$$\det(F) = (12 + 36 + 12) - (36 + 12 + 24) = 0$$

لا يمكن إيجاد المعكوس لهذه المصفوفة لكون محددتها تساوي صفراً.

وفي نهاية هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى أن من أهم خصائص معكوس المصفوفة هو:

- 1)  $(A^{-1})^{-1} = A$
- 2)  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

#### 11-6 حل العادلات الخطية باستخدام المصفوفات:

Solving system of linear equations using matrices

يجب الإشارة في بداية هذا المبحث وقبل الحديث عن حل نظام المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات هو الحديث عن تحويل الأنظمة من المعادلات الخطية من الشكل العام المتعارف عليه إلى أن تكون بشكل يستخدم المصفوفات كالآتى:

افرض أن لدينا m من المعادلات الخطية m افرض أن لدينا m ولدينا n من المعادلات الخطية variables ولدينا n من المتغيرات System of linear equations كالآتى:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots \ a_{1n}x_n = b_1$$
  
 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots \ a_{2n}x_n = b_2$ 

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots \ a_{mn}x_n = b_m$$

والذي من الممكن كتابته بالصيغة التالية can be written in the form:

AX = b

حيث أن:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1}, \quad and \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{m \times 1}$$

ويلاحظ هنا أن المصفوفة A تسمى مصفوفة المعاملات coefficient matrix ويلاحظ هنا أن المصفوفة الشرابت و X تسمى مصفوفة المتغيرات variable matrix أما d فتسمى مصفوفة الثوابت constant matrix.

وإذا كان عدد المعادلات n مساوياً لعدد المتغيرات (المجاهيل) n فيوجد هناك حل للنظام، والذي يمكن إيجاده بعدة طرق لحل المعادلات باستخدام المصفوفات سوف نتناول في هذا المبحث طريقتين فقط.

If # (equations) = # (variables) then the system has a solution that can be found using many methods to solve the system of equations using matrices, and we will consider just two of them.

- 1) حل المعادلات باستخدام طريقة معكوس المصفوفة والتي سيتم تناولها في الفقرة 1-11-6 القادمة.
- 2) حـل المعـادلات باسـتخدام طريقة كرامر والتي سيتم تناولها في الفقرة 1-2 القادمة.

المعادلات باستخدام طريقة معكوس المصفوفة: 6-11-1 Solving system of linear equations using the inverse

إذا كـان ِ AX = b نظاماً للمعادلات الخطية المكون من n من المعادلات و n من المتغير ات، بحيث أن  $0 \neq |A|$  فإن للنظام حل وحيد و هو:

$$X = A^{-1}b$$

If AX = b is a system of linear equations for n equations and n variables, such that  $|A| \neq 0$ . Then, there is a unique solution for this system, which is:

$$X = A^{-1} b$$

مثال 15

حل المعادلات التالية باستخدام طريقة معكوس المصفوفة:

Solve the following systems of equations using the inverse method:

a) 
$$2X + 8Y = -4$$

$$X + 3Y = 5$$

علينا أو لا كتابة النظام أعلاه بطريقة المصفوفات بالشكل AX = b كالآتى:

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (2)(3) - (1)(8) = -2$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -8 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} adj(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-3}{2} & 4 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} b = \begin{bmatrix} \frac{-3}{2} & 4 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 \\ -7 \end{bmatrix}$$

y = -7 ، x = 26 وبذلك فإن

b) 
$$2X_1 + 4X_2 + X_3 = 77$$

$$4X_1 + 3X_2 + 7X_3 = 114$$

$$2X_1 + X_2 + 3X_3 = 48$$

وبتحويل النظام إلى الشكل AX = b لدينا:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 \\ 114 \\ 48 \end{bmatrix}$$

وبالتالي فإن:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

وباتباع الخطوات السابقة لإيجاد A-1 فإن:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & -11/10 & 5/2 \\ 1/5 & 2/5 & -1 \\ -1/5 & 3/5 & -1 \end{bmatrix}$$

وأخيراً فإن:

$$X = A^{-1} b$$

$$= \begin{bmatrix} 1/5 & -11/10 & 5/2 \\ 1/5 & 2/5 & -1 \\ -1/5 & 3/5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 77 \\ 114 \\ 48 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 5 \end{bmatrix}$$

 $\mathbf{x}_3=5$  وهذا يعني أن:  $\mathbf{x}_1=10$  ،  $\mathbf{x}_1=10$ 

#### 2-11-6 حل المعادلات باستخدام طريقة كرامر:

Solving system of linear equations using Cramer's Rule:

n نظاماً للمعادلات الخطية المكون من n من المعادلات و n من المتغير ات، بحيث أن  $0 \neq |A|$  فإن للنظام حل وحيد هو:

i محددة المصفوفة الناتجة من إبدال عناصر العمود b للمصفوفة A بعناصر العمود b.

If AX = b is a system of linear equations of n equations and n variables, such that  $|A| \neq 0$ . Then, the system has a unique solution, which is:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad , \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

where  $det(A_i)$  is the determinant of a matrix obtained by interchanging column i by the column b.

والحل بطريقة كرامر Cramer's يتطلب إيجاد محددات لمصفوفة معاملات المتغيرات عددها بقدر عدد المتغيرات زائد واحد. تكون المحددة الأولى هي التي تعتمد على معاملات المتغيرات جميعها أما المحددات الأخرى فمحددة كل متغير يتم باستبدال معاملات ذلك المتغير بالثوابت للمعادلات.

وفي حالة كون قيمة المحددة الأولى والتي تعتمد على معاملات المتغيرات جميعها، وهي (det(A)، صفراً فإننا نتوقف عن الحل لعدم وجوده بواسطة طريقة كرامر، أما إذا كانت جميع المحددات تساوي صفراً فهناك عدد غير محدود من الحلول.

ولتوضيح هذه الطريقة سنقوم بحل المصفوفات السابقة والتي تم حلها في المثال (15) السابق بطريقة كرامر هذه المرة.

#### مثال 16

حل المعادلات التالية باستخدام طريقة كرامر:

Solve the following systems of equations using Cramer's Rule:

a) 
$$3X - Y = 2$$
  
 $X + Y = 5$ 

وبتحويل النظام إلى الشكل AX = b لدينا:

$$\left[\begin{array}{cc} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} x \\ y \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 2 \\ 5 \end{array}\right]$$

و الخطوة الأولى هنا هو إيجاد (A) حيث أن 
$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$
 det (A) = (3) (1) - (1) (-1) = 4

وهـذا يعنـي وجود حل لهذه المعادلات باستخدام طريقة كريمر وذلك لكون المحـدد الرئيسي الذي يعتمد على معاملات المتغيرات جميعها لا يساوي صفر بل يساوي 4. وهـنا نستمر بإيجاد المحددات الأخرى لكل متغير محددة وذلك بتغير معاملات ذلك المتغير في عمود الثوابت وكما يلي:

$$\det(A_1) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} . \qquad X$$
ت عنییر معاملات  $\det(A_1) = (2)(1) - (5)(-1) = 7$ 
$$\det(A_2) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} . \qquad Y$$
ت عنییر معاملات  $\det(A_2) = (3)(5) - (1)(2) = 13$ 

وبالتالي فإن قيم المتغيرات حسب صيغة كريمر التي هي كما يلي:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$
 ,  $x = \frac{7}{4}$  ,  $y = \frac{13}{4}$ 

b) 
$$X_1 - X_2 + 0X_3 = 3$$

$$2X_1 - X_2 + 2X_3 = -2$$

$$3X_1 + X_2 + 0X_3 = 3$$

وبتحويل النظام إلى الشكل AX = b لدينا:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

المحددة الرئيسية:

$$\det(A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 4$$

$$\det (A_1) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 4$$

$$\det (A_2) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix} = 12$$

$$\det (A_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} = 2$$

ولذلك فإن قيم المتغيرات هو كما يلي:

$$X_{1} = \frac{\det(A_{1})}{\det(A)} = \frac{0}{4} = 0$$

$$X_{2} = \frac{\det(A_{2})}{\det(A)} = \frac{12}{4} = 3$$

$$X_{3} = \frac{\det(A_{3})}{\det(A)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

c) 
$$2X - 3Y + Z = 5$$
  
 $X + 2Y - Z = 7$   
 $3X - 9Y + 3Z = 4$ 

وبتحويل النظام إلى الشكل AX = b لدينا:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (12 + 18 - 9) - (12 + 18 - 9) = 0$$

وهنا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد حل لهذه المعادلات باستخدام طريقة  $\det(A) = 0$  .

### أسئلت الفصل السادس Exercises for chapter Sex

حل الأسئلة التالية حسب نوعية السؤال من جمع أو طرح مصفوفتين أو ضرب المصفوفة في ثابت للأسئلة (1-4):

Perform the indicated operations and simplify:

1) 
$$4\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$
 2)  $-4\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 

حدد قيم المتغيرات للمصفوفات المتساوية التالية للأسئلة (8-5):
Determine the values of the variables:

5) 
$$\begin{bmatrix} x+1 & 2 & 3 \\ 4 & y-1 & 5 \\ u & -1 & z+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x-1 & t+1 & 3 \\ v+1 & -3 & 5 \\ -4 & w-1 & 2z-1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
1 - 2 & x \\
y & 3 & 4 \\
2 & z & 3
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
1 & t & 6 \\
5 & 3 & 4 \\
u & 2 & v
\end{bmatrix}$$

7) 
$$\begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ 3 & 4 & x \\ u & y & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & 3 & 4 \\ 2 & -1 & y \\ 1 & z & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & v+1 \\ 5 & w-2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
x & 1 & -1 \\
0 & -2 & 3 \\
1 & y & 2
\end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix}
-2 & t & 0 \\
z & 1 & -1 \\
u & 2 & v
\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}
w-4 & 1 & -v \\
4 & 2u & 2v+y \\
-1 & x+7 & 12
\end{vmatrix}$$

### 9) الجانب التطبيقي: مصفوفات الإنتاج (Production matrices):

معمل لإنتاج الملابس يصنع قمصان بالألوان الأحمر، الأسود والأبيض للأطفال والنساء والرجال. إمكانية الإنتاج (بالألف) لخطة عمان كما موضح للمصفوفة التالبة:

A shirt firm makes Red, black, and white shirts for children, women, and men. The production capacity (in thousand) at Amman plant is given by the following matrix:

	Men's	Women's	Children's
Red	20	26	14
Black	35	16	12
White	10	22	20

أوجد معكوس المصفوفة إن أمكن للأسئلة (23-25):

Find the inverse matrix of the following matrices. If possible or if it exists:

$$23) A \left[ \begin{array}{c} 1-2 \\ -3 & 2 \end{array} \right]$$

حل المعادلات التالية باستخدام طريقة كريمر للأسئلة (26-29):

Use Cramer's vale to solve the following system of equation:

26) 
$$2X_1 - X_2 - 3 = 0$$
  
 $3X_1 + 2X_2 - 1 = 0$ 

27) 
$$X_1 + 3X_2 - 7 = 0$$
  
 $4X_1 + 5X_2 = 14$ 

28) 
$$3X_1 - 2X_2 + X_3 = 4$$
  
 $2X_1 + 3X_2 - X_3 = 0$   
 $X_1 + X_2 + X_3 = -1$ 

29) 
$$-X_1 + 2X_2 + 5X_3 = -5$$
  
 $3X_1 + X_2 - 2X_3 = 9$   
 $2X_1 - X_2 + X_3 = 2$ 

# حل المعادلات التالية باستخدام طريقة معكوس المصفوفة للأسئلة (30–33): Use inverse matrix to solve the following systems of equations:

30) 
$$2X_1 - 4X_2 = -3$$
  
 $3X_1 + 5X_2 = 1$ 

32) 
$$X_1 - X_2 + X_3 = 2$$
  
 $-X_1 + X_2 + X_3 = 4$   
 $X_1 + X_2 - X_3 = 0$ 

31) 
$$3X_1 - 2X_2 - 4 = 0$$
  
 $-4X_1 + 3X_2 + 5 = 0$ 

33) 
$$2X_1 - X_2 - X_3 = 3$$
  
 $X_1 - 2X_2 + X_3 = 6$   
 $X_1 + X_2 - 2X_3 = -3$ 

الإدارية والإفتقادية

(1 polat) 2

# الفصل السابع

# المشتقات وتطبيقاتها

- 7-1 مقدمة
- 2-7 المشتقة للدالة
- 3-7 التحليل الهندسي
  - 4-7 قواعد الاشتقاق
- مشتقة الثابت تسأوي صفر
  - 3) مشتقة الدالة
- 4) المشتقة للجمع والطرح لأكثر من دالة قابلة للاشتقاق
  - 5) مشتقة الضرب
  - 6) مشتقة القسمة
  - 7) مشتقة قاعدة السلسلة
    - 8) مشتقة الدالة الأسية
  - 9) مشتقة الدالة اللوغاريتمية الطبيعية
    - 10) المشتقات العليا
  - 5-7 الجانب التطبيقي للمشتقات؛ التحليل الحدي
    - 1) الكلفة الحدية
    - 2) الربح والعائد الحدي
      - 3) الربح الحدي
        - أسئلة الفصل السابع

and the second

ر اربد والإفتصاديد

ASILI L

## الفصل السادس المشتقـــات وتطبيقاتهـــا The Derivatives and its applications

#### 1-7 مقدمة Introduction:

سنتناول في هذا الفصل أحد أهم المفاهيم الرياضية ألا وهي المشتقات Derivatives بجميع أنواعها، وتبدأ الدراسة من عملية تعريف مفهوم المشتقة للدالة إلى قواعد الاشتقاق اللازمة لحساب المشتقات لبعض من الدوال المعروفة، ثم applied والتطبيقات العملية geometric interpretation مفهوم المشتقة.

وكذلك سنتناول بحث وإيجاد المشتقات لجمع وطرح الدوال وكذلك المشتقات المرفوعة إلى قوى Derivatives of power functions ومشتقات الضرب والقسمة وأيضاً مشتقات الدوال الأسية واللوغاريتمية. وكذلك سنتناول تطبيقات التحليل الحدي marginal revenue والعائد الحدي marginal profit وكذلك الربح الحدي المشتقة العديد من الأمثلة وعديك الربح الحدي applied examples وأيضاً سيحتوي الفصل في في العديد من الأسئلة examples.

وبذلك فإن هذا الفصل سيتضمن المباحث التالية: المبحث 7-2 المشتقة للدالة Geometric والمسبحث 3-7 التحليل الهندسي The Derivative of a function -5 والمبحث 5-7 قواعد الاشتقاق Derivatives والمبحث 7-4 الجانب التطبيقي للمشتقات: التحليل الحدي Marginal Analysis.

#### 2-2 الشتقة للدالة The Derivative of a function

تعتبر المشتقة derivative للدالة من المفاهيم الرياضية المهمة والأوسع استخداماً في الدراسات المختلفة وفي الدراسات الاقتصادية خاصة، وقد تطرقنا في

الفصور السابقة إلى ميل الخط المستقيم The slope of a straight line والذي تم تعريفه كنسبة تغير المتغير المعتمد x وحدة واحدة، والذي يرمز له بالرمز x، ويمكن تعريفه كالآتى:

$$m = slope = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

x مقدار التغير في قيمة المتغير المستقل  $\Delta x$ 

Δy يمثل مقدار التغير في قيمة المتغير المعتمد у.

أما  $\Delta$  فهو الحرف الإغريقي الذي يشير إلى مقدار التغير والذي يسمى دلتا delta.

تستخدم المشتقات لقياس معدلات التغير وتعرف على أنها قيم الغاية أو النهاية timit المعدلات التغير وبواسطتها يمكن دراسة الحساسية التي تتأثر بها الدالة عندما يطرأ أي تغيير على المتغير المستقل x فمثلاً من مصلحة رب العمل أن يعرف التغير في عدد وحدات البيع عندما يتغير السعر. وهناك العديد من الأمثلة التي تعتمد على تطبيق المشتقة ومنها الزيادة في كلفة الإنتاج نتيجة الزيادة أو التغير في الوحدات المنتجة أو التغير في الأعداد السكانية مع التقدم في الزمن كما سيتضح من خلال المثال التالى:

#### مثال 1

لفترة عشر سنوات (1990-2000) وجد أن الدالة التالية للزيادة السكانية تصح للسكان في العراق وهي كالآتي:

$$P(t) = 1 + 0.02 t + 0.002 t^2$$

حيث أن p هو عدد الملايين millions من السكان.

وأن t هو مقياس السنين year.

أوجد نسبة زيادة النمو السكاني للعراق منذ بداية 1998.

During the 10 year period from 1990 to 2000, the Iraqi population was found to be given by the formula.

$$P(t) = 1 + 0.0 t + 0.002 t^2$$

Find the rate of growth at the beginning of 1998.

لإيجاد نسبة النمو السكاني للعراق في السنة 1998 والتي تعني t=8 علينا إيجاد التغير أو الزيادة في قيمة p بين p بين p علينا التغير أو الزيادة في الماء التغير أو الزيادة في الماء التغير أو الزيادة في الماء الماء

$$\Delta t = p (8 + \Delta t) - p (8)$$

$$= [1 + 0.02 (8 + \Delta t) + 0.002 (8 + \Delta t)^{2}] - [1 + 0.02 (8) + 0.002 (8)^{2}]$$

$$= 0.052 \Delta t + 0.004 (\Delta t)^{2}$$

وهذا يعني أن معدل نسبة النمو السكاني لهذه الفترة الزمنية يمكن حسابه كما يلى:

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = 0.052 + 0.004 \Delta t$$

وبأخذ الغاية أو النهاية limit عندما  $\Delta t \rightarrow 0$  نجد أن:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} (0.052 + 0.004 \Delta t) = 0.052$$

ولـذلك وعند بداية السنة 1998 نسبة النمو السكاني في العراق هو 0.052 مليون لكل سنة، أي أن العدد هو 52000 لكل سنة.

نسبة التغير في السكان للمثال السابق هي حالة واحدة من مشتقة الدالة والتي سنقوم الآن بتعريفها كالآتي:

#### تعريف المشتقة Derivative definition:

افرض أن الدالية y = f(x) المعينة والمستمرة في مجال معين  $[x_1, x_2]$  ولنختار إحدى نقاط هذا المجال ونجعل المتغير x يأخذ تغيراً طفيفاً مقداره x ولنختار أخر، ننتقل من النقطة x إلى النقطة x المعنى آخر، ننتقل من النقطة x إلى النقطة x المعنى أخر، ننتقل قيمة الدالة من x المنافقة الدالة في النقطة x ونرمز لها بالرمز x الدالة هو x وأن مشتقة الدالة في النقطة x ونرمز لها بالرمز x أو x هو:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

let the given function y = f(x) be well defined and continuous on a given interval. Then, the derivative of y with respect to x, denoted by f'(x) of  $\frac{dy}{dx}$ , is defined t be:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

في نقطة أو في أفي في نقطة أن الدالة f(x) قابلة للاشتقاق في نقطة أو في مجال معين.

وعادة ما يطلق على طريقة إيجاد المشتقة بالشكل أعلاه هو إيجاد المشتقة بطريقة التعريف finding the derivative by definition.

وكذلك تعرف المشتقة باسم المعامل التفاضلي differential coefficient.

ويلاحظ أن هناك أسماء عديدة لمشتقة الدالة f(x)، ويرمز لها بالرموز التالي following symbols:

$$\frac{df}{dx}$$
,  $\frac{dy}{dx}$ ,  $\frac{d}{dx}(f)$ ,  $\frac{d}{dx}(y)$ ,  $f'(x)$ ,  $y'$ ,  $D_x f$ , and  $D_x y$ 

y وجميع هذه التعريفات والرموز لها نفس المعنى والمتمثل بمشتقة المتغير The derivative of y (or f) with respect to x .x .

C المعتمد C أنه مشتقة الدالة C أنه مشتقة الدالة C أو المعتمد وبنفس الأسلوب يمكن تعريف  $\frac{dc}{da}$  أنه مشتقات الدوال.

أوجد المشتقة f'(x) بطريقة التعريف للدالة:

$$f(x) = 4x^2 - 3x + 4$$

x = -3 ثم x = 3 وقدر قيمة المشتقة عند

Find f'(x) for the above function and evaluate f'(3) and f'(-3)

بالرجوع لتعريف المشتقة وكما رأينا تطبيق ذلك في المثال (1) السابق لدينا:

$$f(x) = 4x^2 - 3x + 4$$

$$f(x + \Delta x) = 4 (x + \Delta x)^2 - 3 (x + \Delta x) + 4$$

وبالتالي فإن:

$$f(x + \Delta x) - f(x) = [4 (x + \Delta x)^{2} - 3 (x + \Delta x) + 4] - (4x^{2} - 3x + 4)$$

$$= 4x^{2} + 8x \Delta x + 4 (\Delta x)^{2} - 3x - 3\Delta x + 4 - 4x^{2} + 3x - 4$$

$$= 8x \Delta x - 3\Delta x + 4 (\Delta x)^{2}$$

وبالقسمة على Δx نحصل على:

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = 8x - 3 + 4\Delta x$$

f'(x) عندما  $\Delta x \rightarrow 0$  عندما المشتقة وبأخذ النهاية أو الغاية المشتقة وبأخذ النهاية أو الغاية

كالآتي:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 8x - 3$$

و عن قيمة المشتقة عندما x = 3 ثم عندما x = 3 لدينا:

$$f'(3) = (8)(3) - 3 = 24 - 3 = 21$$

$$f'(-3) = (8)(-3) - 3 = -24 - 3 = -27$$

#### 3-7 التحليل الهندسي Geometric Interpretation:

لاحظنا في المثال (1) عندما يكون المتغير المستقل في الدالة y = f(t) عندما يكون المتغير المستقل في الدالة y = f(t) .rate of change y تعطي نسبة تغير y = f(t) .y = f(t

(x و f(x) و Two points افــرض أن A و B هما نقطتان y = f(x) و y = f(x) و y = f(x) على رسم الدالة y = f(x)

وبالتالي فإن النسبة والتي تعرف كما يلي:


$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

rochord ميل الوتر slope of chord AB. وكلما يقل طول الوتر chord وتقترب النقطتان B و A من بعضهما يصبح الوتر chord تقريباً مماس tangent، أي عندما  $\Delta x \rightarrow 0$  يكون ميل الوتر slope of chord قريباً جداً أو مساوياً إلى ميل المماس  $\Delta x \rightarrow 0$  عند النقطة A.

لذلك:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

A عند النقطة y = f(x) للدالــة y = f(x) للدالــة y = f(x) للدالـة y = f(x) للاحداثــيات y = f(x) الاحداثــيات y = f(x) للاحداثــيات y =



الشكل رقم (1) المعنى الهندسي للمشتقة

أوجد ميل المماس ومعادلة خط المماس لرسم الدالة  $Y = \sqrt{x}$  عند النقطة  $\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{6}\right)$ .

مثال 3

Find the slope of the tangent and the equation of the tangent line to the graph  $Y = \sqrt{x}$  at the above points.

لدينا الدالة المعروفة  $f(x) = \sqrt{x}$  وباستخدام تعريف المشتقة نجد أن المشتقة هي:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

وعندما x = 9 فإن:

$$f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$$

ولهذا فإن ميل المماس slope of the tangent عند النقطة (9 ، 4) هو ولهذا فإن ميل المماس


ولإيجاد معادلة المماس نستطيع استخدام معادلة أو صيغة النقطة والميل.

To obtain the equation of the tangent line, we can use the point – slope formula as follows:

$$y-y_1=m\ (x-x_1)$$
 (2) وأن  $(x_1\ ,\ y_1)=(9\ ,\ 4)$  وأن  $m_1=\frac{1}{6}$  لاحظ الشكل رقم ونجد المعادلة كالآتى:

$$y-4 = \frac{1}{6}(x-9)$$
$$y-4 = \frac{1}{6}x - \frac{9}{6}$$
$$y = \frac{1}{6}x + \frac{15}{6}$$

وهي معادلة المماس المطلوب.



رسم معطيات المثال (3)

 $x = \frac{1}{9}$  أما عندما يكون

$$f'(\frac{1}{9}) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{9}}} = \frac{1}{(2)(\frac{1}{3})} = \frac{3}{2}$$

ولـذلك فإن ميل المماس عند النقطة  $\left(\frac{1}{9},\frac{1}{6}\right)$  يساوي  $m_2=\frac{3}{2}$  يساوي ولـذلك فإن ميل المماس عند النقطة (2) أعلاه.

ومن صيغة معادلة النقطة والميل from the point – slope formula نجد أن المعادلة المطلوبة هي:

$$y - \frac{1}{6} = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{9})$$
$$y - \frac{1}{6} = \frac{3}{2}x - \frac{1}{6}$$
$$y = \frac{3}{2}x$$

وتمثل معادلة المماس المطلوبة عند النقطة  $\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{6}\right)$ .

#### Derivatives Rules قواعد الاشتقاق

لاحظنا أن استخدام طريقة التعريف لإيجاد مشتقة الدوال تتضمن العديد من الخطوات والتي تكون غالبيتها صعبة التعامل وتحتاج إلى الكثير من العمليات الجبرية. والتغلب على مثل هذه الصعوبات في إيجاد مشتقات الدوال، وخصوصاً البسيطة والأكثر استخداماً والأسهل تعاملاً منها، هو استخدام ما يسمى بقواعد أو قوانين الاشتقاق derivatives rules. هذه القواعد أو القوانين هي في الحقيقة نظريات لها براهين محددة لن يتم الدخول في تفاصيلها في هذا الكتاب، وذلك لأننا نود التأكيد في هذا الكتاب على تطبيق هذه القواعد والاستعانة بها لإيجاد المشتقات

أكثر من الدخول في التفاصيل الرياضية البعيدة عن هدف الكتاب في الوقت الحاضر.

وسيتم عرض هذه القواعد بالشكل البسيط التالي:

:Let y = c, then 
$$\frac{dy}{dx} = zero$$
 مشتقة الثابت تساوي صفر (1

وهذا واضح جداً من التحليل الهندسي لرسم الدالة الثابتة، حيث أنه عندما يكون y ثابت فسوف يكون المستقيم موازي إلى الإحداثي السيني x-axis وهذا يعني أن ميله يساوي صفر. وبما أن المشتقة هي الميل فلذلك فإن المشتقة للثابت هي صفر.

#### 2) مشتقة أو صيغة القوة أو الأس The power formula:

**Iet** 
$$y = x^n$$
, then  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$ 

positive constant وذلك يعني أنه إذا كانت قوة المتغير x كمية ثابتة موجبة power نطرح واحد من القوة إلى المتغير x ونضرب المتغير x في القوة قبل طرح الواحد.

We decrease the power of x by 1 and multiply by the original exponent of x.

والمثال التالي لتوضيح ذلك:

مثال 4

أوجد مشتقة الدوال التالية:

Find  $\frac{dy}{dx}$  for the following:

a) 
$$y = x^5$$
 
$$\frac{dy}{dx} = 5x^4$$

c) 
$$v = \sqrt{x}$$

$$y = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

d) 
$$y = x^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

e) 
$$y = \frac{1}{x^2}$$

$$y = x^{-2}$$

$$\frac{dy}{dx} = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$$

f) 
$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$y = x^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}}$$

د) مشتقة الدالة y = cx مشتقة الدالة y = cx

Let y = cx then if cx is differentiable function of x, and c is a contant, then  $\frac{dy}{dx} = c\frac{dy}{dx}$ 

ويعني ذلك أن مشتقة ضرب ثابت في دالة للمتغير x هو ضرب الثابت في مشتقة تلك الدالة.

The derivative of the product of a constant by a function is the product of the constant by the derivative of the function.

و المثال التالي لتوضيح ذلك:

مثال 5

أوجد مشتقة الدوال التالية:

Find  $\frac{dy}{dx}$  for the following:

a) 
$$y = cx^n$$

$$\frac{dy}{dx} = cnx^{n-1}$$

b) 
$$y = 10 x^4$$

$$\frac{dy}{dx} = (10)(4)x^3 = 40x^3$$

c) y = 
$$\frac{5}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-5}{x^2}$$

d) 
$$v = 2\sqrt{x}$$

$$y = 2x^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = (2)(\frac{1}{2})x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

4) المشتقة للجمع والطرح لأكثر من دالة قابلة للاشتقاق:

If u(x) and v(x) are two differentiable functions of x, then

$$f(x) = u \mp v$$

and 
$$f'(x) = \frac{du}{dx} \mp \frac{dv}{dx}$$

والمثال التالي لتوضح هذه القاعدة:

مثال 6

Find f'(x) for the following: اوجد مشتقة الدوال التالية

a) 
$$f(x) = x^3 + \sqrt[3]{x}$$

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$$

b) 
$$y = 4x^3 + \frac{4}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = 12x^2 - 8x^{-3}$$

$$\frac{dy}{dx} = 12x^2 - \frac{8}{x^3}$$

c) 
$$y = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 10$$

$$\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 10x + 7$$

d) 
$$y = \frac{7x^4 - 5x^3 + 5}{3x^2}$$

$$y = \frac{7}{3}x - \frac{5}{3} + \frac{5}{3}x^{-3}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{7}{3} - 5x^{-4}$$

#### 5) مشتقة الضرب Product Rule:

x ننفرض أن u(x) و u(x) دالتين قابلتان للاشتقاق بالنسبة للمتغير u(x) If u(x) and v(x) are any two differentiable functions of x, then

$$\frac{d}{dx}(u.v) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

أو تكتب المشتقة للضرب بالأسلوب الآخر التالي:

$$(uv)' = uv' + vu'$$

وتعني أن مشتقة حاصل ضرب دالتان هو الدالة الأولى في مشتقة الدالة الثانية مضافاً إليه (زائد) الدالة الثانية في مشتقة الدالة الأولى.

In words, the derivative of the product of two functions is equal to the first function times the derivative of the second plus the second function times the derivative of the first.

والمثال التالي لتوضيح هذه القاعدة:

مثال 7

أوجد المشتقة للدوال f'(x) إذا كانت الدوال:

Find f'(x) if

a) 
$$f(x) = (4x^3 - 2x)(3x^2 + 4x + 7)$$

b) 
$$f(x) = (2\sqrt{x} + 1)(x^2 + 3)$$

c) 
$$f(x) = (3x^2 + 2x + 1)(x^2 - 2)$$

$$a) f(x) = uv$$

لإيجاد المشتقة للفرع (a) يمكن أن تكتب الدالة بحالة الضرب بافتراض أن:

$$u = 4x^3 - 2x$$

$$v = 3x^2 + 4x + 7$$

وبتطبيق صيغة الضرب نجد:

$$u' = 12x^2 - 2$$

$$v' = 6x + 4$$

وبالتالي فإن:

$$f'(x) = uv' + vu'$$

$$= (4x^3 - 2x)(6x + 4) + (3x^2 + 4x + 7)(12x^2 - 2)$$

$$f'(x) = 60x^4 + 64x^3 + 66x^2 - 16x - 14$$

و

هناك طريقة ثانية لإيجاد مشتقة الضرب هو أن نضرب الدالتين أولاً ثم نقوم بعملية المشتقة كما في الأسلوب والأمثلة السابقة وكما يلي:

$$f(x) = 12x^5 + 16x^4 + 22x^3 - 8x^2 + 14x$$

$$f'(x) = 60x^4 + 64x^3 + 66x^2 - 16x - 14$$

وهذه هي نفس النتيجة.

و لإيجاد مشتقة الفرع (b) لدينا

b) 
$$f(x) = (2\sqrt{x} + 1)(x^2 + 3)$$

نستخدم قاعدة الضرب لحل المسألة وبافتراض أن:

$$u = 2\sqrt{x} + 1 = 2x^{\frac{1}{2}} + 1$$
,  $v = x^2 + 3$ 

إذن المشتقة هي:

$$u' = x^{-\frac{1}{2}}$$
 ,  $v' = 2x$ 

ولذلك فالمشتقة كما يلى:

$$f'(x) = uv' + vu'$$

$$= (2x^{\frac{1}{2}} + 1)(2x) + (x^2 + 3)(x^{-\frac{1}{2}})$$

$$= 4x^{\frac{3}{2}} + 2x + x^{\frac{3}{2}} + 3x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 5x^{\frac{3}{2}} + 2x + \frac{3}{x^{\frac{1}{2}}}$$

وأخيراً لإيجاد مشتقة الفرع (c) لدينا:

c) 
$$f(x) = (3x^2 + 2x + 1)(x^2 - 2)$$

وبتطبيق القاعدة مباشرة لدينا:

$$f'(x) = (3x^2 + 2x + 1)(2x) + (x^2 - 2)(6x + 2)$$
$$f'(x) = 12x^3 + 6x^2 - 10x - 4$$

6) مشتقة القسمة Quotient Rule

x إذا كانت u(x) و v(x) قابلتان للاشتقاق بالنسبة إلى

If u(x) and v(x) are differentiable functions of x, then

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$$

أو يمكن أن نضعها في الصيغة التالية:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{vu' - uv'}{v^2}$$

وتعني أن مشتقة القسمة هو ضرب دالة المقام في مشتقة البسط مطروحاً منه (ناقص) مشتقة المقام في دالة البسط مقسوم على مربع المقام.

و المثالين التاليين لتوضيح قاعدة القسمة.

مثال 8

أوجد المشتقة للدوال التالية مستخدماً صيغة مشتقة القسمة.

Use the quotient rule to differentiate the following functions:

a) 
$$f(x) = \frac{2x+5}{2x-5}$$
 b)  $f(x) = \frac{1-x^3}{1+x^3}$  c)  $f(x) = \frac{x}{x-1}$ 

a) 
$$f'(x) = \frac{(2x-5)(2)-(2x+5)(2)}{(2x-5)^2} = \frac{-20}{(2x-5)^2}$$

b) 
$$f'(x) = \frac{(1+x^3)(-3x^2) - (1-x^3)(3x^2)}{(1+x^3)^2} = \frac{-6x^2}{(1+x^3)^2}$$

c) 
$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 \cdot 1 - x \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x-1)^2}$$

مثال 9

أوجد المثبتقة للدالة التالية مستخدماً دالة القسمة:

Find the derivative of the following function by using the Quotient Rule:

$$f(x) = \frac{(x+1)(x^2 - 2x)}{x-1}$$

نفرض أن:

$$f(x) = \frac{u}{v}$$

وأن المشتقة تكون:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

حيث أن:

$$v' = 1$$
 ,  $u' = (x+1)(3x^2-2) + (x^3-2x).1$   
 $u' = 4x^3 + 3x^2 - 4x - 2$ 

إذن المشتقة هي:

$$f'(x) = \frac{(x-1)(4x^3 + 3x^2 - 4x - 2) - (x+1)(x^3 - 2x).1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3x^4 - 2x^3 - 5x^2 + 4x + 2}{(x-1)^2}$$

7) مشتقة قاعدة السلسلة The Chain Rule:

إذا كانت y دالة بالنسبة إلى u وأن u هو دالة إلى x إذن تكون المشتقة

كما يلى:

If y is a function of u and u is function of x, then

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

وتستخدم هذه المشتقة في حالة الدوال المعقدة.

Using it to differentiate a complicated function.

مثال 10 أ

أوجد المشتقة للدوال التالية مستخدماً صيغة السلسلة وحدد كيفية تحليل كل دالة.

Find the derivative of the following functions, use the chain rule, indicate how each function is decomposed:

a) 
$$y = (1 - x^3)^4$$

b) 
$$y = \sqrt{4x + 4}$$

c) 
$$y = (x^3 + 1)^6$$

لاستخدام صيغة السلسلة نستطيع تحليل كل دالة كما يلي:

(a) 
$$y = (1 - x^3)^4$$

افر ض أن  $y = u^4$  عندما  $u = 1 - x^3$  عندما

$$\frac{dy}{du} = 4u^3 \qquad , \qquad \frac{dy}{dx} = -3x^2$$

وعليه باستخدام صيغة السلسلة Chain Rule لدينا ما يلي:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = (4u^3) \cdot (-3x^2)$$
$$= 4(1 - x^3)^3 (-3x^2)$$
$$\frac{dy}{dx} = -12x^2 (1 - x^3)$$

b) 
$$y = \sqrt{4x+4} = (4x+4)^{\frac{1}{2}}$$

افرض أن  $y=u^{\frac{1}{2}}$  عندما u=4x+4 افرض أن

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \qquad , \qquad \frac{du}{dx} = 4$$

وعليه باستخدام صيغة السلسلة chain rule لدينا ما يلي:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \cdot 4$$

$$= \frac{1}{2}(4x+4)^{-\frac{1}{2}} \cdot 4$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{(4x+4)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{4x+4}}$$

c) 
$$y = (x^3 + 1)^6$$

افر ض أن  $y = u^6$  عندما  $u = x^3 + 1$  المشتقة:

$$\frac{dy}{du} = 6u^5 \qquad , \qquad \frac{du}{dx} = 3x^2$$

وعليه باستخدام صيغة مشتقة السلسلة كما يلي:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 6u^5 \cdot 3x^2$$

$$= 6(x^3 + 1)^5 \cdot 3x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = -18x^2(x^3 + 1)^5$$

ويمكن وضع صيغة مشتقة دالة السلسلة كما يلي:

1) If 
$$\mathbf{y} = [\mathbf{u}(\mathbf{x})]^n$$
 then  $\left[ \frac{dy}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx} \right]$ 

- 2) If y = f (inside), then  $\frac{dy}{dx} = f'(inside)$ . (derivative of inside with respect to x).
- 3) If  $y = (inside)^n$ , then  $\frac{dy}{dx} = n(inside)^{n-1}$ . (derivative of inside with respect to x).

تعتبر الصيغ الأخيرة طريقة مباشرة لإيجاد مشتقة الدالة بصيغة السلسلة وسيتم توضيح ذلك بالمثال التالي:

#### أ مثال 11

Chain Rule أوجد المثنقة للدوال التالية مستخدماً صيغة السلسلة Given the following functions, find  $\frac{dy}{dx}$ :

a) 
$$y = (2x^4 + 1)^3$$

b) 
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 10)}}$$

c) 
$$y = (x^2 + 3x - 10) (3 - x^2)^3$$

d) 
$$f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4$$

يمكن التطبيق المباشر لصبيغة السلسلة كالآتى:

a) 
$$y = (2x^4 + 1)^3$$
,  $\frac{dy}{dx} = 3(inside)^2 \cdot \frac{d}{dx}(inside)$   

$$\frac{dy}{dx} = 3(2x^2 + 1)^2 \cdot \frac{d}{dx}(2x^4 + 1)$$

$$\frac{dy}{dx} = 3(2x^4 + 1)^2 \cdot 8x^3$$

$$\frac{dy}{dx} = 24x^3(2x^4 + 1)^2$$

b) 
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 10)}} = (x^2 + 10)^{-\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(x^2 + 10)^{-\frac{1}{2}-1} \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + 10)$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(x^2 + 10)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x$$

$$f'(x) = -x(x^2 + 10)^{-\frac{3}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{-x}{(x^2 - 10)^{\frac{3}{2}}}$$

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{(x^2 + 10)^3}}$$

c) 
$$y = (x^2 + 3x - 10) (3 - x^2)^3$$
  

$$\frac{dy}{dx} = (x^2 + 3x - 10)3(3 - x^2)^2 \cdot (-2x) + (3 - x^2)^3 (2x + 3)$$

$$\frac{dy}{dx} = -6x(3 - x^2)^2 (x^2 + 3x - 10) + (3 - x^2)^3 (2x + 3)$$

$$\frac{dy}{dx} = (3 - x^2)^2 \left[ -6x(x^2 + 3x - 10) + (3 - x^2)(2x + 3) \right]$$

d) 
$$f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4$$
  

$$f'(x) = 4\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 \cdot \frac{(x+1) \cdot 1 - (x-1) \cdot 1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 4\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 \cdot \frac{2}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 8\frac{(x-1)^3}{(x+1)^5}$$

8) مشتقة الدالة الأسية Derivative of Exponential function

$$\mathbf{Iet} \ \mathbf{y} = \mathbf{e}^{\mathbf{x}}, \ \mathbf{then} \ \frac{dy}{dx} = e^{x}.1 = e^{x}$$

مشتقة الدالة الأسية هي الدالة الأسية نفسها مضروبة بمشتقة الأس. والمثال التالي لتوضيح مشتقة الدالة الأسية:

#### مثال 12

أوجد المشتقة للدوال الأسية التالية:

Find the derivatives for the following exponential functions:

a) 
$$y = xe^x$$

b) 
$$y = e^{x^4}$$

c) 
$$y = x^3 e^x$$

$$d) y = \frac{e^x}{x+1}$$

e) 
$$y = e^{3x}$$

f) 
$$y = e^{x^3 - 3x^2}$$

g) 
$$y = xe^{\frac{1}{x}}$$

لإبجاد المشتقات لدينا:

a) 
$$y = xe^x$$

افرض أن 
$$y = uv$$
 و أن  $y = uv$  اذلك فإن:

$$\frac{du}{dx} = 1$$
 ,  $\frac{dv}{dx} = e^x$ 

$$\frac{dy}{dx} = u.v' + v.u'$$

$$\frac{dy}{dx} = xe^{x} + e^{x}.1 = (x+1)e^{x}$$

b) 
$$y = e^{x^4}$$

$$\frac{dy}{dx} = e^{x^4}.4x^3 = 4x^3e^{x^4}$$

c) 
$$y = x^3 . e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = x^3 \cdot e^x + e^x \cdot 3x^2 = (x^3 + 3x^2)e^x$$

d) 
$$y = \frac{e^x}{x+1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x+1)e^x - e^x}{(x+1)^2}$$

$$=\frac{xe^{x}+e^{x}-e^{x}}{(x+1)^{2}}=\frac{xe^{x}}{(x+1)^{2}}$$

e) 
$$y = e^{3x}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3e^{3x}$$

f) 
$$y = e^{x^3 - 3x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = (3x^2 - 6x)e^{x^3 - 3x^2}$$

g) 
$$y = xe^{\frac{1}{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = x.e^{\frac{1}{x}}(-x^{-2}) + e^{\frac{1}{x}}$$

$$=-x^{-1}e^{\frac{1}{x}}+e^{\frac{1}{x}}=(1-x^{-1})e^{\frac{1}{x}}=(1-\frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}}$$

# 9) مشتقة الدالة اللوغاريتمية الطبيعية:

#### Derivative of the logarithmic function

Let y = lnx, then 
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}$$

مشتقة الدالة اللوغاريتمية هو واحد على الدالة ومن ثم يضرب الناتج في

مشتقة الدالة. والمثال التالي لتوضيح مشتقة الدوال اللوغاريتمية:

مثال 13 🗸

أوجد مشتقة الدوال اللوغاريتمية التالية:

$$a) y = \ln (x + c)$$

b) 
$$y = \ln(x^4 + 2x - 10)$$

c) 
$$y = \frac{\ln x}{r^2}$$

- d)  $y = x \ln x$
- e)  $y = x \ln(x+1)$
- f)  $y = \frac{x}{\ln x}$
- g)  $y = \log_{10} x^2$

لإبجاد المشتقات لدينا:

a) 
$$y = \ln(x + c)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+c)} \cdot 1 = \frac{1}{x+c}$$

b) 
$$y = \ln (x^4 + 2x - 10)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x^4 + 2x - 10)}.(4x^3 + 2) = \frac{4x^3 + 2}{(x^4 + 2x - 10)}$$

c) 
$$y = \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 \left(\frac{1}{x}\right) - (\ln x)(2x)}{(x^2)^2} = \frac{x - 2x \ln x}{x^3}$$
$$= \frac{x(1 - 2\ln x)}{x^4} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$$

d)  $y = x \ln x$ 

$$\frac{dy}{dx} = x\frac{1}{x} + \ln x(1) = 1 + \ln x$$

e) 
$$y = x \ln(x+1)$$

$$\frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{(x+1)} + \ln(x+1)(1) = \frac{x}{(x+1)} + \ln(x+1)$$

f) 
$$y = \frac{x}{\ln x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x - x^{\frac{1}{2}}}{(\ln x)^{2}} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^{2}}$$

$$g) y = \log_{10} x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x^2}{\ln 10} = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 \ln 10}$$

اشتقاق الدالة اللوغاريتمية يجب أن يوضع أو لا بصيغة اللوغاريتم الطبيعي

The common logarithm (log) to be expressed in terms of a natural logarithm (ln) before it could be differentiated.

وتطبق هذه الصيغة لأي أساس للدالة اللوغاريتمية فيجب أن تحول إلى لوغاريتم طبيعي ومن ثم تشتق الدالة.

#### :Highter Derivatives المشتقات العليا

نستطيع أن نشتق الدالة لأكثر من مرة إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق وتسمى المشتقة الأولى والمشتقة الثالثة وإلى آخره إلى أعلى درجة ممكنة.

Let y = f(x) be a given function of x with derivative dy/dx = f'(x). In full, we call this the first derivative of y with respect to x. If f'(x) is a differentiable function of x, its derivative is a differentiable function of x, its derivative of y with respect to x. If the second derivative is a differentiable function of x, its derivative is called the third derivative of y, and so on.

ويمكن أن نرمز إلى المشتقات الأولى والثانية والثالثة وإلى أعلى مرتبة كما يلي:

The first and all higher – order derivatives of y with respect to x are generally denoted by one of the following types of notation:

$$\frac{dy}{dx} , \frac{d^2y}{dx^2} , \frac{d^3y}{dx^3} , \dots \frac{d^ny}{dx^n}$$

$$y' , y'' , y''' , \dots y^{(n)}$$

$$f'(x) , f''(x) , f'''(x) , \dots f^{(n)}(x)$$

والمثال التالي لتوضيح معنى المشتقات من درجات أعلى:

#### مثال 14

أوجد المشتقة الأولى والثانية وإلى أعلى درجة للدوال التالية:

Find the first and second, and higher-order derivatives of:

a) 
$$y = 2x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 4x^2 - 100$$

b) 
$$f(x) = x^4$$

c) 
$$y = x^2 \ln x$$

لإيجاد المشتقات لدينا:

a) 
$$y = 2x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 4x^2 - 100$$
  

$$\frac{dy}{dx} = 10x^4 - 12x^3 + 15x^2 - 8x$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 40x^3 - 36x^2 + 30x - 8$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = 120x^2 - 72x + 30$$

$$\frac{d^4y}{dx^4} = 240x - 72$$

$$\frac{d^5y}{dx^5} = 240$$

ونلاحظ هنا بأن المشتقة السادسة وجميع المشتقات من الدرجات الأعلى جميعها صفر.

b) 
$$f(x) = 4x^4$$
  
 $f'(x) = 4x^3$   
 $f''(x) = 12x^2$   
 $f'''(x) = 24x$   
 $f^{(4)}(x) = 24$ 

ونلاحظ هنا بأن المشتقة الخامسة وجميع المشتقات من الدرجات الأعلى جميعها صفر.

c) 
$$y = x^{2} \ln x$$
  

$$y' = x^{2}. \frac{1}{x} + \ln x.2x$$

$$y'' = x^{2}(-x^{-2}) + x^{-1}(2x) + \ln x(2) + 2x\frac{1}{x}$$

$$= -1 + 2 + 2\ln x + 2$$

$$y'' = 3 + 2\ln x$$

ونلاحظ هنا بأننا يمكننا الاستمرار بعملية الاشتقاق إلى درجات عليا.

# 5-7 الجانب التطبيقي للمشتقات: التحليل الحدي

# Applications for the Derivatives: Marginal Analysis

هناك العديد من تطبيقات المشتقات في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد applications in business and economics لإعداد أو لبناء ما يسمى النسب الحدية marginal rates.

في هذا المجال كلمة حدية marginal تستخدم لتعني المشتقة derivative وهو نسبة التغير rate of change والأمثلة التالية توضح عملية تطبيق المشتقات في هذه المجالات.

# :Marginal Cost الكلفة الحدية (1

افرض أن أحد المصنعين لأحد المواد وجد أنه لغرض صنع x من الوحدات وجد أنه لغرض صنع x من الوحدات the total cost in dollars عدد الدولارات the total cost in dollars تتمثل بدالة الكلفة التالية (C=400+0.4 x²). وإذا كان عدد الوحدات المنتجة في الأسبوع هو 200 فإن الكلفة كما يلي ( $C=400+0.4 \times (200)^2=2000$ ) ومعدل إنتاج الوحدة الواحدة average cost puritan هو  $C=\frac{2000}{200}$  دو لار .

والآن افرض أن المصنع قرر تغيير خطة الإنتاج من 200 إلى ( $\Delta x$ ) وحدة في الأسبوع. حيث أن  $\Delta x$  هو التغير في زيادة الإنتاج لعدد الوحدات. إذن الكلفة سوف تكون:

$$C + \Delta C = 400 + 0.04 (200 + \Delta x)^{2}$$
$$= 400 + 0.04 [40000 + 400 \Delta x + (\Delta x)^{2}]$$
$$= 2000 + 16 \Delta x + 0.04 (\Delta x)^{2}$$

ولذلك فالكلفة الإضافية (extra cost) لإنتاج الوحدات الإضافية هي:

$$\Delta C = (C + \Delta C) - C$$

$$\Delta C = 2000 + 16 \Delta x + 0.04 (\Delta x)^{2} - 2000$$

$$\Delta C = 16 \Delta x + 0.04 (\Delta x)^{2}$$

ولهذا فمعدل الكلفة لكل وحدة إضافية تم إنتاجها هو:

The average cost per item of the extra items is therefore:

$$\frac{\Delta C}{\Delta x} = 16 + 0.04 \Delta x$$

( $\Delta x$ =40) المثال المثال الفرض أن الإنتاج قد ازداد من 200 إلى 240 ( $\Delta x$ =40) Average cost for the الكلفة الله 40 وحدة الإضافية additional 40 items سوف تساوي:  $\Delta x$ =40 لكل أسبوع.

 $\Delta x=10$  أمـــا إذا كانت الزيادة من  $\Delta x=10$  إلى  $\Delta x=10$  فإن معدل الكلفة إلى  $\Delta x=10$  وحدات الإضافية سوف يكون ( $\Delta x=10$ ) لكل أسبوع.

وعليه فإن الكلفة الحدية marginal cost هي معدل كلفة الوحدة الإضافية عندما يكون هناك تغيير قليل جداً بزيادة عدد الوحدات المنتجة.

The average cost per extra item when a very small change is made in the amount produced.

وفي المثال السابق فإن الكلفة الحدية كما يلي:

Marginal Cost = 
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta C}{\Delta X} = \lim_{\Delta x \to 0} (16 + 0.04 \Delta x) = 16$$

وفي حالة دالة الإنتاج العامة C(x) general cost function C(x) تمثل كلفة إنتاج x من الوحدات المحددة، فإن الكلفة الحدية هي:

Marginal Cost = 
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta C}{\Delta X} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{C(x + \Delta x) - C(x)}{\Delta x}$$

derivative of the ويتضح بذلك أن الكلفة الحدية تمثل المشتقة لدالة الكلفة with respect to the amount بالنسبة إلى الكميات المنتجة produced أي أن:

Marginal Cost = 
$$\frac{dc}{dx}$$

وهنا فإن الكلفة الحدية تقيس نسبة زيادة الكلفة بالنسبة للزيادة في كميات الإنتاج.

The marginal cost measures the rate at which the cost is increasing with respect to increases in the amount produced.

ا شال 15 ا

افرض أن الدالة التالية تمثل دالة الكلفة Total cost function:

$$C(x) = 0.001 x^3 - 0.3 x^2 + 40 x + 800$$

7/

Evaluate كدالة إلى المتغير x. قدر marginal cost حدد الكلفة الحدية عندما يكون الإنتاج x=150 ، x=100 ، x=100 ، x=100 ، x=100 الحدية عندما يكون الإنتاج

في هذا المثال المطلوب إيجاد مشتقة الدالة ((C'(x))).

والدالة السابقة للإنتاج تتكون من عدة أنواع من قوى المتغير x وعند الاشتقاق نجد ما بلي:

$$C'(x) = 0.003 x^2 - 0.6 x + 40$$

الدالــة الأخيـرة تمــثل الكلفة الحدية، ولهذا سوف تعطي معدل كلفة زيادة الإنتاج كمية قليلة على الكمية المنتجة وكما يلي:

عندما x = 50 فإن الكلفة الحدية سوف تكون:

$$C'(x) = 0.003 x^{2} - 0.6 x + 40$$

$$C'(50) = (0.003) (50)^{2} - (0.6) (50) + 40$$

$$= 7.5 - 30 + 40 = 16.5$$

وعندما تكون x = 100 فإن الكلفة الحدية سوف تكون:

$$C'(100) = (0.003) (100)^{2} - (0.6) (100) + 40$$
$$= 30 - 60 + 40 = 10$$


أما عندما تكون x = 150 فإن الكلفة الحدية سوف تكون:

$$C'(150) = (0.003) (150)^{2} - (0.6) (150) + 40$$
$$= 67.5 - 90 + 40 = 17.5$$

واضح من المثال أن الكلفة الحدية قد انخفضت عندما ازداد الإنتاج من 50 السي 100 وحدة وبعدها ازداد مرة ثانية عندما ازداد الإنتاج من 100 إلى 150. ويمكن توضيح هذه النتائج في الشكل رقم (3) التالي. وهذا السلوك إلى الكلفة الحدية هو سلوك طبيعي حيث الإنتاج 100 هو الأمثل.

والتفسير الاقتصادي يوضح احتمال إنتاج 100 وحدة هو الإنتاج الأمثل الاستخدام المكائن والمواد والوقت وأقل من ذلك يعني أننا لم نستخدم المواد

والمكائن والوقت استخدام أمثل وكذلك عندما تزيد الكمية عن 100 فإن المكائن والمواد الإضافية والوقت يحتاج إلى زيادة إضافية لا يمكن أن تستوعب من قبل المكائن مرة واحدة فنحتاج إلى تكرار العملية لإنتاج الوحدات الإضافية ولذلك تزداد الكلفة.



تفسير الكلفة الحدية للمثال رقم (15)

وعلى ضوء نتائج الكلفة الحدية يكون من المهم أن نقارن بين سلوك الكلفة الحديث simple linear مع معادلة أو نموذج الكلفة الخطي البسيط marginal cost مع معادلة أو نموذج الكلفة الخطي البسيط (C(x) = mx + b) ثوابت والكلفة الحديث C'(x) = m عيث C'(x) = m ثابت لكل قيم C'(x) = m هذه الكلفة ولكل وحدة إضافية additional unit لإنتاج تكون ثابتة، لا تعتمد أو مستقلة عن مستوى الإنتاج.

ومن الضروري عدم الخلط بين الكلفة الحدية marginal cost مع معدل ومن الضروري عدم الخلط بين الكلفة الحدية the cost function فإن معدل عبد الكلفة average cost فإذا كان (x) هو دالة الكلفة the average cost of producing x items كلفة الإنتاج x من الوحدات x مقسوم على عدد الوحدات المنتجة وكما يلى:

Average cost per Item = 
$$\frac{C(x)}{x}$$

C'(x) وهذه الدالة تختلف بشكل كامل عن الكلفة الحدية والتي هي المشتقة average cost per لكلفة لكل وحدة إضافية derivative للحدية تمثل معدل الكلفة لكل وحدة إضافية additional unit المثال على الإنتاج والفرق بين الحالتين كما في المثال التالى:

### مثال 16

يلى:

لدالة الكلفة cost function التالية:

$$C(x) = 10000 + 20 x + 0.2 x^2$$

الدالة الحدية marginal cost لهذه الدالة هي:

$$C'(x) = 20 + 0.4 x$$

أما معدل كلفة الإنتاج The average cost of producing x items فهو كما

$$\overline{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{10000}{x} + 20 + 0.4x$$
و هاتان الدالتان تختلفان اختلافاً كبيراً وجو هرياً فيما بينما.

# 2) الربح والعائد الحدي Marginal Revenue and profit

sale الآن نوجد اشتقاق العوائد revenues derived الآن نوجد اشتقاق العوائد of a firm's products أو خدمات معينة. إذا كان R(x) يمثل العائد بالدو لار فإن x من مبيعات x من الوحدات، ويعرف العائد الحدي marginal revenue يمثل مشتقة العائد، R'(x) ، وكما يلي:

Marginal Revenue = 
$$R'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta R}{\Delta x}$$

افرض أن عدد الوحدات المباعة قد از دادت من x إلى  $x+\Delta x$ ، وتتبعها زيادة في العائد corresponding increment in revenue في العائد

 $\Delta R$  = New Revenue – Old Revenue

 $\Delta R = R (x + \Delta x) - R(x)$ 

average increate in معدل السريادة في العائد لكل وحدة مباعة إضافية معدد  $\Delta R$  على عدد revenue per additional item sold المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل عليه أي يكون  $\frac{\Delta R}{\Delta x}$ ، وتحديد قيمة الغاية value لهذا المعدل  $\Delta x$  وهذا هو العائد الحدى marginal revenue.

والعائد الحدي يمثل الدخل الإضافي إلى الحقل لكل وحدة إضافية مباعة، أي يكون هو النسبة عدي العائد بالنسبة إلى الزيادة في حجم المبيعات rate .in the volume of sales

#### مثال 17

افرض أن الدالة التالية تمثل دالة العائد revenue function:

$$R(x) = 20x - 0.02 x^2$$

عندما يكون x عدد الوحدات المباعة، حدد العائد الحدي. ثم قدر العائد x = 200 الحدي عندما يكون

في البداية نحتاج لإيجاد وتقدير R'(x) كالآتي:

$$R'(x) = 20 - 0.04 x$$

x=200 وهذا هو العائد الحدي عندما تكون x من الوحدات المباعة. وعندما فإن العائد الحدي هو:

$$R'(200) = 20 - 0.04(200) = 12$$

ويعني ذلك عندما تباع 200 وحدة فإن أي زيادة قليلة في المبيعات يضيف زيادة على العائد بمقدار \$12 لكل وحدة.

$$R(x) = xP$$
 ويمكن أن يعرف العائد أيضاً كالآتي

عيندما P هيو سعر الوحدة المباعة و x عدد الوحدات المباعة، وفي حالات عديدة يتم استخدام المتغيرات للعلاقة بين x و P على أنها تمثل دالة الطلب demand equation.

#### مثال 18

أوجد العائد الحدي، عندما يكون 300 x = 300 إذا كانت دالة الطلب كما في المعادلة التالية:

Find the marginal revenue, when x = 200, if the demand equation is:

$$x = 1000 - 100 p$$

x = p وحدد الوحدات المباعة p عيث أن السعر

أولاً يجب أن نضع المعادلة بصيغة p السعر هو دالة إلى المتغير x عدد الوحدات المباعة أو المطلوبة كالآتي

$$100 p = 1000 x$$

بالقسمة على 100 تكون المعادلة:

$$P = 10 - 0.01x$$

وتمثل معادلة الطلب، أما دالة العائد فهي كما يلي:

Then the revenue function is given by:

$$R(x) = xp$$

$$R(x) = xp = x (10 - 0.01x)$$

$$R(x) = 10 x - 0.01x^2$$

الآن نستطيع إيجاد العائد الحدي من الدالة للعائد وذلك بإيجاد المشتقة للدالة R(x) كالآتى:

$$R'(x) = 10 - 0.02 x$$

أما العائد الحدي عندما يكون حجم الطلب أو المبيعات تساوي x = 300 فإن العائد الحدى سوف يكون 4 وكما يلى:

$$R'(300) = 10 - (0.02)(300) = 10 - 6 = 4$$

# 3) الربح الحدي Marginal Profit:

الربح في الأعمال التجارية هو الفرق بين العائد والكلفة

The profit in business is the difference between its revenue and its costs.

إذا كانت دالة العائد R(x) عندما x تمثل عدد الوحدات المباعة. وإذا كانت P(x) ، profit هي دالة الكلفة عندما x هو عدد الوحدات المنتجة. فإن الربح x من الوحدات يمكن إيجاده بالصيغة التالية:

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

والمشتقة لهذه الصيغة P'(x) تدعى الربح الحدي marginal profit والتي تمثل الربح الإضافي لكل وحدة إذا تم تغيير الإنتاج بمقدار قليل.

It represents the additional profit per item if the production changes by a small increment.

#### مثال 19

افرض أن معادلة الطلب لبضاعة معينة كما يلي:

The demand equation for a certain item is:

$$P + 0.2 x = 100$$
 ,  $P = 100 - 0.2x$ 

and the cost function is ودالة الكلفة كما يلي

$$C(x) = 4000 + 30x$$

احسب الربح الحدي عندما يكون هناك 100 وحدة قد أنتجت وبيعت وكذلك 200 وحدة أنتجت وبيعت.

Compute the marginal profit when 100 units are produced and sold and when 200 units are produced and sold.

:The revenue function is given by أعطيت دالة العائد كما يلي

$$R(x) = xp = x (100 - 0.2 x)$$
$$= 100 x - 0.2 x^{2}$$

7

ولذلك الربح من إنتاج وبيع x من الوحدات هو:

Therefore the profit from producing and selling x items is:

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

$$= (100x - 0.2x^{2}) - (4000 + 30x)$$

$$= 70x - 0.2x^{2} - 4000$$

و لإيجاد الربح الحدي marginal profit نحتاج لحساب المشتقة لدالة الربح P'(x) و كما بلى:

$$P'(x) = 70 - 0.4x$$

ولهذا عندما يكون x=100 فإن الربح الحدي هو: P'(100)=70-(0.4)~(100)=30

وهـذا يعني عندما يتم إنتاج وبيع 100 وحدة فإن الربح الحدي، وهو الربح الإضافي extra profit per additional item عندما يزداد الإنتاج بكمية قليل، يكون \$30 لكل وحدة إضافية تنتج وتباع.

أما عندما يكون الإنتاج x = 200 يكون الربح الحدي كما يلى:

$$P'(200) = 70 - 0.4(200) = -10$$

ولذلك عندما يكون الإنتاج 200 وحدة فالزيادة القليلة في الإنتاج ينتج خسارة that is, a حيث أن الربح سالب small increase in production results in a loss عيث أن الربح سالب negative profit خسارة لكل وحدة إضافية منتجة.

# أسئلة الفصل السابص Exercises for chapter Seven

أوجد المشتقات للدوال التالية بالنسبة للمتغير المستقل للأسئلة (1-6):

Find the derivatives of the following functions with respect to the independent variables involved:

1) 
$$f(x) = 2x - 5$$

2) 
$$g(x) = 12$$

3) 
$$f(x) = x^3 - 3x + 10$$

4) 
$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

5) 
$$g(u) = \frac{u}{u-1}$$

6) 
$$f(x) = 1/x$$

أوجد ميل المماس لرسم الدوال التالية في النقطة المحددة ثم حدد المعادلة إلى الخط المماس للأسئلة (7-9):

Find the slope of the tangent to the graphs of the following functions at the indicated points. Determine the equation of the tangent line in each case:

7) 
$$y = 4x^2 - 5$$

at 
$$x = 3$$

8) 
$$y = x^2 + 2x + 4$$

at 
$$x = -3$$

9) 
$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

at 
$$x = 3$$

أوجد المشتقات للدوال التالية للأسئلة (10-21):

Differentiate the following expressions:

10) 
$$y = 5 - 2x^4 + x^2$$

11) 
$$y = x^5 + \frac{1}{x^4}$$

12) 
$$y = 2\sqrt{x} + 2/\sqrt{x}$$

13) 
$$y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}}$$

14) 
$$y = (x^2 - 10)(2x - 3)$$

15) 
$$y = (\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}})^3 - (\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}})^3$$

16) 
$$y = (x^2 + \frac{1}{r})^3$$

17) 
$$f(x) = 4x^4 - 7x_3 + 3x^2 - 10$$

18) 
$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2}$$

19) 
$$f(x) = (8x)^{\frac{2}{3}} + (8x)^{-\frac{2}{3}}$$

20) 
$$f(x) = \frac{x^6}{6} + \frac{6}{x^6}$$

21) 
$$y = \frac{x^2 - 3x + 1}{\sqrt{x}}$$

حدد معادلة المماس لرسم الدوال التالية في النقاط المحددة للأسئلة (24-22): Determine the equation of the tangent line to the graph of the following functions at the indicated points:

22) 
$$f(x) = x^2 - 3x + 4$$

23) 
$$f(x) = \frac{2}{x}$$

at 
$$x = -2$$

24) 
$$f(x) = x^3 - \frac{1}{x^2}$$

at 
$$x = 1$$

أوجد الكلفة الحدية للدوال التالية للأسئلة (25-27):

Find the marginal cost for the following cost functions:

25) 
$$C(x) = 80 + (\ln 2) x^2$$

26) 
$$C(x) = 0.001x^3 - 0.06x^2 + 30x + 1000$$

27) 
$$C(x) = 1000 + 10x$$

أوجد العائد الحدي للدوال التالية للأسئلة (28-29):

Find the marginal revenue for the following revenue functions:

28) 
$$R(x) = 10x - 0.02x^{3/2}$$

29) 
$$R(x) = 0.2x - 10^{-2} x^2 - 10^{-4} x^{5/2}$$

- 30) If the demand equation is x + 4p = 200. find the marginal revenue, R'(x)
- 31) If the demand equation is  $\sqrt{x} + p = 100$ , find the marginal revenue.
- 32) If in exercise (26) the cost function is C(x) = 200 + 10x, find the marginal profit.
- 33) If, in exercise (27) the cost function is C(x) = 150 + x, find the marginal profit.

استخدم قاعدة الضرب لإيجاد المشتقات للدوال التالية للأسئلة (34-37):

Using the product rule, find the derivatives of the following functions with respect to the variable involved:

34) 
$$f(x) = (x^2 + 1)(x^4 + 3)$$

35) 
$$y = (x^3 - 10x + 1) (4x + 10)$$

36) 
$$f(x) = (t^3 + 1)(t^2 - \frac{1}{t})$$

37) 
$$g(x) = (x + \frac{1}{x})(5t^2 - \frac{1}{t^2})$$

استخدم قاعدة القسمة لإيجاد المشتقات للدوال التالي حسب المتغير المستقل للأسئلة (38-43):

Use the quotient vale to find the derivatives of the following functions with respect to the independent variable involved:

38) 
$$y = \frac{x}{x-1}$$

39) 
$$f(x) = \frac{x+4}{x-2}$$

40) 
$$g(x) = \frac{10 - x}{x^2 - 10}$$

41) 
$$f(x) = \frac{1}{x^3 + 1}$$

42) 
$$y = \frac{1}{(x+1)^2}$$

43) 
$$f(x) = \frac{(x^3 + 1)(2x + 4)}{4x - 1}$$

Find the derivatives of the following functions with respect to the independent variable involved:

44) 
$$y = (3x+4)^6$$

45) 
$$y = (2x^3 + 1)^{\frac{5}{2}}$$

46) 
$$f(x) = \sqrt{10 - 2t}$$

47) 
$$f(x) = \frac{1}{(x^3 + 1)^5}$$

48) 
$$y = (x^2 + \frac{1}{x^2})^4$$

49) 
$$f(x) = (x + 2)^4 (2x + 2)^5$$

أوجد المشتقة  $\frac{dy}{dx}$  للأسئلة (50–57):

Find dy/dx in the following functions:

50) 
$$y = e^{3x}$$

51) 
$$v = e^{\sqrt{x}}$$

52) 
$$y = xe^{-x^2}$$

53) 
$$y = x^2 \ln (x^2 + 1)$$

54) 
$$y = e^x \ln x$$

55) 
$$y = \frac{\ln x}{x}$$

$$56) y = \frac{\ln x}{e^x}$$

57) 
$$y = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x + 1}\right)$$

أوجد المشتقات للدوال التالية للأسئلة (58-69):

Find the indicated derivatives of the following functions with respect to the independent variable inverted:

58) Find 
$$\frac{d^2y}{dx^2}$$
 if  $y = 4x^4 + 6x^3 + 5x^2 + 100$ 

59) Find 
$$f''(t)$$
 if  $f(t) = (t^3 + 2)^2$ 

60) Find 
$$f''(x) f(x) = (x^2 + 1) (3x - 3)$$

61) Find y'' if 
$$y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

62) Find 
$$f'''(t)$$
 if  $f(t) = \frac{t-1}{t+1}$ 

63) Find 
$$\frac{d^3y}{dx^3}$$
 if  $y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$   $(x \ne 1)$ 

- 64) Find  $y^{(3)}$  if  $y = x \ln x$
- 65) Find  $y^{(4)}$  if  $y = xe^x$
- 66) Find y'' if  $y = \ln [(x+1)(x+2)]$
- 67) Find y''' if  $y = x^3 + e^{2x}$
- 68) Find y'' if  $y = (x + 1) e^{-x}$
- 69) Find y'' if  $y = \frac{x^2 + 1}{e^x}$

TITTE TO THE PARTY

# الفصل الثامن

# التكامل وتطبيقاته

- 8-1 مقدمة
- 2-8 مفهوم التكامل غير المحدد
- 3-8 التكامل لدوال معروفة قواعد التكامل
  - 4-8 طرق التكامل
  - 1-4-8 التكامل بطريقة التعويض
    - 2-4-8 التكامل بطريقة التجزئة
- 3-4-8 التكامل بالتفريق إلى كسور بسيطة
  - 4-4-8 التكامل المحدود
  - 5-8 التطبيقات الاقتصادلية للتكامل
- أ) استخراج دالة التكلفة الكلية ودالة الإيراد الكلي
  - ب) حساب فائض المستهلك
    - ج) حساب فائض المنتج

أسئلة الفصل الثامن

# المال ال المالية مالا المالية ا

# الفصل الثامن التكامــل وتطبيقاتــــــ Integration and its applications

#### :Introduction مقدمة

سنعرض في هذا الفصل دراسة المفهوم الرياضي المهم لكثير من التطبيقات ومنها الإدارية والهندسية ألا وهو التكامل Integration عن طريق إعطاء تعريفاً واضحاً للتكامل غير المحدد لدالة Definition of indefinite integral ونشرح كيفية إيجاد المحدد الدوال المعرفة How to integrate some known وعن الطرق المختلفة لإيجاد بعض من قيم التكامل غير المحدد منها التكامل بطريقة التغيير أو التحويل transformation of variables والتكامل بطريقة التجنير أو التحويل integration والتكامل بالتفريق إلى كسور بسيطة integration وكذلك سيتم التعرف على التكافل المحدد Definite integral وحينوي الفصل في نهايته وسيتضمن الفصل على العديد من الأمثلة exercises ويحتوي الفصل في نهايته على العديد من الأسئلة exercises.

وبالتالي فإن هذا الفصل سيتضمن عدة مباحث منها المبحث 8-8 مفهوم التكامل غير المحدد The concept of indefinite integral والمبحث 8-8 التكامل للحدوال معروفة - قواعد التكامل Rules for integration والمبحث 4-8 طرق المحدد Integration Methods. أما المبحث الأخير 5-8 التطبيقات الاقتصادية للتكامل Economics application for integrals.

# 8-2 مفهوم التكامل غير الحدد The concept of indefinite integral:

لاحظ نا مما سبق ماذا نعني بالتفاضل differentiation والتي تمثل عملية البجاد المشتقة derivative. والآن سنقوم بالتعرف على العملية المعاكسة لها والتي تسمى بالتكامل integral والتي تمثل إيجاد قيمة التكامل integral بتعبير آخر نقول بأن أي عمليتين تقوم كل منهما بإلغاء الأخرى تسمى العملية المعاكسة ولذلك

يوجد المشتقة عملية معاكس يطلق عليها اسم التكامل. ويرمز التكامل عادة بالرمز  $\int f(x) dx$  ونكــتب  $\int f(x) dx$  والــذي يدعــى بالتكامل غير المحدد  $\int f(x) dx$  أما فيمــثل التكامل المحدد definite integral وسنقوم الآن بتوضيح معنى التكامل كالآتي:

إذا كانت الدالة f(x) هي مشتقة الدالة g(x) في مجال معين وبالنسبة المتغير x

$$g'(x) = f(x)$$

فإننا نسمى الدالة g(x) تكاملاً للدالة f(x) في المجال المفروض.

If f(x) is the derivative of the function g(x) for some domain with respect to the variable x.i.e, g'(x) = f(x). Then, we said that g(x) is the integration of the function f(x) for the same domain.

وبالتالي فإن البحث في تكامل الدالة f(x) يعني البحث عن دالة جديدة، ولتكن g(x)، بحيث أن مشتقتها it's derivative هي الدالة المفروضة g(x). ونسمي الدالة g(x) بالدالة الأصلية للدالة f(x) أو يطلق عليها اسم تكامل integral للدالة g(x).

for example:  $(x^2 + 3x + 1)^{1} = 2x + 3$ 

Then, the function  $x^2 + 3x + 1$  is the integral for the function 2x + 3 وبما أن مشتقة العدد الثابت يساوي صفر فإننا من تعريف تكامل الدالة نستنتج أن هذا التكامل معين بغض النظر عن قيمة العدد الثابت. ففي المثال أعلاه نلحظ أن الدو ال:

$$x^{2} + 3x + 10$$

$$x^{2} + 3x - 5$$

$$x^{2} + 3x + \frac{3}{4}$$

يمكن اعتبار كل منها تكاملاً للدالة x+3 وذلك لأن مشتقة كل منها هو 2x+3

ولهذا إذا كانت الدالة g(x) هي واحدة من تكاملات الدالة f(x) فإن كل تلك التكاملات يمكن التعبير عنها بالشكل g(x) + c حيث أن g(x) ثابت كيفي ويسمى بثابت المتكامل. وإذا أردنا اختيار دالة أصلية واحدة فقط فإننا نعطي للثابت g(x) القيمة المناسعة.

ولنفرض الآن أننا نريد تعيين قيمة c التي من أجلها تكون قيمة التكامل للدالة c عندما c عندم

Find the value for the constant c such that the integration of the function 2x - 3 equals 7 if x equals 2.

لأجل إيجاد قيمة الثابت لدينا:

تكامــل الدالة  $x^2 + 3x + c$  هو  $x^2 + 3x + c$  وكما رأينا سابقاً. وبالتالي فإن قيمة ذلك التكامل عندما x = 2 مساوياً إلى x = 2 مساوياً الله التكامل عندما x = 2

$$(2)^2 + 3(2) + c = 7$$

أي أن:

$$4+6+c=7$$

$$10 + c = 7$$

$$c = 7 - 10 = -3$$

وبالتالي فإن التكامل الوحيد للدالة x=2 و الذي قيمته x=2 عندما c=-3 عندما c=-3 و لأجل توضيح العلاقة بين التكامل و التفاضل لدينا:

Relationship between integration and differentiation:

بالرجوع لتعريف المشتقة derivative فإن:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

والتي يمكن كتابتها بالشكل التالي:

$$dy = f'(x) dx$$

والتي تعرف باسم تفاضل الدالة y ونرمز له بالرمز dy. وذلك يعني أن تفاضل أي دالة يساوي مشتقتها في تفاضل المتغير المستقل X. أي أن عملية إيجاد تكامل الدالة (x) تعني الانتقال من هذه الدالة، والتي تمثل مشتقة لدالة أصلية أخرى، إلى الدالة الأصلية لها y. أي العودة من التفاضل dy إلى y والذي يعني إلغاء عملية التفاضل.

ولذلك فإننا نرمز لتكامل الدالة f(x) بالرمز f(x).

# 8-3 التكامل لدوال معروفة — قواعد التكامل لدوال معروفة التكامل الدوال معروفة التكامل التكامل 8-1

بالاستفادة من قواعد الاشتقاق والتي تم ذكرها في الفصل السابق يمكننا أن نجد قيمة تكاملات مجموعة من الدوال وبشكل مباشر ودون اللجوء إلى أي وسيلة رياضية. والتالي تمثل قائمة بتكامل دوال معروفة حيث أن n هو عدد حقيقي وأن  $a_2$  عددان ثابتان حقيقيان. أما  $a_3$  فهو ثابت التكامل.

The following are some useful rules for integration, where n is a Real number.  $a_1$  and  $a_2$  are real constants. and c is the constant of the integration method.

1) 
$$\int n^x dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c$$
 ,  $n \neq -1$ 

$$2) \int_{-x}^{1} dx = \ln|x| + c$$

3) 
$$\int a_1 f(x) dx = a_1 \int f(x) dx$$

4) 
$$\int [a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)] dx = a_1 \int f_1(x) dx + a_2 \int f_2(x) dx$$

5) 
$$\int [f(x)]^n f'(x) dx = \frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} + c$$

6) 
$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$$

- $7) \int e^x dx = e^x + c$
- 6)  $\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + c$

وبالاستعانة بالقواعد أعلاه يمكن إجراء التكاملات التي ستعرض في الأمثلة

التالية:

مثال 1

أوجد التكامل للدوال التالية:

Find the integral for the following:

a) 
$$\int dx = x + c$$

$$b) \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + c$$

c) 
$$\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + c$$

d) 
$$\int 3x^2 dx = 3 \int x^2 dx = (3)(\frac{1}{3})x^3 + c = x^3 + c$$

e) 
$$\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^2}{3/2} + c = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$$

f) 
$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + c = \frac{-1}{x} + c$$

g) 
$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1/2} + c = 2x^{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{x} + c$$

h) 
$$\int \frac{2}{x^3} dx = 2 \int x^{-3} dx = (2)(\frac{x^{-2}}{-2}) + c = -x^{-2} + c = \frac{-1}{x^2} + c$$

i) 
$$\int (3x-1)dx = \int 3xdx - \int dx = 3\int xdx - \int dx = \frac{3}{2}x^2 - x + c$$

j) 
$$\int \left[ 16x^7 - \sqrt{x} + \frac{1}{x} \right] dx = 16 \int x^7 dx - \int x^{\frac{1}{2}} dx + \int \frac{1}{x} dx$$
$$= (16) \left( \frac{x^8}{8} \right) - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{3/2} + \ln|x| + c$$
$$= 2x^8 - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \ln|x| + c$$

مثال 2

أوجد تكامل ما يلى:

Find the integral for the following:

a) 
$$\int x(x+1)dx$$

يلاحظ هنا أننا نود تكامل حاصل ضرب. ولكن إذا استطعنا أن نضرب الحدين الموجودين فإن ذلك سيسهل شكل وطريقة إيجاد التكامل كالآتي:

$$\int x(x+1)dx = \int (x^2 + x)dx$$
$$= \int x^2 dx + \int x dx$$
$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x}{2} + c$$

b) 
$$\int (x^3 + 1)(x^2 - 1)dx = \int (x^5 - x^3 + x^2 - 1)dx$$
$$= \int x^5 dx - \int x^3 dx + \int x^2 dx - \int dx$$

$$= \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x + c$$

c) 
$$\int (x - \frac{1}{x})(x + \frac{1}{x})dx$$

وبضرب الحدان الموجودان داخل عملية التكامل والاستعاضة بأن الضرب هو الفرق بين مربعين لدينا ما يلى:

$$\int \left[ x^2 - \left(\frac{1}{x}\right)^2 \right] dx = \int x^2 dx - \int \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \int x^2 dx - \int x^{-2} dx$$

$$= \frac{1}{3} x^3 - \left(\frac{-1}{3}\right) x^{-3} dx + c$$

$$= \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{3 x^3} + c$$

d) 
$$\int (x+5)^2 dx$$

وبعملية فتح التربيع الموجودة على الحد x+5 نحصل على ما يلي:

$$\int (x+5)^2 dx = \int (x^2 + 10x + 25) dx$$

$$= \int x^2 dx + 10 \int x dx + 25 \int dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + \frac{10}{2}x^2 + 25x + c$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + 5x^2 + 25x + c$$

#### مثال 3

أوجد تكامل ما يلى:

Find the integral for the following:

a) 
$$\int (x^2 + x + 1)(2x + 1)dx$$

يمكن إيجاد هذا التكامل بطريقتين وهما:

الطريقة الأولى: سنقوم بضرب الحدين في داخل التكامل ومن ثم إجراء التكامل كما تم ملاحظته في الأمثلة السابقة وكما يلي:

$$= \int (2x^3 + x^2 + 2x^2 + x + 2x + 1)dx$$

$$= \int (2x^3 + 3x^2 + 3x + 1)dx$$

$$= 2 \int x^3 dx + 3 \int x^2 dx + 3 \int x dx + \int dx$$

$$= (2) \left(\frac{x^4}{4}\right) + (3) \left(\frac{x^3}{4}\right) + (3) \left(\frac{x^2}{4}\right) + x + c$$

$$= \frac{1}{2}x^4 + x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x + c$$

الطريقة الثانية: وسنقوم هنا بتمييز أن الحدين داخل التكامل أحدهما هو مشتقة الحد الآخر وباستخدام القاعدة رقم (5) فإن  $f(x) = x^2 + x + 1$  وأن f'(x) = 2x + 1 وبالتالي فإن قيمة التكامل تصبح:

$$\int (x^2 + x + x)(2x + 1)dx = \frac{1}{2}(x^2 + x + 1)^2 + c$$

$$= \frac{1}{2}(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) + c$$

$$= \frac{1}{2}[x^4 + x^3 + x^2 + x^3 + x^2 + x + x^2 + x + 1] + c$$

$$= \frac{1}{2} \left[ x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1 \right] + c$$
$$= \frac{1}{2} x^4 + x^3 + \frac{3}{2} x^2 + x + c$$

وطبيعي أن تتفق الطريقتان في الناتج والذي يمثل تكامل الدالة. ولكن يجب أن نلاحظ هنا أن الحل بالطريقتين كان نتيجة أن الضرب كان ممكناً للعمل بالطريقة الأخرى.

أما إذا كان الضرب غير ممكناً (وهذا ما سنراه في (d)، (c)، و(d) من هذا المثال) فيجب علينا إيجاد التكامل باتباع فكرة الطريقة الثانية والمعتمدة على القاعدة رقم (5) وكالآتي:

b) 
$$\int (x^2 + x + 1)^{\frac{1}{3}} (2x + 1) dx$$
$$= \frac{3}{4} (x^2 + x + 1)^{\frac{4}{3}} + c$$

c) 
$$\int (x^3 + 1)^4 x^2 dx$$

وهنا نلاحظ أن مشتقة  $x^3 + 1$  هي  $3x^2$ . وذلك يعني أننا نحتاج إلى الضرب في 3 للحصول على تلك المشتقة. عملية الضرب هذه ستغير قيمة التكامل ما لم نقوم بالقسمة على 3 في الوقت ذاته. وذلك يعني ما يلي:

$$\int \frac{1}{3} (x^3 + 1)^4 3x^2 dx$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} (x^3 + 1)^5 + c$$

$$= \frac{1}{15} (x^3 + 1)^5 + c$$

d) 
$$\int \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx$$

ونلاحظ هنا أن مشتقة 
$$\frac{1}{x}$$
 هي  $\frac{1}{x}$  وبالتالي فإن قيمة التكامل ستكون:  $\frac{1}{2}(\ln x)^3 + c$ 

#### مثال 🕰

أوجد تكامل ما يلى:

Find the integral for the following:

a) 
$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx$$

وهنا نلاحظ بأن المقام  $x^2 + x + 1$  وأن مشتقته هي  $x^2 + x + 1$  والتي تمثل البسط. وذلك يعني أن البسط هو مشتقة المقام وباستخدام القاعدة رقم (6) فإن نتيجة أو قيمة التكامل هي:

$$\ln |x^2 + x + 1| + c$$

b) 
$$\int \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^3} dx$$

باستخدام نفس الملاحظة أعلاه فإن قيمة التكامل هي:

$$\frac{-1}{2}(x^2+x+1)^{-2}+c=\frac{-1}{2(x^2+x+1)^2}+c$$

c) 
$$\int \frac{x}{\sqrt{1-3x^2}} dx$$

وهنا نلاحظ بأن المقام بدون الجذر  $3x^2$  ومشتقته -6x وبذلك يعني علينا ضرب البسط في المقدار -6 ليصبح البسط مشتقة المقام وبالتالي علينا أيضاً قسمة الحد على المقدار -6 في نفس الوقت للحصول على ما يلى:

$$\frac{-1}{6} \int \frac{-6x}{\sqrt{1-3x^2}} dx = \frac{-1}{6} \int (1-3x^2)^{\frac{-1}{2}} (-6x) dx$$
$$= \frac{-2}{6} (1-3x^2)^{\frac{1}{2}} + c$$
$$= \frac{-1}{3} \sqrt{1-3x^2} + c$$

## 8-4 طرق التكامل Integration Methods:

في هذا المبحث سنقوم بعرض بعض من الطرق العامة لإيجاد التكامل كالآتي:

## 8-4-1 التكامل بطريقة التعويض Transformation of variables:

للحصول على تكامل دالة ما ولم نستطع تطبيق أي من قواعد التكامل السابق ذكرها فقد يكون بالإمكان حساب التكامل المطلوب عن طريق التعويض أو التغيير أو المستحويل من المتغير X إلى متغير آخر بحيث تصبح الدالة الجديدة من أشكال الدوال التي تنطبق عليها إحدى قواعد التكامل السابقة.

لو كان لدينا التكامل  $\int f(x)dx$  وقمنا بتغيير x إلى u مثلاً من خلال العلاقة x=h(x) فإن تفاضل x=h(x) سيكون x=h(x) وبالتالي فإن التكامل الأصلي للدالة سيصبح:

$$\int f(x)dx = \int f(h(u))h'(u)du$$

وبعد حساب قيمة التكامل الأخير فإننا نعود إلى المتغير X عن طريق حساب قيمة u بدلالة X. والمثال التالي سيوضح ذلك:

مثال 5

أوجد قيمة التكاملات التالية:

Find the integral for the following:

a) 
$$\int (2x+3)^4 dx$$

وباستخدام العلاقــة 
$$u = 2x + 3$$
 فإن  $u = 2x + 3$  وبالتالي

فإن قيمة التكامل ستصبح:

$$\int (2x+3)^4 dx = \int u^4 \cdot \frac{1}{2} du$$

$$= \frac{1}{2} \int u^4 du$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} u^5 + c$$

$$= \frac{1}{10} u^4 + c$$

وأخيراً نقوم بالتعويض عن u بدلالة x ليصبح الناتج:

$$\frac{1}{10}(2x+3)^5+c$$

b) 
$$\int \frac{x}{\sqrt{3x^2 - 2}} dx$$

وباستخدام العلاقة  $u = 3x^2 - 2$  فإن قيمة التكامل وبالتالي فإن قيمة التكامل

ستصبح:

$$\int (3x^2 - 2)^{-\frac{1}{2}} x dx = \int u^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{6} du$$
$$= \frac{1}{6} \cdot 2u^{\frac{1}{2}} + c$$

$$= \frac{1}{3}(3x^2 - 2)^{\frac{1}{2}} + c$$
$$= \frac{1}{3}\sqrt{3x^2 - 2} + c$$

## :Integration by parts التكامل بطريقة التجزئة 8-4-2

لحساب التكامل بطريقة التجزئة علينا الرجوع لمشتقة حاصل ضرب دالتين والتي كانت كالآتي:

$$[h_1(x)h_2(x)]' = h_1(x)h'(x_2) + h_2(x)h'(x_1)$$

والتي كانت تعني الدالة الأولى في مشتقة الثانية مضافاً إليه الدالة الثانية في مشتقة الأولى.

وبأخذ التكامل للطرفين نحصل على ما يلي:

$$\int [h_1(x)h_2(x)]' dx = \int h_1(x)h_2'(x_2) + \int h_2(x)h_1'(x_1) dx$$

وبما أن الطرف الأيسر من هذه العلاقة يمثل  $h_1(x)h_2(x)$  فإن ذلك يعني أن العلاقة الأخيرة ستصبح كالآتي:

$$h_1(x)h_2(x) = \int h_1(x)h_2'(x)dx + \int h_2(x)h_1'(x)dx$$

وذلك بعني أن:

$$\int h_1(x)h_2'(x)dx = h_1(x)h_2(x) - \int h_1'(x)h_2(x_1)dx$$

وتطبيق هذه الطريقة سيكون أنه عندما نريد إيجاد قيمة تكامل حاصل ضرب دالتين بحيث نستطيع تكامل أحدها ونشتق الأخرى فإننا يمكننا تطبيق طريقة التكامل بالتجزئة لإيجاد قيمة التكامل. وسيتم ملاحظة ذلك من المثال التالي:

مثال 6

أوجد قيمة التكاملات التالية:

Find the integral for the following:

a) 
$$\int x\sqrt{x+5}dx$$

بافتر اض أن 
$$x=h_1(x)$$
 فإن  $x=h_1(x)$  وبافتر اض أن: 
$$\int\!\!\sqrt{x+5}dx=\int\!\!h_2'(x)dx$$

$$\int (x+5)^{\frac{1}{2}} dx = \int h_2'(x) dx$$

فإن:

$$\frac{3}{2}(x+)^{\frac{3}{2}} = h_2(x)$$

وبالتالي قيمة التكامل الأصلي:

$$\int x\sqrt{x+5} = x \cdot \frac{2}{3}(x+5)^{\frac{3}{2}} - \int \frac{3}{2}(x+5)^{\frac{3}{2}} dx$$
$$= \frac{2}{3}x(x+5)^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{15}(x+5)^{\frac{5}{2}} + c$$

b)  $\int \ln x dx$ 

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= x \ln x - \int dx$$
$$= x \ln x - x + c$$

c)  $\int xe^x dx$ 

وبافتر اض أن 
$$h_1(x)=dx$$
 فإن  $h_1(x)=x$  فإن  $h_1(x)=x$  وبافتر اض أن  $\int e^x dx=\int h_2'(x)dx$  فإن قيمة التكامل هي:

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx$$
$$= xe^x - e^x + c$$

3-4-3 التكامل بالتفريق إلى كسور بسيطة Integration by using fractions

وهذه الفقرة تتناول تكامل الدوال الكسرية fraction functions وهي الدوال التي كل منها على شكل كسر fraction بسطه كثير حدود ومقامه كثير حدود كذلك. ويعتمد بصورة أساسية على كون درجة البسط أقل من درجة المقام ويمكن تحليل المقام إلى عوامله ومن ثم إيجاد تكامل الكسور البسيطة التي تكون الكسر المراد إيجاد قيمة تكامله. وعندما يكون درجة البسط أكبر أو تساوي درجة المقام فعندئذ علينا أولاً بقسمة البسط على المقام، بأي من الطرق السابق ذكرها، للحصول على ناتج القسمة مضافاً إليه كسر يكون درجة بسطه أقل من درجة مقامه وبعد ذلك نقوم بالتجزئة إلى الكسور البسيطة ومن ثم إيجاد ناتج أو قيمة التكامل. والمثال التالى سيوضح ذلك:

مثال 7

أوجد قيمة التكاملات التالية:

Find the integral for the following:

$$a) \int \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx$$

نلاحظ هنا بأن البسط هو ليس مشتقة المقام لنستطيع استخدام إحدى العلاقات السابق ذكرها لإيجاد التكامل، كما وأننا لا نستطيع استخدام طريقة التعويض أو

طريقة التكامل بالتجزئة. ولكن بما أن الدالة كسرية وأن درجة البسط أقل من درجة المقام فإننا سنطبق طريقة التكامل بالتجزئة إلى كسور بسيطة كالآتي: أو لا علينا تحليل المقام إلى عوامله كالآتى:

$$X^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$
  
و بالتالي فإن التكامل سيكون كما يلي:

$$\int \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \frac{1}{(x - 3)(x + 1)} dx$$

وبما أن الكسر  $\frac{1}{(x-3)(x+1)}$  يمكن كتابته على الشكل:

$$\frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1) + B(x-3)}{(x-3)(x+1)} = \frac{(A+B)x + (A-3B)}{(x-3)(x+1)}$$

فإننا نستطيع إيجاد قيمة A و B من تساوي الشكلين كالآتي:

$$\frac{1}{(x-3)(x+1)} = \frac{(A+B)x + (A-3B)}{(x-3)(x+1)}$$

وذلك يعنى أن A + B = 0 وأن A - 3B = A. ومن حل هاتين المعادلتين نحصل على:

$$A = \frac{1}{4} \qquad , \qquad B = \frac{-1}{4}$$

و كذلك يمكن الحصول على قيمة كل من A و B باستخدام العلاقة X يمكن الحصول على قيمة X والتعويض عن قيمة X بأصفار المقام. أي عندما X عندما X والتعويض X والتعويض عن X والتعويض X أما عادما X ويعني X ويعني X ويعني X أما عادما X ويعني عندما X ويعني عندما X أما عادما X أما عندما X أ

وعند التعويض عن تلك القيمتين نحصل على التكامل التالي:

$$\int \frac{1}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \frac{1}{(x - 3)(x + 1)} dx$$

$$= \int \frac{A}{x - 3} dx + \int \frac{B}{x + 1} dx$$

$$= \int \frac{\frac{1}{4}}{x - 3} dx + \int \frac{-1}{\frac{4}{x + 1}} dx$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x - 3} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x + 1}$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x - 3| - \frac{1}{4} \ln|x + 1| + c$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x - 3}{x + 1} \right| + c$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x - 3}{x + 1} \right| + c$$

b) 
$$\int \frac{x^2 + 5x - 1}{x + 3} dx$$

ونلاحظ هنا بأن الدالة كسرية وأن درجة البسط أكبر من درجة المقام ولذلك علينا إيجاد ناتج القسمة (باستخدام طريقة القسمة الطويلة) لنحصل على:

$$\int \frac{x^2 + 5x - 1}{x + 3} dx = \int (x + 2) dx - \int \frac{7}{x + 3} dx$$
$$= \int x dx + \int 2 dx - \int \frac{7}{x + 3} dx$$
$$= \frac{1}{2} x^2 + 2x - 7 \ln|x + 3| + c$$

c) 
$$\int \frac{x^4 - 2x}{4x^2 - 9} dx$$

ونلاحظ هنا بأن الدالة كسرية وأن درجة البسط أكبر من درجة المقام وبالتالي علينا بإجراء القسمة (باستخدام القسمة الطويلة) كالآتي:

$$\frac{\frac{1}{4}x^{2} + \frac{9}{16}}{x^{4} - 2x}$$

$$\frac{\pm x^{4} \pm \frac{9}{4}x^{2}}{\frac{9}{4}x^{2} - 2x}$$

$$\frac{\frac{9}{4}x^{2} - 2x}{\frac{7}{4}x^{2} \pm \frac{81}{16}}$$

$$-2x + \frac{81}{16}$$

وبالتالى فإن قيمة التكامل ستكون:

$$\int \frac{x^4 - 2x}{4x^2 - 9} dx = \int \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{16}\right) dx + \int \frac{-2x + \frac{81}{16}}{4x^2 - 9} dx$$
$$= \frac{1}{4} \int x^2 dx + \frac{9}{6} \int dx + \int \frac{-2x + \frac{81}{16}}{4x^2 - 9} dx$$

ونلاحظ أن الكسر الأخير هو دالة كسرية درجة بسطها أقل من درجة مقامها وبتحليل المقام  $4x^2-9$  إلى عوامله (2x-3) (2x+3) فإن:

$$\int \frac{-2x + \frac{81}{16}}{4x^2 - 9} dx = \int \frac{-2x + \frac{81}{16}}{(2x - 3)(2x + 3)} dx$$

والكسر الأخير يساوي:

$$\frac{A}{2x-3} + \frac{B}{2x+3} = \frac{A(2x+3) + B(2x-3)}{(2x-3)(2x+3)}$$

وأخيراً فإن:

$$A(2x+3) + B(2x-3) = -2x + \frac{81}{16}$$

$$2Ax + 3A + 2Bx - 3B = -2x + \frac{81}{16}$$

$$(2A+3B)x+(3A-3B) = -2x+\frac{81}{16}$$

وبالتالي فإن:

$$2A + 2B = -2$$

$$3A - 3B = \frac{81}{16}$$

$$A = \frac{11}{32}$$
 و بحل المعادلتين الأخيرتين حلاً مشتركاً نجد أن  $B = \frac{-43}{32}$  و ذلك يعنى أن:

$$\int \frac{-2x + \frac{81}{16}}{4x^2 - 9} dx = \int \frac{A}{2x - 3} dx + \int \frac{B}{2x + 3} dx$$

$$= \frac{11}{(32)(2)} \int \frac{2}{2x - 3} dx + \frac{43}{(32)(2)} \int \frac{2}{2x + 3} dx$$

$$= \frac{11}{64} \ln|2x - 3| - \frac{43}{64} \ln|2x + 3| + c$$

$$= \frac{11}{64} \ln|2x - 3| - \frac{43}{64} \ln|2x + 3| + c$$

$$\int \frac{x^4 - 2x}{4x^2 - 9} dx = \frac{1}{12}x^3 + \frac{19}{16}x + \frac{11}{64}\ln|2x - 3| - \frac{43}{64}\ln|2x + 3| + c$$

#### 3-4-4 التكامل المحدود Definite Integral

أما عن التكامل المحدود فإنه تكامل ولكن لفترة أو لمجال معين ونرمز لهذا التكامل بالرمز  $\int_a^b f(x)dx$  حيث أن  $\int_a^b f(x)dx$  حيث أن  $\int_a^b f(x)dx$  نجد قيمة التكامل من النقطة  $\int_a^b f(x)dx$  التكامل فهي التعويض عن ناتج التكامل عند النقطة  $\int_a^b f(x)dx$  مطروحاً منه ناتج التكامل عند النقطة  $\int_a^b f(x)dx$ 

Let 
$$\int f(x)dx = g(x)$$

Then 
$$\int_{a}^{b} f(x)dx = g(b) - g(a)$$

ويمكن تجزئة مجال التكامل المحدود كالآتي:

Let f(x) be a function that can be integrated over the interval [a, b], and let c be any point in this interval. i.e. a < c < b. Then:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \int_{a}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{b} f(x)dx$$

والمثال التالي يوضح التكامل المحدود كالآتي:

مثال 8

أوجد قيمة التكامل التالي:

Find the integral of the following:

a) 
$$\int_{3}^{5} (x^{2} - x + 1) dx = \int_{3}^{5} x^{2} dx - \int_{3}^{5} x dx + \int_{3}^{5} dx$$
$$= \frac{x^{3}}{3} \Big]_{3}^{5} - \frac{x^{2}}{2} \Big]_{3}^{5} + x \Big]_{3}^{5}$$
$$= \frac{1}{3} (5^{3} - 3^{3}) - \frac{1}{2} (5^{2} - 3^{2}) + (5 - 3) = 26.67$$

b) 
$$\int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^2}$$

و لإيجاد قيمة هذا التكامل فيشابه طريقة التكامل المحدود مع كون أحد أطراف التكامل غير محدودة  $(\infty)$  والحل كما يلي:

$$\int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^{2}} = \lim_{x \to \infty} \int_{1}^{x} \frac{dx}{x^{2}}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \left[ \frac{-1}{x} \right]_{1}^{x}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \left[ \frac{-1}{x} - (-1) \right]$$

$$= \frac{-1}{\infty} + 1$$

$$= 0 + 1 = 1$$

## 5-8 التطبيقات الاقتصادية للتكامل:

#### **Economics application for integrals**

للتكامل تطبيقات عديدة منها الفيزيائية، الرياضية، الهندسية، الإدارية والاقتصادية وغيرها. وسنركز في هذا المبحث على التطبيقات الاقتصادية لأهميتها ودرجة علاقتها بالنواحي الإدارية والمالية وخصوصاً للطلبة في التخصصات المالية والإدارية. وسنذكر بعض من جوانب هذه التطبيقات كالآتي:

أ) استخراج دالة التكلفة الكلية Total cost function ودالة الإيراد الكلي Total :revenue function

ببساطة فإن دالة التكلفة الكلية total cost function هي تكامل دالة التكلفة total revenue function . أما دالة الإيراد الكلي marginal cost function

فهي تكامل دالة الإيراد الحدي marginal revenue function. والمثال التالي لتوضيح ذلك:

مثال و

و x أن دالة التكلفة الحدية هي  $f(x) = 4x^2 + 3x + 1$  حيث أن x هو جم الإنتاج. أوجد دالة التكاليف الكلية y:

$$Y = \int f(x)dx$$
=  $\int (4x^2 + 3x + 1)dx$ 
=  $\frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x + c$ 

وبافتراض أن التكاليف الكلية معلومة، ولتكن 15، عندما حجم الإنتاج x يساوي صفر فإن:


$$Y = c = 15$$

عندئذ تصبح دالة التكاليف الكلية معينة بصورة وحيدة كالآتي:

$$Y = \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x + 15$$

## ب- حساب فائض المستهلك Consumer surplus:

لنفرض أن دالة الطلب Q من قبل المستهلك هي Q=a+bp حيث أن Q هو السعر وأن a و b هما عددان حقيقيان.



ولحساب فائض المستهاك علينا إيجاد مساحة الشكل المثلثي المظلل والتي تساوي مساحة \*OF\*FQ مطروحاً منه مساحة \*OFFQ ويلاحظ بأن مساحة \*OEFQ هي تكامل دالة السعر  $P=\frac{Q}{h}-\frac{a}{h}$ 

أما مساحة المستطيل  ${^*OP}^*FQ$  فهو  ${^*Q}^*$ . والمثال التالي يوضح ذلك:

#### مثال 10

إذا علم ت أن دالة الطلب Q=10-2 و كان سعر التوازن  $P^*=3$  أوجد فائض المستهلك.

 $P=5-\frac{1}{2}Q$  المستحور P ستكون Q=10-2 و فإن دالة السعر Q=10-2 و المستحر الستوازن  $Q^*=4$  فإن كمية التوازن  $Q^*=4$  فإن كمية التوازن  $Q^*=4$  فائض المستحاك هو:

$$\int_{0}^{Q^{*}} (5 - \frac{1}{2}Q)dQ - P^{*}Q^{*}$$

$$\left[5Q - \frac{1}{4}Q^2\right]_0^4 - (3)(4)$$


$$(5)(4) - \frac{1}{4}(4)^2 - (3)(4)$$

$$20 - 4 - 12 = 4$$

#### ج) حساب فائض المنتج Producer surplus:

لنفرض أن دالة العرض Q من قبل المنتج هي Q = a + bp حيث أن p هو السعر وأن p هما عددان حقيقيان.

وبما أن العرض دالة متزايدة increasing في السعر فإن الثابت b يجب أن يكون موجباً p و  $p^*$  و  $p^*$  و إليكن  $p^*$  و  $p^*$  و التوازن على التوالى التوالى المنتج producer surplus هو المساحة المظللة في الشكل التالى:



وبنفس الأسلوب السابق فإن حساب هذه المساحة المظللة هي تكامل دالة السعر  $p^*$  بين  $p^*$  و مطروحة من مساحة المستطيل المساوي إلى  $p^*Q^*$  و المثال التالى لتوضيح ذلك:

#### أمثال 1 1

إذا علم ت أن دالة العرض Q = -6 + 3p و كان سعر التوازن  $P^* = 5$  أوجد فائض المنتج.

إذا كانت دالة العرض Q = -6 + 3 p فإن دالة السعر Q ستكون:

$$Q^* = 9$$
 وإن كـان سـعر التوازن  $P^* = 5$  فإن كمية التوازن و  $P^* = 2 + \frac{1}{3}Q$ 

وعليه يكون فائض المنتج هو:

$$P^*Q^* - \int_{0}^{Q^*} (2 + \frac{1}{3}Q)dQ$$

$$(5)(9) - \left[2Q + \frac{1}{6}Q^2\right]_0^9$$

$$(5)(9) - (2)(9) - \frac{1}{6}(9)^2$$

$$45-18-\frac{81}{6}=\frac{81}{6}$$

# 8

## أسئلت الفصل الثامن Exercises for chapter eight

أوجد التكامل لكل مما يأتي find the integral for the following للأسئلة (10-1):

1) 
$$\int (x^2 + 3x - 5) dx$$

2) 
$$\int (\frac{1}{2}x^4 + 3x^3 - 9x + \sqrt{5})dx$$

3) 
$$\int (\sqrt{x} + x) dx$$

4) 
$$\int (x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{4}} + x) dx$$

5) 
$$\int (\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}) dx$$

6) 
$$\int (\frac{2}{x^2} + \frac{4}{x^5} - x + 5) dx$$

$$7) \int (4x^2 - e^x + \sqrt{x}) dx$$

8) 
$$\int x^2(x+1)dx$$

9) 
$$\int (x+1)(x-1)dx$$

10) 
$$\int (x^3 + 1)(\frac{1}{x} + x)dx$$

أوجد التكامل لكل مما يأتي find the integral for the following مستخدماً طرق التكامل المختلفة للأسئلة (11-24):

11) 
$$\int \frac{dx}{4+9x^2}$$

12) 
$$\int \frac{dx}{4x \ln x}$$

13) 
$$\int \frac{dx}{3x - \sqrt{3}}$$

14) 
$$\int (2x-1)^3 dx$$

$$15) \int x^2 e^x dx$$

$$16) \int x e^{2x} dx$$

17) 
$$\int \frac{1}{(x+1)^2} dx$$

$$18) \int 2x\sqrt{1+x^2} dx$$

19) 
$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx$$

20) 
$$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$$

$$21) \int \frac{dx}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$$

22) 
$$\int \frac{2xdx}{x^2+3}$$

$$23) \int x^2 e^{-4x} dx$$

$$24) \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} dx$$

أوجد قيمة التكامل المحدود لكل مما يلي Find the definite integral for the أوجد قيمة التكامل المحدود لكل مما يلي following

25) 
$$\int_{-1}^{1} (x^2 + 5x - 3) dx$$

26) 
$$\int_{0}^{5} (x^2 - \sqrt{x} + 10) dx$$

$$27) \int_{0}^{5} e^{-x} dx$$

28) 
$$\int_{-4}^{0} \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x}} dx$$

29) 
$$\int_{-1}^{1} 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} \ dx$$

30) 
$$\int_{0}^{4} \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$$

حل التمارين التالية Solve the following للأسئلة (31–33):

31) Find the total cost function Y given that the marginal cost function  $\frac{dy}{dx}$  is:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2e^{-x} + 5$$

and the fixed cost is 20.

32) Find the total revenue function Y if the marginal revenue function is:

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 5$$

33) If the demand function for the consumer is Q = 7P - 9 and the supply function for the producer is Q = 2p + 30

Where Q is the demand and the supply quantity and p is the price. Find the consumer surplus and the producer surplus.

أوجد فائض المستهلك وفائض المنتج.

المراجع

### المراجع

- 1- Anton, Harward "Calculus" 6<sup>th</sup> ed. New York: Wiley & Son, Inc. 1999.
- 2- Arya Y.C. and R.W. Lardner "Mathematical Analysis for Business, Econ. and the life & Social sciences". 4<sup>th</sup> ed. Prentice Hall Int. eds. 1993.
- 3- Barnett R.A and Ziegler M.R. "Finite Mathematics for Management, Life & Social Sciences" Dellen publishing company 1987.
- 4- Tan S.T. "Applied Finite Mathematics". 2<sup>nd</sup> ed. Pws-kent publishing company 1987.
- 5- Jagdish C. A and Robin W.L. "Manthematical Analysis" 4th ed. 1998.